

PROMPTVARIVM CVIVSCVNQVE CRVDITATIS

Rectè dignoscendæ, rectèque curandæ.

IN QVO

DE CRVDITATIBVS RECTE DIGNOSCENDIS,
rectèque curandis libri septem conscribuntur.

IN QVIBVS

CRVDITATVM GENERA SPECIES, AC
differentia, nec non regiones accuratè explanantur.


Insuper cruditatum simplicium natura, causæ, instrumenta, compositiones, cognitio,
indicationes, & curatio adamussim examinantur.

Quocirca nullus curationis cruditatum casus, qui medico euenire potest,
inspicitur, quin hic Hippocratis, & Galeni decretis, autoritatibus,
rationibus, experimentis, ac exemplis fusè dilucidatus sit.

Cum Indice locupletissimo, & vtilissimo.

AVTORE VALERIO MARTINIO VENETO,
Philosopho, & Medico.

SVPERIORVM PERMISSV, ET PRIVILEGIIS.



V E N E T I I S, M D C X X V I I I.

Apud Io. Baptistam Combum.

1000

1000

1000



INDEX

LOCUPLETISSIMVS ET UTILISSIMVS

In Promptuarium cuiuscunq; cruditatis rectè dignoscen-
dæ, recteq; curandæ, in quo omnia dicta notabilia cer-
nuntur, quæ in hoc tomo continentur.



A



Ambrosium umbeliferum optimum
ad ventriculum frigiditatem, & hu-
miditatem in temperatum roborem.
101.a

Acetum acerrimum ad tumores du-
ros scirrhus tollendos. 120.c

Acetum acerrimum ad scirrhus tol-
lendos quomodo componatur, ac admonetur. 120.d.
& tempus aplicandi ibid.

Acetum per se extrinsecè adhibendum, nec diaphoreticum,
nec epispasticum est remedium: quia nonne alidam eua-
sionem, immo frigiditatem, unde quatenus tenue incidendo,
& siccando tenuatur, ac tenuando resolvitur, similis, ro-
boratur. 120.d

Aciditas à calore promouente, & à frigiditate vincen-
te, & perficiente fit. 16.d

Aciditas quatuor modis fiat. 16.c.d. & 17.a.b.c.d. & 18

Acida ad præcordiorum ardorem valent. 94.c

Acidum omne sine acrimonia existens frigidum, & ste-
cum se habet. 94.b

Aer tanquam causa sine qua non indicat 63.d

Aer indicat, cum sit necessario corpus nostrum alteret,
ibidem.

Aer ille est, qui primum habet locum inter ea, quæ nostrum
corpus alterant. 64.a

Aer ambiens, & inspiratus, & à carne nostra attrahitur.
64.a

Aer qualis requiritur ad cruditatem prima regionis eo-
piam ad aquandam, & eripiendam ibid.

Aer tribus modis nos tuatur, ac nocet ut causa sine qua
non ibid.

Aerens spiritus albedinis causa est. 48.e.d

Affectiones, quæ ex pituitis resultant. 36

Affectiones variæ à cruditatibus aeribus ortæ. 127.e. d. 128

Tomus Tertius.

Albedinis causa duplex est, vel enim philosophica nem-
pe æreus spiritus, vel medica nimirum albedo corpo-
rum spermaticorum, seu solidiorum. 48.b.c. & d. et 49.a

Album omne est spirituosum. 48.b

Alimenta qualia conueniant, pro copia eruditæ om-
nitutis æram prima regionis curanda. 75.b

Alimenta in cutaneis affectionibus, & bora cibandi pa-
tienter. 115.a

Alopecia à quo humore emanat. 58.b

Alterantibus pituitam prima regionis comiscenda si sit
ea, quæ mitissimè acris sit, ac mitissimè album subdu-
cent. 64.d. & 65.a. & quæ sint isthæ præsidia ibid.

Alterantia pituitam. 92.e. & d. & 93. & 94. & 95. in-
ter quæ spiritus chalcanthinus est, qui calidus minime
cernitur, ut aliqui boni viri putant, immo frigidus. 94

& 95

Album soluentia externa ab Actio posita. 111.d

Ammoniacum intro datum ad drach. 3. pro vice, pluri-
bus exhibitum diebus scirrhum curat, ex Galieno. 121

b. c

Amaritudinis causa. 14.d

Anger, seu Anxietas ventriculi à pituita copiosa. 36.b

Antepositio febri à quo fiat. 22.c

Animi defectus ob frigora à succis. 57.c

Apomeli. 93.b

Apomeli modum habet locum inter musam, & oximeli
104.c

Apium, & calaminta ut diuretica in musa non sint co-
quenda, ad eruditates prima regionis rectè curandas.
93.a

Appetentia maxima cibi à melancholia fit. 28.e

Appetentia cibi ab acida pituita. 36.a

Appetentia à melancholia, & bile atra. 36.a

Aqua à liene attrahitur, per superius loca expurgari ne-
quit, quin per ventericulum, & vesicam repurgatio fiat,
ex Hippo. 126.d

Index locupletissimus

Aqua oleo mixta relaxat. 96.c

Aqua aponitana virtutes à Falopio descriptae. 101.c

Aqua apponitana stillicidio data optima ad ventriculū frigidum, & humidū roborandum. 101.a

Aqua thermales pro stillicidio ad ventriculū roborandum à Gal. statuta. 101.c

Aqua thermetana ad vetriculū frigidum, & humidū roborandum. 101.a

Aves montane, & pisces saxatiles pro nō trimedo congruo ad eruditates primæ regionis rellē curandas à Galeno, & ab Hippoc. posita sunt. 104.e. & quando ibidem.

Arts Medicæ tria generalissima à Medico dignoscenda, ne ab his tribus Medicus decipiat. 1.a. nempe morbi magnitudinē sanguineæ, & cacochymia atq; eruditates, ibidem.

Arts quod est primum in intentione, seu in mentione methodo resolutiva, vltimum est in executione, seu generatione, & per conuersum quod est vltimum in intentione, primum est in generatione. 73.c

Autor cur de eruditionibus rellē dignoscendis, rellē quæ curandis agere impulsus est. 1.a. ut de re necessaria, et vtilissima. ibid.

B

Balnearum quomodo signum sperata, vel desperata saluti egri *est.* 86.c.d

Balnei facultates ibid.

Balnea ad cruditates acres, & mordaces curandas. 79

Balneum in cutaneis affectibus. 114.d

Balneandi modus in morbis, ubi compositio est eruditione secundæ, cum tertiæ, & quartæ regione. 124.b.c.

Balneum aquarum thermalium, quæ calidæ, & sicq; existunt ad cutaneos affectus acres, & mordaces sanandos consutur. 118.d

Balneum diaphoreticum, & epispasticū vim habet. 118.a.

in morbo regio. 117.d

Bilis fruginea rarinaria vocata. 5.e

Bilis porracea prassina appellata ibid.

Bilis porrorum colore composita ex bile flaua, & melancholia, quæ porracea non est, cum liquida sit. 5.c

Bilis atre, & eius icbor in cerebro existens quid faciat. 57.d

Bilis flaua, & eius icbor in cerebro existens quid faciat. 57.d

Bilis atra acris, & mordax. 15.d

Bilis atre nomen ibid.

Bilis atra propriè vocata præternaturalis ibid.

Bilis atra naturalis impropriè dicitur bilis atra, propriè vero est melancholia. 16.a

Bilis atra propriè, ut sex vltis est ex melancholia; id est ex fecē non vltis ibid.

Bilis atra fit diu in hepate morando: ex qua dysenteria, fit lethalis. 16.b

Bilis atra acida habetur. 16.b

Bilis atra, & acida, per colorem, & saporem denominatur. 16.b

Bilis atra acida frigida, & sicca est attamen eum aliquo calore potentiāli subdominante. 16.c

Bilis atra quomodo obinet aciditatem. 16.c.d

Bilis atre quot modis acidat: spor acidus explanatur 16

c.d. 17. & 18

Bilis atra ad acetum, & cinerem comparata declaratur quomodo frigida, & sicca sit, attamen suo calore subdominante faciliè ad calorem fuliginosum, & fauillōsum elūiue adesti, & mordacissima est. 17. & 18

Bilis atra minus frigida est, quam melancholia. 18.a

Bilis atra fauillōsa ibid.

Bilis atra acidissima terram fermentat, & abradit. 18.b

unde aspera, molesta prava, & maligna. 1

Bilis atre prima species ex purita admixta orta. 2.1.d

Bilis atre secunda species ex melancholia naturali sassa ibidem.

Bilis atra, & melancholia in principio surgens, strendē est purganda 2.2.a

Bilis atre tertia species ex sanguine crassiori perusto generata 2.2.b

Bilis atre quarta species ex bile flaua exsilia emanans. 2.2.b

Bilis atra à bile flaua perasata oborta alijs atrabilibus deterior est. 2.2.b.c

Bilis atre cuius ex flaua putrefactibile orta, quomodo non accēssionis febris anticipationem, vel postpositionē efficiat. 2.2. & 2.3. & 2.4. inordinatas febres gignit ibid.

Bilis atre quatuordecim differentie sunt quatuor simplices species statim, ac decem differentie ex his quatuor simplicibus compositæ sunt: Quadraginta, et duæ vero differentie succorum nigrorum sunt, qui succi nigri nō sunt atre biles, immo succi salubres. 23.c. & d

Bilis atra, & melancholia, medios succos nigros inter ipsas habent salubres 23. ut in pestilentia magna exploratum habuit Galenus ibid. a. & b

Bilis flauæ deusq; acris symptomata magnopere timores sunt. 43.d.

Bilis atra acida concrevit à calore promouente, & à frigido viuente ut acida. 66.b

Bilis atra à calido molliente, & humeflante tenuatur, fluxilisque redditur, non autem à frigido, quia à frigido vincente concreuerit, non autem à calore viuente, sed tantum promouente; bilis vero amara adflata à frigido humeflante fluxilis fit, cum à calore viuente generita, & crassiflata sit. 67.a

Bilis flauæ nomen. 14.b

Bilis flauæ forma ibid.

Bilis flauæ color ibid.

Bilis flauæ sapor. 14.c

Bilis amaræ flauæ causa est crassitas amara. 14.c.d

Bilis flauæ causa est Hipp. Plat. & Gal. 15.a

Bilis flauæ si des hepar est. 15.a. & b.e

Bilis flauæ temperamentum igneam. 15.e

Bilis flaua tenuissima est. 15.e

Bilis flaua acris & mordax. 15.d

Bilis flauæ seu pallidæ amaræ quot sunt species ex Græcorum mente. 19.20. & 21.a & b

Bilis amaræ prima species, quæ naturalis est pallida 19.a & flaua ibid.

Bilis amaræ species præternaturam mutatur à suo statu naturali, in tribus mutatur, nimirum in calore, consistencia, & calore potentiāli. 19.b

Bilis amaræ secunda species est, bilis flaua, quæ in humoribus calidioribus naturalis, se habet, in nō calidioribus vero præternaturalis est, cum in his naturalis sit pallida. 19.b. & d

Bilis

Rerum notabilium .

Bilis f. alida altera, quæ præternaturaliter fit, ex bile
flava & seroso excitemento. 19.c
Bilis pallida alia præternaturalis, quæ fit ex salsa pituita
putrescilla, quæ crassa & fit ibid.
Bilis pallida alia præternaturalis ex flava bile, & pituita
19.c
Bilis pallida, & flava aurea, seu auriginosa nuncupatur.
20.d
Bilis amaræ terria species rufa est. 20.a
Bilis rufa, & flava differentia ibid.
Bilis amara quarta species rubra est. 20.b
Bilis amara quinta species vitellina est ibid.
Bilis flava auxilio serosa humiditatis, ut vehiculi in an-
gustiores locum penetrat, deinde de bilis putrescendo
crassior crassius, & emittit difficultis redditur. 20.e
Bilis amara sexta species arginosa inspicitur. 20.d
Bilis amara septima species fusca est, & ipsatidem obse-
ram Galenus appellavit. 20.d
Bilis amara octava species crocea est. 21.a. & ab Hipp.
inuentum cognita ibid.
Bilis amara nona species rubiginosa, seu ferruginea est.
21.d
Bilis amara decima species cinerea est 21. b. quæ qua-
tuor de causis Roma ex bile flava perusta genita,
est ibid
Bilis amara alig quamplurimæ species, ac differentia re-
peritur nomine carentes. 21. b. & c
Biliosa excrementa cruda & capite astrahuntur, & eatar-
rho committi possunt. 28.a
Bilis amara, & acida mordax morborum mater est, ex
Hipp. & Gal. 28.a
Bilis flava propriè aceros proxiat morbos. 28.a
Biliosus humor flauus licet quâritate, & mole paucus sit
plurima copia pituitæ commixtus, attamen obeius ma-
ximam vim astringentem igneam prædominium obtinet,
affinitati ratione. 28.a
Bilis pallida, flava, vitellina, & crocea nauseam parit.
36.a
Bilis flava crassifacila & obscurior reddita de calore viti-
no, liquefit a frigore. 65.d. & 66. & 67
Bilosarum cruditarum omnium indicationes hauriuntur,
ex Galeni exemplis materis præfidiarum dilucidâ. nr.
78. & 79

C

Calaminta, & apium cum diuretica sint, in multis
non sunt conueniada ad cruditates primæ regionis
vellè curandas. 93.a
Calaminta si extra admoueatnr vim epistasticam ha-
bit si verò introsumatur vim diaphoreticam continet
117.a
Calor supramodum calefaciens siccat 66.d
Calor rufus liuis cruditas ostendit. 57.a. & b. c. d. & 58.a
Calor liquefaciens, quæ a frigore crassifacila fuerit. 65.d
& 66. & 67.
Calor crassifacit ea, quæ a frigore liquecunt ibidem, &
66. & 67
Cancer ex sanguinis parte crassa melancholica frigida fit.
28.c
Caput debile fouendum. 71. b. & excitandum ad collisionē
TOMAS IERTIUS.

faciendam in affectibus frigidis, excutibimla magnâ
flamma ignita. & sicca. 71. c. & d
Caro, quæ magis, & minus recipitur ac retinetur. 26. b. c
Caro diuiditur in speciem carnosam vel genus carnosum,
& in corpora flida. 25. d. & 26
Caro in qua maior & minor cruditarum copia colligit po-
test, maiores efficiens obstructiones, tensiones, ac tumo-
res, triplex est, nam vel est caro musculorum, aut visce-
rum, seu glandularum. 26. b
Cassus difficultis concollionis, & improbi est succi, & plu-
rimi excrementi, ideo facile cruditas procreat. 23. d
Causæ procreantur illæ & cruditarum pituitosarum non sunt.
42. & 43.a
Causæ exterioris cruditarum mordacitatem notæ sunt ibid.
Causa prima cruditarum primò auferenda, est fluxio cru-
ditatum. 6. c
Causa prima generationis, & fluxionis pituitæ est fundus
ventriculi. 62. b
Carbones ex sanguinis parte crassa melancholica calida
sunt. 28. e
Cappares ponit Galenus ad hypochondriorum gravita-
tem, ad lenis duritiem. 104. d
Calor naturalis concoquens membri obstructi. vel terti,
vel tumefacti ita debilis quandoque fit, ut nisi sit fu-
neatur, cruditates obstruunt, seu tensionem efficiunt,
vel tumefaciunt nunquam coquere possit, ideo
tunc is fouendus. 70. c. tribus modis calor naturalis il-
le ad hanc accedere potest debilitatem ibidem d. &
71. a. & b. pro calore naturali debili ventriculi foun-
do, & misferere, & panere, & lenis, & hepatis ca-
lore innato fouendo ibidem. b. Ad calorem tunc debi-
lem alicuius membri excitandum pro coquendis cru-
dis succis cucurbitula sicca magna valde ignita ad-
monenda, & fomenta, & suffumigia pro vero, me-
senterico, siene, hepate, pulmone, & capite 71. c. & d.
& umbilico, & intestinis 72. a. qui calor naturalis est
intrinsecus fouendus est vi vino 72. a. & b. & piperis,
& zingiberis, & diatriopiperis, & diaspolitico. 72. b
Calor innatus primum agens naturale corporeum, salu-
bre, & insalubre in arte medica perpendendum. 77. d
Calidi innati languide coquentis debilis auxiliatiua, cal-
issima, maturatiua, & ad consequendum exeatima
remedia externa. 97. & 98. a
Caloris innati debilis in præcordiis turgidis, & inflatis.
auxilia interna piper longum, album, & nigrum,
zingiber, & diatriopiperon, & diaspoliticon. 98. c.
d. & 99

Calidum innatum debilem coquentem fontentia interna,
ad cruditates pituitosas secundæ regionis emendas.
107. b
Catarribus vitium est facultatis alteratriæ cerebri vel
intemperati, vel instrumenti alteri lesi. 12. b
Catarribus quandoque per accidens gigni possit ob cere-
bri facultatem collicivam, seu alteri atriæ lesam, sine
cerebri intemperie, & sine eius instrumenti lesione.
12. b. si d. raro, Per se vero, & sequenter fit cerebro
offenso in intemperie, vel in repletionē ibid.
Catarribus a cerebri intemperie frigida. 12. c
Catarribus a cerebri intemperie calida. 12. c
Catarribus a cerebri intemperie humida. 12. c
Catarribus a cerebri intemperie sicca. 12. c. d

Index locupletissimus

Catarribus à cerebro laeso per consensum à toto, vel à parte aliqua. 12.d
Catarribus à cerebro laeso per consensum magis à ventriculo fit, quam à toto, & ab alijs partibus. 13.a
Catarribus in epiglottide gignitur. 13.a
Catarribus à quacunque causa oriens cerebrum, & nasum intemperatum efflicere solet. 12.d
Catarribus à capite ad asperam arteriam, ad pulmones, ad naves, ad spinalem medullam descendens quos parat morbos. 14.a
Catarribus à capite ad ventriculum ruens, tunc rutilus acidus efficit. 14.a
Catarribus ad intestina descendens excrementa spumosa reddit ibid.
Cerebrum sua frigidityte, & humiditate instrumentum est puritatis improprie dictam generans, per accides, qua puritas mucosae proprie appellatur, vel deffilationis, ut deffilationis fons. 12.a. & b. unde catarribus.
Cerebrum per consensum à toto, vel ab aliqua parte laesum. 12.d
Cerebrum magis à ventriculi consensu laborat, quam à toto & ab aliqua alia parte. 13.a
Cerebrum, & ventriculus duo fontes sunt cruditatum pituitosarum. 13.a
Cerebrum roborare debemus, mucum seu deffilationem gignens. 74.a
Cerebri deffilationem procreantis frigiditytas, ac humiditate intemperati stillicidium roborans aquae apotantae, vitiones, & caneria, & heretiones ab Hippocrate inuenta; quos debent esse ab Aetio ex Archigene statuantur. 102.b. & c. sinapismata, & ceratum capitale Montagnanae, pulveres ibid.
Cerebri deffilationem gignens caliditate, ac humiditate intemperati roborans stillicidium aquarum: ceratum. Pomum odoratum. 103.a
In cerebro putris falsa fieri potest à calore combustivo, sine ulla putredine: Nam sibi putredo adesset, etiam necessario lei hargus adesset ex Galeno. 10.b
Ceratum ad ventriculum roborandum. 101.b
Color cutis praeternaturalis à succo emergit, non autem à partibus solidis, nec à specie carnosa. 57.b. & 58.c
Cichoreum tres habet facultates. 108.c
Ciborum corruptiones tres primae sunt generalissimae differenciae. 5.d
Cibi appetentia vehementissima à melancholia emanat. 28.c
Cholera curatio ab Hippocrate molita. 82.d
Compositiones regionum cruditatum, & cruditatum ipsarum pituitosarum cum mordacibus. 80.B. 1. vsque ad fol. 87
Compositiones regionum cruditatum quos sunt, quoque harum compositionum indicationes à Galeno statuta sunt. 80
Compositio cruditatis pituitosae prima regionis, cum secunda regione affecta quales indicationes possulat. 81.b. & c
Compositiones cruditatum pituitosarum primae regionis, cum secunda regione affecta novem sunt. 81.d
Compositionum harum novem comparatio quo ad facilitatem, & difficultatem curationis harum cruditatum. 82.a. & b
Compositiones cruditatum pituitosarum prima regionis,

& cruditatum mordacium secunda regionis novem sunt, & quomodo conveniant, & differant ab alijs novem compositionibus aliatis, earumque indicationes. 82.c. & d. & 83.a
Compositiones cruditatum copiosarum ex pituitosis primae regionis cruditatibus, & ex mordacibus tertia, & quarta regionis indicationes insinuantur à Galenista, & exemplis Galeni, & Hippocratis explanantur. 83. & 84
Compositiones cruditatum pituitosarum prima regionis, & cruditatum mordacium tertia, & quarta regionis novem sunt. 84.a
Compositionum harum novem cruditatis pituitosae prima regionis, & cruditatum aerium tertia, & quarta regionis comparatio, commentaria, & dissolutio, quo ad maiorem, minorem & nullam curationis ponderationem vena sectione, alteratione, & purgatione administratione. 84.b. & c. & d
Compositionum cruditatum secunda regionis, cum tertia, & quarta regione indicationes quales sunt harum compositionum novem modi sunt. 85.a. & b. harum comparatio quo ad maiorem, minorem, & nullam considerationem habendam curationis vena sectione, alteratione, & purgatione molenda ibid. c. & d. & 86
Compositiones regionum omnium quatuor cruditatum. 87
Compositionum omnium quatuor regionum cruditatum indicationes. 87
Compositiones omnium quatuor regionum cruditatum duo genera sunt: primum enim genus est dum in prima, & secunda regione pituitosae cruditates cernuntur, in tertia vero & quarta regione cruditates mordaces habentur: secundum autem genus est si in prima tantum pituitosae fuerint cruditates, & in tribus reliquis mordaces sint. & quodlibet genus viginti septem compositiones cruditatum habet. 87
Compositionis cruditatum prima, & tertia, & quarta regionis recta curatio. 123.d
Compositionis cruditatum secunda, cum tertia, & quarta regione curatio recta à Galeno constituta. 124
Compositionis cruditatum omnium quatuor regionum recta curatio. 125. & 126
Concoctiois nomen cruditatis nomini opponitur. 3.c. d
Concoctio in venis crudorum sanguinem similis generationi puris perfecti est. 48.a
Concoctio sanguinis quatuor habet gradus, primus enim gradus in hepatis cavo, secundus in hepatis gibbo, tertius in sinu venosus generis, quartus in ventris partitione extremis. 47.d. ultra quod etiam prima chylis alteratio sanguificandi in mesenterio fit vbi, ubi prima rubedo à chylis acquiritur, ab consensum parenchymatis intestinorum. 13. d
**Concoctionum, & cruditatum generis venosae signa diagnoscit à vera ex urinis desumpta à fol. 47. vsque ad fol. 56
Concoctionum, & cruditatum mota generis venosae ex urinis desumpta ita certa habentur, sicuti totius corporis mota ex sudoribus accepta certa existunt. 56.d
Concoctionis dispersata signum. 72.b
Concreviscent enim sunt à frigido, vel à calido. folio 66.c**

Rerum notabilium.

Concretio, & crassatio differunt. fol. 66. b. & conuenientia.

Concreta à frigore, & à calore, non amplius solubilia sūt, neque liquefunt. 66. b. sed molliora sunt. ibid. c. & d.

Concreta urinae vide prima concreta.

Concreta adhibere gradatim, & interquiescere oportet, ut natura recreetur. aut Hipp. 67. c. d. & 68. a.

Corroborantia remedia ventriculi, mesenterie, iecurioris, licetis, & v. eri à febriliflorumore curari, ne de nouo noxas recipiant ille partes fluxiones. 12. i. d. & 12.2. De coctis prohilicidis, sūsum igeo, et somento ad febriles aditus dos & modus, o. do, ac tempus, quo eo v. i debemus, ut pars febriliflora eodem tempore, & curata, & roborata maneat, ne de nouo afficiatur. 12.2. a. certum ad idem ibid. b.

Corporis totius modus, & ordo curationis. 12.6. a.

Craffescunt omnia, quia prius liquida fuerant. 66. b.

Craffatio, & concretio differunt. fol. 66. b. & conuenientia.

Craffa liquescunt, & concreta mollescantur. 67. a.

Craffescunt omnia à calidi, vel à frigido. 66. b. & c.

Craffatum recte agnoscendum, recteque curandum doctrina necessaria, ac v. illissima a. b. 1. a.

Craffatiles saepe difficilis sunt cognitionis, ac difficilis curationis. 7. a.

Craffatiles licet facili cognitionis, attamen difficilis curationis interdu sunt. 2. a. Primum necessarium ad agnoscendum craffatiles, de his craffatilibus recte agnoscendis, recteque curandis agendum proponitur ibid.

Craffatiles car curatu difficiles. 2. a. & b.

Craffatiles nomen, eius essentiam denotat. 3. c. d.

Craffatiles nomen concretiois nomini opponitur ibidem & 4. c. d.

Craffatiles nomen. 3. d.

Craffatiles forma ibid.

Craffatas vitium est, & frustratio concretiois generat accepta 3. d.

Craffatas vel pruinato concretiois est, vel deprauatio concretiois, de qua hic intelligitur agere. 3. d.

Craffatas, qua deprauatio est concretiois triplex habetur, nam vel per modum craffatilis, vel per modum aduersionis, aut per modum corruptionis fit: hic autem de duobus craffatilis modis primis potissimum sermo est. 3. d. & 4. a.

Craffatilis causa est coctricis virtutis frustratio. 4. a.

Craffatilis primum causarum genus est vitium concretiois laesa alieuius membri coquentis substantia offensa. 4. a. & offensa vel in intemperie vel in laesione instrumentali ibid.

Craffatilis secundum genus causarum tres species habet: Prima enim species est excrementorum retentio, secunda est uicibus, & potius incommoda exhibitione, vel coctio, vel qualitate, vel intemperie seu ordine, commissa; Tertia est uigilia, vel somnus exiguus. 4. b. & c.

Craffatilis quartum genus causarum est, & nimia uenus, & animi perturbatio. 4. c.

Craffatiles est quatenus à perfecta sanguificatione distat. 4. c.

Craffatas non solum nomen, forma, et vi concretiois contraria est in methodo curatiua, sed etiam in methodo praeseruatua. 4. c. d.

Craffatum genera tria sunt. 5. & 6. a.

Craffatum primum genus vitium est concretiois deprauata per corruptionis modum generum. 5. & 6. a.

Craffatum secundum genus vitium est concretiois deficiente per craffatilis modum emanans. 5. & 6. a.

Craffatum tertium genus vitium est concretiois excedentis per modum aduersionis procreatum. 5. & 6. a.

Craffatum duo posteriora genera dignoscenda, & curanda Galenus dilucidat in libris de tuncda sanitate. 5. & 6. a. ideo sic de his agit Autor. 5. d.

Craffatilis definitio opepiam non includit. 5. a. neque ster corariam includit craffatilis ibid.

Craffatilis per modum corruptionis orta curatio in hoc opere non tractatur, cum eius curatio facilis sit per vomitum, & quia à sanguinis natura nimis recedit, ut est bilis Zonaria, qua venenum est, & bilis proflua, qua est minus venenum sit, attamen ipsa quoque venenum se habet. 5. c.

Craffatum genera penitus dilucidanda duo sunt, nempe genus craffatum pituitosum ante sanguinis generationem per craffatilis modum, & per deficiam exortum; & aliud genus craffatum acutum seu mordacum post sanguinis generationem, & per aduersionis modum per excessum generum. 5. 7. & 8. a.

Craffatum hoc duo genera seorsum contraria sunt. 6. a.

Craffatilis pituitosum, & mordacum generalissima definitio. 6. b.

Craffatilis pituitosum generica definitio. 6. b.

Craffatilis acutum, et mordacum generica definitio. 6. b.

Craffatilis pituitosum quomodo à ventriculo, & quomodo ab hepate promanet. 6. c.

Craffatas propriissime vocata tantum pituita est quia ea solum per modum craffatilis gignitur. 7. c.

Craffata pituita in primis uenis existit, à bile coneani hepatis egrediente per vomitum educitur. 7. d.

Craffatum recentium acutum dispositio facta à Galeno Plethora improprie nuncupatur. 8. a.

Craffatilis recentis antequam morbus fiat, eorum vacuati di, sed febre iam facta non sunt euacuandi sed praeparandi. 8. a.

Craffatilis pituitosa, melancholica, & biliosa nota. 8. a.

Craffatum pituitosum generis tres sunt differentia, qua tenus magis à sanguinis forma recedunt, & ad cacochymia essentiam accedunt. 8. b. c.

Craffatum mordacum genus tres habet differentias, pro vi magis, vel minus à sanguinis natura distans, & ad cacochymia formam accedit. 8. c.

Craffatilis catarrhalis causa tres sunt, 12. a. & b. c. d. & 13. a. vide catarrhum.

Craffatilis acutum, seu mordacum genus in bilium amarum, bilem acidum, vel atram, & in melancolicum, itaque in tres eius species feruntur. 14. b.

Craffatum regionem, seu loci in nostro corpore quatuor sunt. 14. a. & b.

Craffatum prima regio in centro, seu profundo humani corporis, nempe prima uena, prima uena uena porta, canitares, & intestina. 14. b. c. d. & 13. a. b.

Craffatum prima regio cui sic vocatur. 14. c.

Craffatum secunda regio est finis uenis, & aeris totas uena caue, qua ad partes solidas, & siccitatem cornosam

Index locupletissimus

- fam ad eum etiam nutritum sanguine proba de-*
labunt. 25. a. b.
Cruditatum tertia regio est, iam in partibus solidis quam
genere carnos. 25. c. d. & 26. & 27. a.
Cruditatum tertiam regionem tendit extrema porositat-
um ingreditur. 25. d. & spectat, seu porositates ibid.
Cruditatum quarta regio cuius est, 27. a. & b.
cruditatum acrimon ab hepate gignitur sympathia quo
ad partes lasas. 27. c. d. & 28.
cruditatum generum compositiones. 29. a. b. & 30.
cruditatum generum, & specierum compositiones. 30. b.
cruditatum bulbarum, & pituitosarum compositio, &
affectio pessima est, ex qua compositio semitertiana
sua cedere solet, quaque compositio Plurimi vixit die
vigessimus. 30. a. b. & 31. a. b.
cruditatum pituitosarum, & mordacium differentiarum
compositiones nonnulli habentur. 30. d.
cruditatum regionum compositio. 31. a. si ex inueniuntur
ibidem.
cruditatum acrimonia tertia, & quarta regionis sympathia
varia, pro re ab hepate varie partes, varique copia
mordacium cruditatum sunt. 31. a. b. & 28.
cruditates acres a capite attrahuntur, & catarrho comif-
sentur. 28. a.
cruditatum prima regio duas continet partes. 32. a.
cruditatem in aliqua regione & regionis parte melle, &
vocatur, nam fore ex quinque signorum fontibus, seu ge-
neribus dignosci potest. 32. b. Primo enim genere ex
affione facultatis coctivis offensae partis organica
alterationis obnoxia: secundo modo ab excrementis
excrementis: Tertio modo ab acidis, quae ex lasa se-
de oriuntur. Quarto modo a situ partis d. cruditatibus af-
fectis: Quinto vero modo a partis cruditatibus labo-
rantis naturalis conformationis, seu figuratione ibidem
& 33. a. b. c.
cruditatum pituitosarum prime regionis nota recta ab
affione ventriculi vitiosa desumuntur, sed quia in ven-
triculi affione vitiosa vultus emergunt, ideo de ea so-
lutione affecta per vultus dignoscenda agitur. 33. d. &
34. a. b.
cruditates non solum iam solae praesent, sed etiam futurae d.
vultibus dignoscitur, quia in ventriculi fundo melle so-
let. 33. d.
cruditatum prima regionis signa diagnostica, ex male vi-
ellus ratione praesent, & ab alijs ex: terna tribus et tri-
butus, desumuntur: nempe ab excrementis in corpore
existentibus, ex cibis, & ex vultibus, vel somno exigua.
34. d.
cruditatum prima regionis copia pituita, in ventriculi
fundo genita, a dejectionibus desumuntur nota recta,
& tertia. 35. a. & b. & ex vomitionibus. 35. c.
cruditates in ventriculo genitae per deiectiones, & vomiti-
ones agnoscuntur in cerebro vero genitae per nares
expurgantur, & dignoscuntur, in hepate vero gibba,
& in venis per vrinam, in thorace vero, & pulmone
per tussim expelluntur, & agnoscuntur: 35. a. b. & c.
cruditatum prima regionis copiam ex formatione, seu fi-
guratione partis afflictae mutata a suo statu naturali,
tamquam ex notis scientificis deprehendi posse, ostendit.
35. d.
cruditatum prima regionis copia ex acidis, eas eru-
ditates consequentibus nota desumuntur. 36.
- cruditates mordaces quartae regionis quomodo curari*
debet Galenus nos docet. 41. b. c.
cruditates mordaces secunda, tertia, & quarta regionis,
quomodo curanda, nos docet Galenus. 41. b. c.
cruditatum crassarum, & serosarum, & medietatum nota,
41. d.
cruditates pituitosae, & mordaces vicissim contraria sunt
unde quoque harum cruditatum nota contraria sunt,
ex ocio, & multo labore desumpta. 42. & 43. a.
cruditatum secunda regionis nota. 43. b. c.
cruditatum secunda, tertia, & quarta regionis nota in
generi. 39. a. b. c. in specie 39. d. & 40. a.
cruditatum copia curanda mensuratur praesentia a capella-
te loci lesi desumenda. 40. c. d. & 41. a.
cruditates suis speciebus distinxit, secunda, tertia, & quar-
tae regionis, nos dignoscere debere statuit Galenus a su-
dores, ex sapore deprehensio. 44. e.
cruditatum secunda regionis ex vrina consentientia, colo-
re, quantitate odore, sapore, & conuentis nota habentur.
46. b.
cruditatum in venis concessio similis est generationi pu-
ris per se. 48. a.
cruditatum, & concessionem generis venosi nota ex vri-
nis desumpta a fol. 47. si per ad fol. 56.
cruditatum nota ex vrina subvagali desumpta. 53. c. d. &
54. & 55.
cruditatum & concessionem nota generis venosi ex vri-
nis desumpta: tertia desumpta, sicut totum corpus nos
ex sudoribus accipere certa ex: sunt. 56. d.
cruditatum prima, secunda, tertia, & quarta regionis si-
gnata nos ex caloris & frigoris sensu, & ex colore
coloribus corporis a Galeno declarantur, & ad au-
toris explanationem. 57. a. & b.
cruditates mordaces, & celeres ab accidentibus a calore
ortis dignoscuntur sicut cruditates putrescentes ab acci-
dentibus a frigore, sicut patet per se. 57. c. & d.
cruditatum obstruendi, nes, tensionis, & signum in
partibus solidis, in specie carnosae, & in vultibus exte-
rioribus quae si secunda & tertia regionis sunt, atque ad tertia
regionem extremas habent, vultibus reducuntur
no. 58. c. d. & 59. a. & b.
cruditates partes debiles reddere possunt. 19. b. & ca-
sum functiones ledere ibid.
cruditatum curandarum duae sunt indicationes sunt
in methodo praeservativa. 60. & 61.
cruditatum 16. de curandarum a Gal. in methodo. 60. d.
& 61. a.
cruditates a Galeno in libris tunc de sanitatis consideran-
tur relatae ad lassitudines, in methodo praeservativa,
sin praeservativa, non autem ad morbos speculantes, in
methodo curativa, ideo cruditates solae auras habent
indicationes, non autem tres. 60. d. & 61. a.
cruditatum prima regionis indicio prima est remissio-
na, seu de cruditata, secunda, est evacuatio. 61. e. & d.
tertia vero est partis fluentis, & manducantis emenda-
tiva. 62. a. & b.
cruditatum prima etiosa tollenda fluxio est. 61. c.
cruditatum primae regionis eger indicationes sunt, &
ad aquatam. sin praeparativa tum cruditatum, tum vig-
tum corporis, tum calidi innati coequentis excitativa.
62. c. & d. usque ad 72.
cruditatum primae regionis ad praeparatum, seu praeparatum d.
Medi-

Rerum notabilium.

Medico faciendā, per alterantia contraria fieri debet, 63. a. & b. In qua agenda de alidit cruditatibus nos abstinere debemus, & de quocumque motu ne hae cruditates in secundam, ac tertiam regionem ferantur, & ne multa aegrotantis iactura superveniant ibid. c. Similiter eadē ratione d' imbecis nos cavere tenemur ibid. c. & ab omnibus cutaneis remedijs, & a calore eglis intemperato ibid. & d. & 6

Cruditatum prima regionis copia, dum preparatur, vnde cum preparantibus & cum vitijs ratione, ea, quae mihi summe alium subducunt, committenda sunt sol. 64. d. & 65. a

Cruditates crassa coquenda, & preparanda sunt, tennes vero illico educenda 65. e

Cruditates in venulis extremis, & in corporis habitis residentes prius coquenda, & preparanda, postea diaporeticis extrinsecis per cutem resoluenda. 65. e

Ad cruditates addejuandas contrarijs alterantibus gradatim progrediendum est, & interquiescere oportet, ait Hipp. ut natura recreetur. 67. c. & d. & per vires plures, I. per epieresim cruditates curanda sunt: Vtrū id observandum sit in cruditatibus primae regionis ibi. & 68. a

Ad cruditates rellē curandas prima regionis quatuor, & septem diebus pro nutrimento incidentibus, ac de te a foris tātum alterare debemus, & quae nam sint ista haec alterantia pro nutrimento danda 67. d. & 68. a

Cruditates summe copiosae dum non evacuanda sunt, tunc loco carum vacuationis, iunctio, ienatio, deterfio, & revulsio seu derinatio conveniunt. 68. a

Cruditates copiosae praesentes, virium autem robore absente, alio vitrendum, scilicet andam, & renellendū est. quousque vires valida fiant. 72. d

Cruditatum prima regionis indicatio vitalis. 74. b. c. & d. quae duplex cernitur, vel enim a tota universa totius corporis virtute natura substantiā, vel a particulari membri lesi virtute substantiā roboretur & habetur: triplex virtutis natura substantiā, simul cum suo originali temperamento indicatione hac vitali conferuanda, hoc est spiritus calidi innati corpora solida, & species carnosae. 74. d. & 75

Cruditatum pituitosarum prima regionis indicatio vitalis a tota universa totius corporis natura desumpta, tribus perficitur, nimirum alimentis euehymis, I. probi succi, facili digestiois, & minimi exercitii; quae exemplis ab Hipp. & a Galeno ad verbum desumptis, dilucidantur. 75. b. c. & d

Cruditates cur interdu longotratu temporis, difficillēque curantur. 76

Cruditates ita difficulter adimuntur, ut sicuti gutta lapidem excavat ibid. b

Cruditates quando mutabiles sunt, & ex quo dignoscantur haec cruditates. 76. c

Cruditatibus curandis in lipothymia panis vino in adesa sunt conducit. 76. c

Cruditates incurabiles existentes, quomodo ex pulsorum mutatione dignoscantur, & i pulsus lipothymiam venturam praenunciant; unde ex prognostico, nos Medici inculpabiles moris aegrotantium evadimus. 76. c

Cruditates si corruptantur, siue phlegmone, tunc cruditates lethales sunt. 76. d

Cruditates lethales sunt etiam ubi haec extrema fuerint;

qua ex urina penitus aquosa non afflicta, ne tenni dignoscuntur, ut signum desperatae concelationis, ut etiam est urina elata missa, & paulo postea turbatur, non a friguitate aeris, sed ex se ipsa. 77. a

Cruditatum tam pituitosarum, quam mordacium secundae regionis indicationes, quae nam sint. 77. b. c. d. & 78. a

Crudi humores preparandi sunt, specifica proprietate, remedium, simulque membri lesi a tota substantia, considerati remedijs diluendo. 77. c

Cruditates prima regionis facilius per vomitum, & per alium educuntur. 77. c

Cruditates secundae regionis facilius per feces, & per urinam vacuantur. 77. c. d. & per sudorem ibid.

Cruditatum rellē curandarum ordo. 77. d

Cruditates in eunda regione magis periculosa sunt, quā in prima. 77. d

Cruditates secundae regionis quas iacturas inferant. sol. 77. d

Cruditatum acrimia tertia, & quarta regionis indicationes habentur. ut, & exemplis Galeni materia praesidentium dilucidantur. 78. & 79

Cruditates biliosae naturae sicut contraria sunt cruditatibus pituitosis, ita etiam contrarias habent indicationes indicationibus pituitarum. 78. b

Cruditatum biliosarum omnium indicationes desumuntur. 78. & 79

Cruditates tertia, & quarta regionis vomitum prohibet. 79. a. & b

Cruditatum regionum compositiones quot sint & quot harum compositionum a Galeno statuta sint. 80

Cruditates mordaces in genere venoso existentes ab Hippocrate educantur per vomitum, & per alium, dum natura vergebat ad eam mittere parietem. 82. d

Cruditates pituitosae in prima tui in secunda regione compositae quales habent indicationes. 81. b. c. haec compositiones novem sunt. 81. d. harum compositionum novem comparatio quo ad maiorem, & minorem considerationem curationis per venae sectionem, purgationem, & alterantem administrandam. 82. a. & b

Cruditatum mordacium secundae regionis, & cruditatum pituitosarum prima regionis compositiones novem sunt, & quomodo conveniunt, & differant ab alijs novem compositionibus allatis, & earum indicationes. 82. a. d. & 83. a

Cruditatum compositionum ex pituitosis prima regionis cruditatibus, & ex mordacibus tertia, & quarta regionis indicationes desumuntur a Galeno statuta, & Galeni exemplis illustrata. 83. & 84

Cruditates prima regionis a quibus attrahi, aut impleri possunt ad tertium, & quartam cruditatum regionem 83. b. c. & iactura hinc fieri possunt ibid.

Cruditates acres tertia, & quarta regionis a quibus attrahi, seu impleri possunt ad secundam, & primam cruditatum regionem, & hinc iacturae fieri possunt. 83. c

Cruditatum curationi quae conducunt paucae sunt, quae vero obsunt plura cernuntur. 83. e

Cruditatum curationi septem conferunt. 83. e. nempe collectio, vilius ratio congrua, quae mixtum subducit, cuius rarefactio, acrimia eductio siue pituita attrahitur, aer temperatus ad calidum, & siccum vergens, discutiens, statum hypochondriorum, & a rebus confus-

Index locupletissimus

- confectis indicatio defumatur. 83. d. & 84. a
- Crudiatum pituitosarum prima regionis, & crudiatum mordacium tertia & quarta regionis compositiones novem sunt. 84. a. & harum comparatio quo ad maiorem, minorem, & nullam considerationem curationis earum venafectio, alteratione, & purgatione molienda. 84. b. c. & d.
- Crudiatum, quod ex secunda regione, & ex tertia & quarta regione componitur indicationes defumatur. 85. a. b. harum crudiatum novem compositiones ibidem b. comparatio earum quo ad maiorem, minorem, & nullam considerationem habendam curationis vena fectio, alteratione, & purgatione administranda ibidem e. d. & 86.
- Cruditates in secunda regione existentes semper ad primam transferri debent regionem. 85. d. servata aegri consuetudine ibid.
- Crudiatum recte curandarum agrorum consuetudinem observare debemus per quam vitam patientis solutus sit, eas evacuari cruditates naturaliter. 86. a
- Crudiatum compositionum omnino quatuor regionum indicationes. 87. harum compositionum duo genera sunt, & quinquaginta quatuor d. ferentur ibid.
- Cruditates prima regionis recte curanda non petunt sanguinis missionem per venam causam sed per venam portam hemorrhoidalem, & quando, & iactura quae fieri, sicut per venam causam sanguis mitteretur. 89. a. & b.
- Cruditates pituitosa in ventriculi fundo residetes, ad primasque venas fluentes, & fluxura per vomitum volucendae sunt, & preparanda ad vomitum agendum; Deinde aliae cruditates in primas venas iam fluxa ad purgationem alvinam disponenda videntur. 89. c. & d. & 90.
- Cruditates in prima regionis & secunda, ac tertia detorsoria externa, quae ad movendum sunt eo tempore, quo vias relaxantia applicare non licet. 95. d. & 96.
- Crudiatum prima regionis vitarum quod dense, obstusum, refractumque sicut laxativum, & mollius, & aperitivum extrinsecum remedia. 96. b. c. d. & 97.
- Crudiatum prima regionis calidi innateloquentis languidis debilis auxiliativa calassima, & maturativa, & excitativa externa remedia. 97. & 98. a
- Crudiatum pituitarum prima regionis lenientia medicamentis optima sunt, solutiva autem acriora mala. 99. d. & 100. a. & b.
- Crudiatum prima regionis recte curandarum vultus ratio ab Hipp. & a Galeno statuta. 103. d. & 104.
- Crudiatum recte curandarum prima regionis vultus ratio ab Hipp. & a Gal. constituta octo conditiones habere debent. 103. d.
- Cruditates prima regionis ubi solum sint pituitosa solo oxymelae, ac prasinum, & musco ex quo tanquam nutrimento teni, incidente, ac detergente curandae sunt, inquit Hipp. & Gal. 103. d. & 104. b.
- Crudiatum copiosum laborantes plus in signa nutriendi quam in prandio. 105. b.
- Crudiatum pituitosarum secunda regionis curatio. 105. c. & d. & 106. r quae ad 109.
- Cruditates prima regionis si ad secundam, & tertia perveniant quinque iactura ferent. 126. b.
- Crudiatum activum secunda regionis curatio quando per venam c. bini s. flamm, quando per hemorrhoides, & quando per venam malioli, & postea per purgationem molienda eii. 106. c. & d.
- Crudiatum pituitosarum, & mordacium, quae iam purgata ceu nunt, secunda regionis purgatio. 108. a. c. & b.
- Crudiatum secunda regionis pituitosarum, & mordacium recte curandarum vultus ratio administranda. 109.
- Crudiatum tertiae regionis decem primis diuini solae, sorbutione exortum praeferenda melle mixta, & vino albo aquoso videbatur sed nunc hae non competunt. 105. d.
- Crudiatum tertia, & quarta regionis duplex evacuatio, nempe alvina, & emanea. 110. a
- Cruditates tertia, & quarta regionis prius ad alvinam purgationem molendam preparanda sunt ibid.
- Cruditates tertia, regionis in parte interiori existentes alvina purgatione curantur, quia in ventris sunt; illa vero in parte exteriori, & in spina, per porositatem per enim diaphoreticis, & epispasticis remediis curantur. 110. b.
- Cruditates tertia regionis in parte exteriori porositatem existentes, antequam per cutem diaphoreticis, & epispasticis evacuentur remedia prius interni, & externi mactantibus, & ad aquam sicut purgationes sunt, & pluries, & undique evacuanda sunt alvina, & sortibus solutius quo ad pectus non possunt eodem tempore quo diaphoreticis, & epispasticis utuntur, etiam singula hebdomada semel alvina purgatione valida purgare debemus. 110. c. & d. & 112. a & b.
- Crudiatum tertia, & quarta regionis purgatio, ad evacuationem cutaneam, seu diaphoreticam in iis, quibus agendum, tam internam, quam externam. 114. c. d. 115. & alimentaria. d.
- Crudiatum tertia, & quarta regionis universi corporis evacuatio cutanea, tam diaphoreticam, quam epispasticam variis praesidiis molenda dilucatur. 116. c. & 117. & 118. 119. & 120. & 121.
- Cruditates ferri curanda sunt per enim diaphoreticam, & epispasticam vacuaturae. 120. a
- Crudiatum compositionum prima, & tertiae cum quarta regione recta curatio a Galeno constituta. 123. d.
- Crudiatum secundae, tertiae, & quarta regione recta curatio a Galeno constituta. 124.
- Crudiatum compositionum omnium quatuor regionum recta curatio. 125. & 126.
- Cucurbitula sicca magnaeque flamma ignita admodum valet paribus frigidis, & humidis succis obstruendis, sensibus, ac tumefactis, ac calore innatis iam his succis debilem reddendum excitandum, pro concussione horum sic eorum agenda; nam ea cucurbitula consistit & apud, pulmonis, intestino, pancreas, licet, hepatis, umbilico, intestinis, & venter. 71. c. & d. & 72. a. & b. & 113. c.
- Cucurbitula sicca veluti incavamentum est inquit Gal. in doloribus. 71. d.
- Cucurbitula sicca citra evidentem calfactionem suam opus efficit. 72. a.
- Cucurbitula sicca epispasticam vim continet ac cutem trahendo, & insensibiliter evacuando. 113. c. & d. & 116. d. & 117. a. prius tenei locum. 121. b.
- Cucurbitula sicca diaphoreticis non praesidium per acritas est. 121. b.
- Cucurbitula ad movenda tumoribus duris frigidis omnes Galeni

Rerum notabilium.

Galeni loci colliguntur. 12. l. b. in margine.
 Curatio scopis peritur. 60. a
 Curationis totius corporis cruditatibus laesi, modus, et ratio.
 et regula. 126. a
 Cuius color prater naturalis a fuce fit, non a partibus. 57. b. et 58. c
 Cutaneis morbis remedia adhibenda a f. 111. usque ad fol. 118
 Cutanea remedia. 79
 Cutanea euacuatio insensibilis cruditatem tertiam, et quartam regionis diaphoretica preparantia interna, et externa. 114. c. et d. et 115. et alimenta.
 Erythra ab hepate attrahi nequit interdum mesenterico obstruendo. 59. b
 Erythrasia laesa ab excrementis prater naturam genitis dignoscitur. 35. a
 Erythra nondum probe coctas a ventriculo, et a iecore plus iusto calidioris attrahit causa est generationis melancholia. 38. d

D

Decoctum pro suffumigando, vel somno ad tumores duos enelendos, vel pro stillicidio. 120. d
 Decoctione diaphoretica in vitro assumentum iuniperi, buxi, ebenei. 111. c
 Deiectione valida potest attrahere cruditates acres a tertia, et a quarta regione, ad secundam, et primam regionem. 83. d
 Deiectionis, et diureticae simulque diaphoretica interna duos contrarios racionis pariter motus eodem tempore, et curatio redduntur: et modi quibus haec remedia agunt declarantur: et quando praesidia utriusque simul iuncta exhibenda sunt, illustrantur. 125. c. et d. 126. d
 Derivatio ad latera fit. 72. d
 Derivatio sex habet differentias secundum latitudinem dorsum, et sinistrorsum, secundum altitudinem anteriorum, et posteriorum, et secundum profunditatem interiorum, et exteriorum. 72. d
 Derivare oportet ubi vacuat, non licet. 72. d
 Detergentia extrinseca competunt ad vicia obstruenda hypochondriorum ante corporis totius purificationem operiendam, ante molliemiam seu laxantiam. 69. c. et d. et 70. a. et b
 Detergentia externa. 95. d. et 96. a
 Diacalamintibus improbat a Galeno in cruditatibus prima regionis recte curandis. 99. b
 Diacalamintibus diuretica, et diaphoretica, quando danda sunt cum diaspolitico, et diatriopiperis deiectione. 125. c. et quando sola diacalamintibus ibidem d. et 126. a
 Diacalamintibus compositis a Galeno descriptis. 115. b
 Diacalamintibus diaphoreticum remedium intro assumendum ad cutaneos affectus, et cruditates tertiae, et quartae regionis recte curandas. 115. a
 Diacalamintibus cum viperina carne comparatur, quo ad efficaciam euacuandi per cutem ibid.
 Diacalamintibus danda ad cutaneos affectus curandos, modo duplex est. 117. a. et ibid. b
 Diacalamintibus praebendi in cutaneis morbis curandis quantitas, ac tempus. 117. b. c. et d
 Diacalamintibus danda in cina, et in prandio tempus.

118. a
 Diacalamintibus post cibum nunquam exhibenda est: nec diaphoreticum pharmacum. 118. a
 Diacalamintibus facultates examinantur. 115. b
 Diacyonium compositum ad concoctionem ventriculi iuvandum. 99. c
 De his eius tempus dandi ibid.
 Diacyonium aromatisatum ad ventriculum frigidum, et humidum roborandum. 101. a
 Diaphoretis est euacuatio insensibilis per cutem admissa franda, distentionibus seu exhalationibus, evaporationibus, auxilio diaphoreticorum externorum agenda. 73. a
 Diaphoretica externa tres concoctionis modos continent. 73. a. et b
 Diaphoretica, et cutanea euacuatio insensibilis cruditatum tertiam, et quartam regionis preparantia interna, et externa. 114. c. et d. et 115. et alimenta.
 Diaphoretica externa. 116. b
 Diaphoretica interna, et epispastica calida, et secca sunt. 116. d
 Diaphoretica praesidia per balneum digerentia evaporatione. 116. b. c
 Diaphoretica omnia fere a saxonia commenerata. folio 118. b
 Diaphoretica virtutis radicem iuniperis contrariescit inter cardanum, et scabigerum. 118. c
 Diaphoretica efficacissima interna sunt spiritus thalictanthi, et sulfuris. 118. c. quae iustissima sunt, ubi moradia ibid.
 Diaphoreticum, nec diureticum post cibum non dandum. 118. a
 Diaphoretica pro densis et parvis partibus ut tandonibus ligamentis promoribus duris laborantibus recte curandis. 120. b. et c
 Diaphoreticum remedium stercoris bubulinum est ab illo pocummentum. 120. a
 Diaphoretica a, et diuretica, et deiectionis pharmaca quomodo suum opus efficiant. 125. d
 Diaspolicum iuvat concoctionem. 72. b
 Diaspolicum virtus. 98. b. eius compositio duplex ex Gal. ibidem d. et 99. a
 Diaspolicum modi praebendi: et observatio in eius compositione. 99. a
 Diatriopiperis iuvat concoctionem. 72. b
 Diatriopiperis praebendi modus, ac tempus. 99. b. atque dosis ibid.
 Diatriopiperis commendatio. 99. a
 Diatriopiperis simplicis constitutio ibid.
 Diatriopiperis compositio ad capitis fluxiones valet. 99. b
 Diatriopiperis simplex ad cruditates primae regionis valet. 99. b
 Diatriopiperis deiectionis, et diacalamintibus diuretica, et diaphoretica, quando simul iuncta praebenda sunt. 125. c
 Digna, seu iudicia quod emolumentum inferat ad cruditates recte curandas. 75. c. euacuata per acidos ibid.
 Dieta nimia succis aeribus iacturis infert. 109. b
 Digerentia calida, et humidum. 96. b
 Digerentia in cruditatibus secundae regionis recte curandis interna. 107. b

Index locupletissimus

Digercntia externa in duplici sunt genere. 97. b. vel enim proprii, vel diaphoretica. ibid.
Digercntia proprii tantum ad cruditates primæ regionis recte curandas conveniunt, non autem diaphoretica. 97. b. & 113
Digercntia omnia calida, & humida sunt, sicut laxantia conueniunt ibid. & 113
Digercntia aliqua improprie dicta calida, & secca sunt, rarefacientia quæ diaphoretica sunt ibid. & 113
Digercntia mollicutia communerantur. 97. c. & d
Digercntibus per se & aliis, & humidis, alia digercntia, per accidenti, quæ calida, & secca sunt admodum scdâ, attamen pauca ne tumores duri lapidescant. 114. a
Diureticorum natura. 63. c
Diuretica ad cruditates primæ regionis recte curandas obstant. 93. a
Diuretica damnantur in cruditatibus primæ regionis recte curandis à Galeno. 99. b
Diureticum non dandum, nec diaphoreticum post cibum assumptum. 118. a
Diuretica, & desilioria pharmaca duos seorsum contrarijs efficiunt motus, scilicet in corpore: & est ratio redditor: & modi, quibus istas remedia agunt, declaratur, & quando proficidia hos simul iuncta danda sine explentur. 125. c. & d. 126. a
Dolor grauior à pituita copiosa. 36. b
Dolor hypochondriorum à flatu emergens quemodo fiat. 58. d
Durius in molli parte quemodo fiat. 59. b
Durities, ac tensio differt. 98. b
Dysenteria ab atra bile orta, lethalis est. 16. b

E

Ephrausis a melancholia fit. 18. c
Emplicastrum diaphoreticum, & epispasticum ad tumores durissimos tollendos. 121. a
Epispastica remedia. 116. b
Epispastica per cutim extrahenda calida, & secca sunt. 116. a. ac tenuium partium.
Epispastica aliqua crassarum sunt partium ibidem quæ amara sunt.
Epispastica acris, & amara quæ sunt. 116. d
Epispasticum remedium acre cucurbitula secca est ibid.
Epispastica, quæ extrinseca sunt, raro assumpta diuretica & diaphoretica sunt. 116. d
Epispastica, & diaphoretica interna calida & secca sunt. 116. d
Epispastica pro densis, & variis partibus ut tendentibus, & ligamentis tumore duro laborantibus recte curandis. 120. b. & c
Epispasticum remedium efficacissimum est cucurbitula sicca. 121. b
Epithema ad ventriculum roborandum. 101. b
Erysipelas phlogomenosa & sanguine calidiori, & subtiliori, tamen bili flauæ mixto fit. 28. c
Euacuationes à nostro corpore, & à corporis partibus quæ fiunt. 73. a
Euacuatio insensibilis percutem administranda sit distentionibus, seu exhalationibus, aut emperationibus; quæ diaphoresis vocatur, per diaphoretica externa remedia mollienda. 73. a

Euacuationis cunctanea insensibilis cruditatum terribis, & quarta regionis diaphoretica praparentia interna, & externa. 114. c. & d. & 115. & alimenta.
Excretiones à nostro corpore, & à corporis partibus quæ fiunt. 73. a
Excrementum crassum colligitur, ubi multi labores sunt cum multo sudore. 43. c
Excrementum tenuius aggregatur, quoties labores sunt, sine multo sudore. 43. c
Excrementum magis tenne hyeme colligitur, ipsa vero tenne. 43. c
Excrementum tenne tercia concollisionis in cute falsa est insibilis perspiratorio habitus. 44. d. quæ visibilis fit tribus modis, tribus quæ de causis. 45. a
Excrementum crassum tercia concollisionis est sordes, fol. 45. a
Excrementum tenne tercia concollisionis non est sudor, nisi improprie. 44. d
Experientia tantum longo usu fit. 33. b

F

Famelli homines à pituita acida. 36. a
Fatis cremoris virtus. 109. c
Febri antepositio à quo fiat. 22. c
Febri postpositio à quo fiat. 22. c
Febri inordinata à quo fiat. 22. c
Febri quæ, anasin Illustrissimo Domino Paulo Bragadeño, existente, per sudores senatus est ab alijs affectibus etiam, quibus is ante quarantam laborabat, praegnotico ex Hipp. desumpto. 30. a
Febri ardenti ex bile flaua orta balneum aquæ dulcis conuenit. 79
Febri ardenti ex pituita falsa genita non competit balneum. 79
Febri multa hyssopo cotta non conuenit, nec riuum. fol. 93. a
Febri aximoli confertur ibid.
Flatus à pituita. 36. b
Flatus causa formalis. 54. b
Flatus causa efficiens est calor naturalis debilis ibid.
Flatus causa materialis est vel pituita, vel humor serafus. 54. c
Flatus causa materialis melancholia, vel bilis atra inferunt. 54. d. & 55. a
Flatus cur facili in liene fit. 55. a
Flatus incidentibus, & coquentibus eripiunt. 54. d
Platensis distensiones in hypochondrijs surgunt. 28. d
Figura rotunda partis facit ad humoris aut illi retentionem ut caput, vesica urinaria, & testis coniungunt. 26. d
Fomentum ad durissimos tollendos tumores. 120. d
Fritillorum molliendum modus, & ordo, atque tempus in cutaneis affectibus. 114. d
Frigus à pituita vitrea icthore. 43. d
Frigus insulicium cruditatem offendit. 57. a. b. c. d. & 58. a. & b
Frigus supramedum refrigerans siccat. 66. d
Frigus liquefacit ea, quæ crasse sunt à calido fuere. 65. d. & 66. & 67
Frigus crassificat ea, quæ crasse sunt à calido fuere. ibidem.

Rerum notabilium .

Fundus ventriculi causa est cruditatis pituitosa 6. d
Fundus ventriculi quandoque cunctis cruditatibus plenus est. 29. a. b
Fundus ventriculi prima causa est generationis, & fluxionis pituita. 62. b

G

Alenus suo tempore gloriabatur, sed sinistro tempore adest, non ita faceret 33. c

H

Hæmorrhoides sunt aperienda ad cruditates prima regionis recte curandas. 89

Hæmorrhoidum apertio. 106. d

Hepar pituita cruda correctilium, & emendatium est principium, non autem perfectissimum. 7. b

Chylus male factus ad hepar fluit, cum debito tempore in ventriculo non moritur, quatuor rationibus 7. c

Hepar sedes bilis flena 15. a

Hepatis parenchima sanguificationis primum organum 15. b. & c.

Hepatis caro inter carnem pulmonis spongiosam raram, & mollem, ut inter carnem rerum densissimam, est. 26. c

Hepar plus aquo calidius chylum non dum à ventriculo coctum attrahendo succum pignis melancholicum 28. d

Hepaticus fluxus à mesenterico laeso fouetur. 36. c

Hepatis causam à mesenterico laeso afficitur. 36. b

Hepatis causam, deiectionibus per intestina purgatur. 36. d

Hepar quomodo sua carne spongiforme sit, seu glandulosum, & quomodo obstruccionibus facile laborare possit 59. a. & 58. d. & quomodo duret. ibidem.

Hepar debile fouendum 71. d. & excitandum ad colligendum agendum in frigida tensione cucurbitula sicca, magna flamma. 71. c. & d

Hepatis cui phlegmonoso adematui conducit aqua cum uena scellio hepatica, in hæmorrhoidum apertio. 89. b

Hepar refrigerantia interna 108. c

Hepar refrigerat ciciboreon. Aqua B. V. & Pillensis, & Caldeiana: & Balnea aqua dulcis, & lac asinum, & unguentum 108. c. d

Hepatis tumefacti duri enatio tempore, modo, & ordine topicalis & strubra. 119. 120. & 121.

Hæmorrhoides à pituita salsa sunt, cum febre 57. d

Humida crassentia, non autem concretescent: ideo liquefunt 66. d

Humores nigri medij inter melancholicum, & atram bilem, salubres tempore pestis à Galeno explorati 23. a. & b. quorum quatuor agnita, & dua differentia sunt ibidem. c. & d.

Humorum omnium crudiorum tres sunt differentia, pro ut magis, vel minus, vel medio modo ha differentia à sanguinis forma, & à cacochymia essentia recedunt, vel medio modo 8. b. c. d. & 9. a. si cum parum à sanguinis natura recedunt, tunc audacter sanguis mittendus, si vero plurimum distet, & parum à cacochymia natura distet, tunc nihil sanguinis mittendum, & audacter purgandum: si vero modo medio se habuerit tunc consideratus agendum est ibidem.

Totius Tertius.

Humor acer pituita etiam comixtus abradit, & vitet. 27. d

Humor, quicunque suum habet ichorem, serum, & sanem etiam vocatum. 43. b

Humores crassi coquendi, & praprandi, semper vero educendi. 65. c

Humores in ventulis extremis mordaces, & in corporis habitu residentes crudi prius coquendi, & adqueandi, postea diaphoretici per cutem resoluendi. 65. c

Humorum crudorum turgida duplex, vel enim quo ad copiam, vel prauitatem 86. b

Humorum purgatione, educitur humor pituitosus, biliosus flauus, & atrus, vel melancholicus, & ferofus. 29. d

Hypochondria, seu præcordia turgida, inflata requirunt carminativa per aluum statim, & cruditates ducentia 75. c. non autem diuretica. ibid.

Hypochondria mollementia, & laxantia, 96. b. detergentia 95. d. & 96. a

Hypochondriorum cruditates maturantia, seu digerentia propriè appellata remedia extrinseca calida, & humida, & laxantia, seu mollementia 97. 98. a

Hypochondriis turgidis, & inflatis auxilia interna 98. c. & d. & 99. piper longum, albon, & nigrum, zingiber distripipeperem, &c. ibid.

Hypochondria, & cetera membra quomodo turgenda, sunt cathartica, 113. c. & d.

Hypochondriorum, nempe ventriculi, mesenterici, pancreatis, hepatis, uteri, & c. tumefacti, duri, & ferofos curatio topicalis rectè admissenda tempore, modo, & ordine describitur 119. 120. & 121.

Hypochondria turgida, & inflata à statu una cum cruditatibus 58. d

Hypochondriis obstruccionibus aperiendis, deterfaria pharmaca competunt extrinsece ad mouenda, ante mollementia, & laxantia, priusquam totum reliquum corpus purga cum sit. 69. c. & d. & 70. a. & b

Hypostasis urine vide urine hypostasin.

Hyslopium, origanum, iros, & serpillum in mulla coquenda sunt ut incidentia, non diuretica. 93. b

I

Ictera à cruditatibus secundæ regionis facta 77. d. & 78. a

Iacturæ quinque fierent, si cruditatum copia primæ regionis ad secundam, ac tertiam accederet regionem. 126. b

Ichorum humorum natura 43. b. c. d. & 44. a

Ichores excrementa sunt deterrima, educenda. 43. b

Ichores, cum tenuissimi sunt, per sudorem excremurantur. 43. c. & 44. b

Ichores colliguntur, ubi multi labores sunt sine multo sudore 43. c

Ichorum notæ. 43. c

Ichoris sanguinis notæ ibidem. & natura ibidem. & d.

Ichoris pituitæ notæ, & natura 43. d

Ichor pituitæ tinnitum parit 43. d

Ichor pituitæ vitiatæ plantæ acidæ, aut salis, mordax, & malignus est, ideo vigilas, & perturbationem, & animi motum cum terrore, & panorem parit 43. d. & 57. d

Ichor pituitæ vitiatæ panorem, frigus, & torporem, somnolentiam

Index locupletissimus

molentiamque efficit. 43. d. 5. 7. e
 Ichor bilis flava nota, & natura. 43. d. & 44. a
 Ichor bilis flava infestus est ibid.
 Ichor atra bilis nota, & natura. 43. d. & 44. a
 Ichor atra bilis infestissimus. 43. d.
 Ichor atra bilis, & flava bilis sua mordacitate, & acedine, suaeque siccitate, & suo colore opaco marorem, & mellicionem inducunt. 43. d. & 47. d.
 Ichores acida bilis densa pruritum, & pustulas excitant 44. a. & 57. e
 Ichor atra bilis infestissimus, minus infestus bilis flava, minus etiam ad huc pituita, sed omnino minissimus est sanguinis ichor, 44. a. 57. e. d.
 Ichorum alia symptomatica, & morbi. 44. a. & 57. e. & d.
 Ichor pituita vitrea in cerebro exiens quid faciat. fol. 57. c.
 Ichor chylum a ventriculo attrahere nequit ob mensem rei venarum obstructions. 36. c. d.
 Ignis sacer a sanguine calidissimo fit. 2. 8. c.
 Inappetentia ciborum a putua vitrea non acida. 36. a. et sopor ibid.
 Inconcoctiones a pituita. 36. b.
 Inediam multam feri, qui multas succas habent pituitosus. 36. b.
 In uclia ad ministranda, hominis consuetudo obseruanda. 75. d.
 Inedia, seu diata quod emolumentum inferat, in cruditatibus recte curandis. 75. c. enacuat per accidens ibid.
 Indicationes tres sunt in methodo curatiua, nempe curatiua, praeseruatiua, & vitalis. 60. a.
 Indicationes cruditatum tantum dua sunt: praeseruatiua, & vitalis, quia a Galeno cruditates considerantur in relatione ad lassitudines, in methodo emenda sanitati, non autem in relatione ad morbos, in methodo medendi curatiua, ubi tres habentur indicationes, nempe curatiua, praeseruatiua, & vitalis. 60. d. & 61. a.
 Indicatio prima regionis cruditatum prima est reuulsio, seu deriuatiua, ne ha cruditates in secundam, ac tertiam regionem ferantur: secunda autem indicatio est enacuatia. 61. c. & d. tertia vero est partu silentis, & mandantis emendatiua. 61. a. & b.
 Indicationes caetera a cruditatum prima regionis sunt adaquatio, seu preparatio: non cruditatum, tum viarum, tum virium totius corporis: nec non calidi innati languide coquentis excretatio. 61. c. & d. & 72.
 Indicationes preparantes pituitam. 63. b. & cautiones seruanda in indicationibus, ne cruditates ille in secundam, ac tertiam regionem cruditatum fluant ibidem.
 Indicatio nem ab aere nos ambiente desumere debemus, tanquam a causa sine qua non curatio recte fieri potest: in cruditatibus curandis, quis nam calor aeris requiritur ad pituitam crudam prima regionis coquendam. 63. d. & 64. a. & b.
 Indicatio cruditatum in venis exi remis, & in corporis habui existentium est coctio, & adaquatio, postea diarrhoeici externis per cutem resolutio est, fol. 65. c.
 Indicatio vitalis cruditatum prima regionis recte curandam. 74. b. c. & d. & 75.
 Indicatio vitalis prima regionis cruditatum duplex est, nam vel atota vniuersa totius corporis virtute natu-

ra substantiali, vel a virtute substantiali particulari alicuius partis desumitur: Triplexque virtutis natura substantia simul cum suo originali temperamento conseruanda indicatione vitalis, nempe spiritus calidi innati, & partes solida, & species carnis. 74. d. & 75.

Indicatio cruda pituita prima regionis vitalis, a tota vniuersa totius corporis natura recepta, tribus perficitur, nempe alimentis eucharum nempe probi succi, facili digestionis, & minimi excrescentis, quae exemplis ab Hippoco. & a Galeno ad verbum desumptis dilucidatur. 75. b. c. & d.

Indicatio a natura, & ab estate desumpta, nihil absolute, cernitur, nisi in relatione ad hominis consuetudinem. 75. d.

Indicationes cruditatum tam pituitosarum, quam moruaciarum secunda regionis. 77. b. c. & d. & 78. a.

Indicationes cruditatum acutum recte curandam tertiam, & quartam regionis eliciuntur, & Galenicis exemplis materiae praesidiarum dilucidantur. 78. & 79.

Indicationes compositionum in regionem cruditatum a Galeno constituta quot sunt. 80.

Indicationes cruditatum pituitosarum tam prima regionis, quam secundae compositionum. 8. b. c. Ha compositiones nouem sunt. 81. d. Harum compositionum nouem comparatio quo ad maiorem, minorem, & nullam circumspectionem curationis vni sectione, alteratione, & purgatione molenda. 83. a. & b.

Indicationes nouem compositionum cruditatum pituitosarum prima regionis cum mordacibus cruditatibus secundae regionis, & conuenientia, ac differentia ab alijs nouem compositionibus praedictis. folio 83. a. d. & 83. a.

Indicationes compositionum cruditatum pituitosarum prima regionis, & mordacium cruditatum tertiae, & quartae regionis a Galeno flante eliciuntur, & exemplis Galenicis illustrantur. 83. & 84. Ha compositiones nouem sunt, harum conuenientia, & contrarietas quo ad maiorem, minorem, & nullam considerationem curationis earum vna sectione, alteratione, & purgatione molenda. 84.

Indicationes compositionum cruditatum ex secunda, cum tertia, & quarta regione eliciuntur: Ha compositiones nouem cernuntur. 85. a. & b. Harum compositionum comparatio quo ad maiorem, minorem, & nullam considerationem habendam curationis vna sectione, alteratione, & purgatione ministranda. ibid. c. & d. & 86.

Indicationes compositionum omnium quatuor regionum cruditatum. 87.

Inflationes a pituita. 36. b.

Inordinatio febris a quo fiat. 22. c.

Instrumenta natura. 11. a.

Instrumenta artis Medicae. 11. a.

2.

Labor multus biliosum, vel melancholicum gignere efficit. 42. b.

Labores longi tractum bilem gignunt. 42. b. & bilem flammam ibid. & 43. a.

Labores continui decurrit ibid.

Labores

Rerum notabilium.

Labores multi tum sudore excrementum craffius colligunt 43. c
Labores sine multo ardore tenue excrementum peragunt ibidem.
Labor, & otium duo principia sunt salubria, & insalubria 43. c
Lactuca, sola acris succis conuenit ex Galeni opinione 109. c
Lapis pyritidis: Marchesia vulgo appellatur. 130. b
Laffitudines prima sunt corporis humani affectiones preternaturales 61. a
Laffitudines sunt proprie accidentia, & improprie symptomata morbum venturum denuntiantia ibidem. quæ per se nihil indicant, immo per accedens, ratione cruditatum, à quibus hæ lassitudines emanant, indicant. 61. a
Laxatio in fioni contraria, ut mollities duritati. 96. b
Laxantia prima laxant, secundo laxando digerunt, tertio digerendo insensibiliter per halitum euacuant, & consequenter aperiunt, ac transpirabile faciunt corpus 96. d
Laxantia calida, & humida. 96. b
Laxantia externa 97. & 98. a
Lentientia tantum ad cruditates primæ regionis recte curandas congrua sunt non autem solutiva 99. d. & 100. a & b.
Lentientium virtutes 100. b
Lentientia cur in aliquibus corporibus plus purgant, quàm solutiva fortiora 100. b
Lepra à melancholia fit 28. c
Lepra morbus similis balneo calidis ab Hippocrate curatus: attamen hydropse superueniente homo obijt. 28. b. c
Leptosus balneo calido ab Hippocrate curatus 28. c
Lien, quia melancholicum, & humorem aqueum trahit & retinet, idcirco facillè intrumescit. 26. d
Liene aqua affectus facile ventriculus ab ea aquosa humiditate fluitosus leditur 26. d
Lien sua facilitate debili attrahitoria, cum sanguinis lutum ad se attrahere nequeat, massa sanguinea sanguinis fæce inquinata manet 28. d
Lienis flatus cur facillè fit 35. a
Lienis formatio, & natura: & quomodo lien facillè obstruitur. 59. a & 58. d & quomodo durescit ibid.
Lien detentoria externa assignantur, ad aperiendas vias obstruatas, ante mollientia & laxantia adhibenda, & antequam totum reliquum corpus expurgatum sit 69. c. & d. & 70. a. & b
Lien debile fovendum 71. b. & excitandum ad collectionem ægredam cucurbitula sicca maxima flemma 71. c. & d
Lienis scirrhus curatio topicalis tempore, modo, & ordine distributa 119. 120. & 121. 107
Liquefcunt omnia à calido, vel à frigido b. & c
Localia remedia 112. a. & b
Localia vide topica.

24

Maturantia tres sunt. nam primus modus ad humidum, & molle temperamentum est: secundus est rarefactionis, tertius vero est exhalationis modus 113. d

Totius Tercius.

Maturantia tres modos maturandi possidet 113. d. & 113
Maturantibus per se calidis, & humidis semper commissenda maturantia per accedens epispastica dista extrahentia, & euacuantia insensibiliter. 113. d
Maturandi modi primi, & secundi differentia. 114. a
Maturantibus per se calidis, & humidis, cum alia maturantia per accedens commissenda sunt calida, & secca, attamen pauca secca admiscenda, ne tumores duri lapidefcant 114. a
Maturantibus per se calidis, & humidis in primo modo maturandi vitium: Maturantia vero per accedens, quæ epispastica sunt calida, & secca, in tertio modo maturandi admodum: omnia vero conueniunt in secundo modo maturandi nempe rarefaciendi 114. a
Maturantia vide digerentia externa.
Medicamentum, quæ per cutem euacuant, & extrahunt insensibiliter epispastica dicuntur: ea vero, quæ euacuant digerendo diaphoretica sunt. 116. b
Medicus decipi potest à tribus, ideo hæc tria dignoscenda sunt 1. a. ne Medicus egrorum moris culpabilis sit ibidem.
Medici optimi dignoscunt infirmum à naturæ, & artis 11. a
Medici prestantissimi solas rerum causas indagabant, quia leni ut more, attamen rerum essentiam quoque suppositimè dignoscunt 2. b
Medicus optimus, hoc opus per legere tenetur, ne inter medicos malos connumeretur 2. b. c
Medici mali qui non sunt ex Hippocrate 2. c
Medicus optimus. Artis medicæ collega inculpabilis hæc eruditatum scientiam, peritiamque callere debet 2. c
Medici optimi scientia, & peritia circa cruditates, tam in morbis acutis, quam in longis esse deueniunt 2. c. d
Medicorum quatuor differentia 3. d
Medicorum prima differentia est, dum Medicus piolus est, attamen insidus, veritati non incumbens, immo arti deceptoris standens. 3. a
Medici secunda differentia est, quoties Medicus optimus non est sola veritas ratione, non autem utens experientia. 3. a
Medici tertia differentia est, ubi Medicus imperitus est solo utens experimèto, sine ulla ratione, ut Medici Empirici sunt 3. b
Medici empirici in duplici differentia existunt. ibidem.
Medici empirici sunt audiendi ex Hippocrate quia etiam ab empiricis sola empiria, seu experientia sua, nos debemus discere 3. a. b
Medici quarta differentia est, quando Medicus peritus, & fidus est, & inculpabilis. Artis collega, ad salutem egrorum, & veritatem tantum incumbens, non autem ad lucrum, nec ad gloriam vanam 3. c
Melancholicus pars tenuis partim per distensionem, quæ sensum refugit: partim sensibiliter per sudores egreditur 28. b
Melancholicus pars tenuis, quæ ob cutis densitatem egredi nequit, priuonem gignit, & lepram 28. b. c
Melancholia lepram, se abiem, elephantiæsm, vitiligines, & phagadenas producit 28. c
Melancholia, & atrabilis ciborum reuementissimam appetentiam efficit. 28. c. & 36. a
Melancholia in sanguine adest, dum lien sua vi attrahitoria debilis: sanguinis lutum attrahere nequit. 28. d

b 5 Melan-

Index locupletissimus

Melancholia fit propter soliditatem plus aquo maiorem hepatis ad se chylum non dum in ventriculo coëctum attrahentem. 32.d
Melancholia acida est, & crassifolia a calore promouetur. 66.b
Melancholia a frigore vincente. 66.b
Melancholia crassa a calido mollescente, & humefcente tenuatur, atque fluxilis paratur; non autem a frigido; quia a frigido vincente concreuit, non autem a calido vincente sed tantum promouente: bilis esse vero amara crassifolia a frigido humefcente fluxilis enadit, cum ea a calido vincente genita, & crassifolia sit. 67.a
Melancholia natura. 18.b
Melancholia an humor acer, & mordax sit. 18.c
Melancholia humor de genere cruditatum acrimam est, non ut prater naturalis est, sed ut acer se habet. 18.c
Melancholicus humor, & eius ichor in cerebro existens quid faciat. 57.d
Melancholia, seu atris bilis pars sanguinis lutea, & facu lenta est, pro sanguinea massa despicenda influita, & creata. 38.b. Hinc a natura semper pro sanguinis depuratione sapè ad plures corporis partes, vltra hepè, transmitti solet. & ad hemorrhoidas, & ad varicosas curam venas, & ad alias plures partes ibid.
Membrum obstruendum, sensum, seu tumefactum ita suo calido innato debili se habet, ut nisi foueatur, iam extrinsecus, tum intrinsecus, & excutitur, ut coque non possit. 70.b.c. & d. 71. & 73.a. & b. tribus modis membrum debile fieri potest. 70.d. & 71.c. & b
Mensura reu edy a capacitate loci affecti desumenda est. 40.c.d. & 41.a
Mesenterem faciliè crudiora recipit. 13.d
Mesenterem primum est sanguinis generationem ab hepate celebrandam disponens. 13.d
Mesenterem ut va dix hepatis se habet. 33.a. & b
Mesenterici suppurati signa. 36.b
Mesenterici inflammati signa. 36.b
Mesenterica vena ab hepatis cano pblegmone laborare solent. 36.b
Mesenterici vena affici solent causa ventriculi, vel intestini norm omnium maxime sciam. 36.b
Mesenterici affectiones. 36.b
Mesenterici lasum fluuii: alii sanguinolenti, & non sanguinolenti causa interdum est. 36.c.d
Mesenterem non transmittit chylum ad hepar, ut temere aliqui putarunt, sed hepar a mesenterio ut a sua radice attrahit. 36.c
Mesenterici vena obstruella impedimento sunt quo minus hepar a ventriculo chylum attrahere nequeat. folio 36.c
Mesenterem per intestinum refluum expurgatur deiectionibus. 36.d
Mesenterio obstruella prohibetur transitus chylo, a ventriculo ad hepar. 59.b
Mesenterem spongiforme. 59.a. & b. quomodo dure sit ibidem.
Mesenterici, & cani hepatis pblegmone adematati conferri hemorrhoidum apertio ad deprimendum, & evacuandum sanguinem inflammantem: ac etiam vena scissio iccoraria conuenit, ut prohibeatur fluxus sanguinis a toto venoso genere ad mesenterium, & hepatis casum fluerentis. fluxuri, 89.b
Mesenterico debile fouendum. 71. b. & excitandum ad

collium cucurbitula sicca. 71.a. & d
Mesenterici, et prima cruditatum regionis roborantia remedia. 103.b
Mesenterici tumefacti, & duritipicalis curatio tempore, modo, & ordine descripta. 119. 120. & 121
Mesilia timori cognata est. 43.d
Mesistia ab acredine bilis deuila. ibid.
Methodus tuenda sanitatis. 61.a
Methodus curatina ibid.
Methodus tuenda sanitatis primario similibus progreditur, secundario autem dissimilibus, seu contrariis. 61.a
Mitridatum optimum ad ventriculum frigidum, & humidum roborandum. 101.a
Mollia concretis, non autem crassantur, ideo non liquefunt, sed mi illa iterum fiunt. 66.d
Mollia omnia sunt a calido, vel a frigido. 66.c
Mollities duritatis, & laxatio tensioni contraria. 96.b
Mollientia calida, & humida. 96.b
Mollientia externa. 97. & 98.a
Mollientia, seu laxantia non applicanda sunt ad vias, in cruditatibus preparandis, ut laxanda, et aperienda, nisi prius reliquum corpus iam purgatum sit, & parte etiam parum vacuata, & materiam iam cillam habeamus. 68.c. & 97. & 113
**Mollientia, seu laxantia hypochondriis molliendis, in magna febre admonenda non sunt ibidem, & 97. & 113
Mollientia, seu laxantia, ubi pblegmone adest, non sunt applicanda, nisi in fine, dum pblegmone adematofus iam factus est. 68.c. & d. & 97. & 113
**Mollientium est balneum laxans ibid. & 97
Mollientia quibus paribus admonenda adstringentibus comixta, & quibus aeribus admixta. 68.d. & 69.a
Mollire laxantibus, ac emollientibus magis triplo debemus in tumoribus duris, & scirrholosis rellè curandis, quem euacuare calidis, & siccis, ne bi tumores lapidescant. 119.c. & d
Mollientia gracie malacica vocantur. 120.b
Mordicatio communis est acido, amaro, & acri ex Galieno. 94.c
Morbi varij a cruditatibus acerbis orti. fol. 27.c. d. & 28
Morbi varij a quibus promant. 27.c.d. in unico corpore & 28.d
Morborum mater bilis est amara, & acida. 28.a
Morborum acutorum causa bilis flaua ibid.
**Morborum alij pauci patentes, alij multi obsecuti, folio 28.b
Morbi qui ex pituitis fiunt. 16
Morbi cutanei. 39.d
Morbi ex ichoribus orti. 43.c. d. & 44.a. & 57.c. & d
Mulsa hyssopo incocti febrilibus obest. 93. ratione hyssopi calefacientis.
Mulsa composita a pomeli, & oximeli usque ad tertium, & quartum, & septimum diem danda in cruditatibus prima regionis rellè curandis. 93. c. 103. d. & 104
Mulsa simplex colla exhibenda ad cruditatum copiam prima regionis rellè curandam, in principio: Deinde quædaqua volentes ventrem subducit: si cui colla magis natia, & roborat. 93. c. 103. d. et 104******

Rerum notabilium .

Mulſe cruda loco quando piſana cremor, & farri ſucci
pro alimento exhibendus. 93.d
Mulſa, piſana cremor, & oleum dulciſſimum in acerbis
humoribus conuenit. 93.d
Mulſa non eſt coquenda cum calaminta, & opio, qua diu
retica ſunt, ad eruditates copioſas prima regionis re-
ſtitue curandas. 93.a
Mulſa coquenda eſt, cum byſſopo, origano, iride, & ſerpil-
lo, ut ea remedia incidentia, & non diuretica ſunt, ad
cruditates prima regionis reſtitue curandas. 93.b
Mulſa ſimplex, ac piſana inter alimenta: oximeli vero,
& mulſa byſſopo coſta inter pharmaca. 103.d
Mulſam ad mite aluum ſubducendam primus conſtituit
Hippoc. 104.a
Mulſa ſi nimis ventrem doceat, tunc vice mulſe piſana
cremor dandus. 104.a
Mulſa quando non danda, ſed eius loco opbeſa vino made-
facta, aut montana, & piſce ſaxatiles conueniunt ibi.
Mulſa ſi ſedum faciat ad piſana cremor ducenda, vel
ſari ſuccum accedat. 104.b.c
Mulſa poſt piſana cremorem non danda, ſed ante, ſic &
oximeli. 104.c
Mulſa, & oximeli quando aſtu calida exhibenda ſunt.
Mulſa ſimul cum piſana ſola, ex oximeli danda primis
quatuor, & ſeptem diebus ad prima regionis planito-
ſa eruditates, valde copioſas tenuandas, incidentas,
deſerendas, & per alium miſtiſſime ſubducendas, ne
ha ad ſecundam, ac tertiam accedat regionem. 67.d. 68.a
Mulſa byſſopo coſta tantum ab Elippo, & Gal. exhibebat-
ur pro nutrimento, ubi pituita ſummè copioſa coquen-
da cernatur prima regionis, tribus, ſeu quatuor, vel ſe-
ſeptem primis diebus, & rationes redduntur. 92.d
Mucus propriè non eſt pituita, cum a ventriculo non pro-
ducatur, immo a cerebro. 12.a.b.c.d
Mucus videt catarrhum. N
Nauſea a bile flaua, pallida, & vitulina, eroret. 36.a
Nivum, & ſal craſſeſcent non a calido, & a frigi-
do, ſimul dicitur ut ait Arriſtoteles, ſed a ſiccitate, ſicuti ab
humido liqueſcit. 66.b
Nota ſcientifica. 33.c
Nota artiſcioſa conſecturales reſta. 33.c
Nota certa cruditatum ſedis leſa, & morborum, & auſu-
ram ex quinq; ſignis habentur 32.b. nam primò mo-
do ex aſtione leſa, ſecundo modo ab excrementis extri-
tibus: tertio ab accidenſibus, qua ex leſa ea aſtione
adnoſcuntur: quarto a ſitu partis aſſectæ: quinto vero
modo a partis offenſa formatione, vel ſignatione nota
eliciuntur. 33.a.b.c
Nota primæ cruditatum regionis reſta ab aſtione ebyli-
ſtætrici ventriculi vniata, per ruſtus diſcoſcenda.
33.d. & 34.a.b.c
Nota primæ regionis cruditatum ex mala viſſus ratio-
ne præſecta, & ab alijs tribus externis erroribus ha-
bentur ſcalices ex corpore aut ea excrementis leſo, ex
cibus malis, & a vigilijs, ſeu ab exiguo ſomno. 34.d
Nota copia pituita, in ventriculi fundo creata, in prima-
que cruditatum regione collecta, a diſſectiombus ex-
crementorum excrementum diſſumpta. 35.a.b. & ex vo-
mitionibus. 35.c
Nota copia pituita prima regionis nota a formatione par-
tis, leſa magnitudine, & diuſe elicitur. 35.d
Nota prima regionis cruditatum copia ex accidenſibus,

qua eas cruditates huius regionis conſequentur, de-
ſumpta. 36
Nota reſta cruditatum tenuium, craſſarum, & media-
rum. 41.d
Nota cruditatum pituitarum, & aerium contraria ſit,
qua ex otio, & nimio labore eliciuntur. 42. & 43.a
Nota maioris, et minoris copia cruditatum prima regio-
nis. 37.a
Nota ſecunda regionis cruditatum. 37.b.c
Nota cruditatum ſecunda, tertie, & quartæ regionis in
genere. 39.a.b. & c. in ſpecie 39.d. & 40.a
Nota cruditatum ſecundæ, tertie, & quartæ regionis ſuis
ſpeciebus diſtincte diſcoſcenda ex ſudore a ſapore in-
dicato. 44.c
Nota cruditatum ſecunda regionis hoc eſt generis venoſi
ex vrina ſua conſiſtentia, colore, quantitate, odore, ſi-
quore, & contentis eliciuntur. 46.b
Nota cruditatum, & concollium ſecunda regionis ſi-
gna diſcoſcenda vera ex vrinis diſſumpta habentur a
ſol. 47. reſque ad ſol. 56
Notæ cruditatum ex vrina ſubingali diſſumpta. 53.c. &
d. & 54. & 55.
Notæ cruditatum, & concollium ex vrinis ita vera
ſunt generis venoſi, ſicuti vere ſunt totius corporis no-
tæ ex ſudoribus accepta. 56.d
Nota omnium quatuor regionum ſimul aſſectaram a er-
roribus, ex caloris, & frigoris ſenſu, & ex colore to-
tius habentur corporis. 57.a. & b. & 58.a.b
O

Obſtruſiones in hepate, ſione, & renibus etiã a craſ-
ſitie, & leuore, & ſuſcidiſſate, ſine copia magna
humorum ſiunt. 25.b.c
Obſtruſiones a quibus diſcoſcuntur. 58.c. & d. & 59.
a. & b
Obſtruſiones quodis modis ſiant. 59.a.b
Obſtruſiones detergentia externa, qua aplicanda ſunt
eo tempore, quo vias relaxantia adhibere non decet.
95.d. & 96.a
Obſtruſionibus aperientiſ deterſoria extrinſeca compe-
tunt, ante corporis totius purgationem. 69.c. & d. &
a. & b
Oleum chalcantimum non modo acidi eſt, ſed etiã acre,
& ignem calidum, & ſiccum. 94.b.c
Oleum chalcantimum, cuiuſſus, & doſis. 94.d
Oleum maturum relaxat. 96.b
Oleo laxanti miſſendum chalcantum vel reſina, tere-
binthina, colophonia. 96.b
Oleo calido, & humido maturo relaxanti alia pharmaca
admiſcenda ſunt, quæ calida, & ſicca ſunt diaphoretici-
cam vim habentia. 96.c
Oleum aqua mixtum relaxat. ibid.
Oleum vetus valde digerit: recens vero valde emolli-
t. 98.a
Oleum vetus digerens ex herbis feminibus, radicibus, &
ſloribus a Gal. ponitur. 98.a
Olei ſilicidium ad ventriculum frigidum, & humidum
roborendum. 101.a
Oleum ex ammoniaco, belſia, ſerapino, opoponazo, vel ſty-
race deſtillatum optimè eſt ad tumores duriffimos di-
uelliendos. 121.b
Oritum, & labor duo principia ſunt ſalubria, & inſalu-
bria. 42.c

Index locupletissimus

Oritur causa est generationis copia cruditas pituitosa-
rum, multus modus. 41. c. d.
Oritur causa est gracilitas corporis. & cur. 42. d.
Oritur pituita accretare facit. 42. b.
Oximela pro nutrimento exhibendum primis quatuor, &
septem diebus, ad aquas pituitosus primis regionis
refertur. cur. 42. d. ad aquas per aliam multissimam subnec-
das, ne in secundam regionem ha cruditates ferantur,
67. d. & 68. a.
Oximela aquosum in pituita cruda copiosa prima regionis
coquendum, & tantum dandum pro nutrimento, quo usq. pi-
tuita coquatur sit ut iam robur permisset ex Hippoc.
mente. 92. c.
Oximeli febris confert. 92. a.
Oximeli byssopo, origano, & nepeta collige quas habet sa-
cultates. 93. b.
Oximeli diureticum cruditatibus prima regionis refertur cu-
randis obest ibid.
Oximeli pro multa simplicia dandum, interdum vero, &
multa exhibenda, si pulsus rarus, ac tardus sit. 93. c.
Oximeli quando frigidos, & quando calidum esse dan-
dum. 93. c.
Oximeli quibus obest in aeribus succi. 93. d.
Oximeli ante pituita excrementum dandum. 104.

p

Pancreon corpus glandulosum. 32. a.
Pancreon debile fovendum. 71. b. & excitandum ad
concoctionem agendum curabitur sicca maxima flam-
ma. 71. c. & d.
Partes principales fortiores, & alie ceteris partibus val-
diores sunt. 13. a.
Partes glandulose, & rotunde sua figura semper atra-
bunt, & humorem atractum retinent, ut caput, vesica
trinaris, & venter. 5. d.
Partes aliqua effluvia carent, at tamen aliquem continent
usum. 32. b.
Partium sympathia, que a ventriculo, & a cerebro pini-
ta, & catarrho si forte offendi possunt. 13. c. d. 14. a.
Partes obstructa debiles si sunt, ut suis functionibus
privantur. 9. b.
Partes que facili ob cruditatibus magnam copiam obstru-
untur, & que sine cruditatibus magna copia, facile acce-
sunt obstruuntur. 9. a. & b.
Partes molles quatuor de causis durescunt. 5. b.
Partium lesarum sympathia varia cruditas mordaci-
tate ab hepate promanant. iun. 27. c. d. & 28.
Partes superiores per pharmaca solutina ore assumpsa fa-
cile purgantur, sicut inferiores per chyliferas. 11. c.
Pavor ab ichore pituita. 43. d.
Perspiratio in visibilibus excrementum est tenue tertie con-
coctionis. 44. d.
Perturbatio animi ab ichore pituita acidis, & salis. 43. d.
Piper imas concoctionem. 73. b.
Piper tenuat, exsiccat, flavumq. dicitur, & calefacit, atq. per
intestina flammam & cruditates exhalare facit. 75. c.
Piscis quibus effluvia ab Hip. et a Gal. p. globetur. 109. c. d.
Piscis saxatiles, & aves montanae pro alimeto congruo ad
cruditates reficiendas primis regionis. 104. a. et q. ibi.
Pibiles imi error. 10. b.
Pleurora improprie a Gal. vocatur & a dispositio ex recen-
tibus cruditatibus mordacibus orta. 8. a.
Pobagena a melancholia fit. 18. c.

Pblegmone in sanguine temperato oritur. 28. c.
Pblegmone iam declinato, ac in adema reddito, ad exci-
tandum calidum innatum debile ad concoctionem agen-
dum valet cucurbitula magna siccata ignita sicca,
& competita. 71. c. & d.
Pblegmone sparsus a sua cacochymia curatur tunc per alia
ex parte interiori, tum per cutem diaphoreticis, & e-
pispasticis remedijs ex parte exteriori. 10. b. & c.
Periostites partium cruditatibus implentur, & hinc ob-
struuntur. 5. b.
Perostites quid sint, quia in solidis corporibus, & specie
carnosa insunt, & in quibus cruditates colliguntur. 26. a. b.
Postpositus febris a quo fiat. 22. c.
Pinguedo, adeps, & sebum ad molliendum & laxandum. 96. c.
Pituita acida, & falsa, & eam ichor in cerebro exire
quid faciat. 57. d.
Pituita cruda quomodo a ventriculo, & quomodo a ieci-
nore gignatur. 6. c.
Pituita cruda a fundo ventriculi fit. 6. d.
Pituita cruda a hepate correctissima est, seu emendatissima
simplicium, non autem perfectissima. 7. b.
Pituita cruda in plerisque fit ventriculi fundi facultate, &
chylificatrice offensa. 6. d. et 7. a. raro vero & per ac-
cidens fit ea facultate non laesa. 7. b. & c.
Pituita cruda interdum oritur ob chylum male laboran-
tem antequam chylus probe fiat, ad hepatis ita crudus
fuit, cum debito tempore in ventriculo non moratus
sit. 7. c. quatuor de causis ibid.
Pituita proprie dicta a ventriculo, non autem a cerebro
emanat. 7. c.
Pituita tantum propriissime cruditas vocatur cum ea so-
la per cruditatem modum fiat. 7. c.
Pituita in fundo ventriculi residens a bile sua tenuitate,
& amaritudine, quia in concavo iecinis est, et per vo-
lutum exit, emanatur. 7. d.
Pituita tres sunt differentie quatenus ha magis a san-
guinis natura differant, & ad cacochymia essentiam ac-
cedunt, vel medio modo se habent. 8. b. c.
Pituita generis species quatuor sunt tres. n. ex saporibus
colliguntur, n. pe. dulcis, m. acida, & falsa, alia vero
pituita vitrea est. 9. b. c. Quatuor quatuor pituitarum diti-
que naturas se habet, aliquo tres erunt habentur ibi.
Pituita acida, & vitrea natura. 9. d.
Pituita vitrea magis permixta est, quam acida. 9. d.
Pituita dulcis insipida, que naturalis est natura. 9. d.
Pituita falsa natura. 10. a.
Pituita falsa tres sunt ibid.
Pituita falsa a combustionis calore orta ibid.
Pituita falsa in cerebro gigni potest a calore combustionis
sine ulla putredine, quia si ibi putredo adfuerit neces-
sario etiam lethargus adfuerit, ut ait Galenus. 10. b.
Pituita falsa a calore putredinis orta. 10. c.
Pituita falsa per concoctionem ferream humiditatis ex Ga-
leno, vel ex commixtione bilis amara ex Avicenna. 7. b. c.
Pituita falsa quomodo sub genere cruditatis pituitosa, &
quomodo sub genere cruditatis mordacis sit, explanatur.
10. d.
Pituita falsa mardens, & abradens, in effluvia refertur
offensa, facit & asperandam, in effluvia difficultate,
in effluvia diffinitionem, & alia quomodo plurima
alia mala quomodo. 10. d.
Pituita excrementosa cur, nullum recuperandum deum
est,

Rerum notabilium.

eff. scui bili vtrique assignatum est. 1. 1. b
 Pituita excrementosa a ventriculi fundo fit, pituita vero, quæ a cerebro fit non pituita est, sed mucus 1. 1. & 2. vide cataribum.
 Pituita a ventriculo, & a cerebro laeso emergit, ut a duobus fontibus cruditatum pituitosarum. 13. a
 Pituita cruda in ventriculo residens ad quas partes transmittatur. 13. c. d. & 14. a
 Pituita in ventriculi fundo magis colligitur, & coarctatur. 13. c
 Pituita vel in ventriculi cavitare, vel tunici, & fibrilibus, ac tunc facultas tum coarctrix, tum retentrix, & plus coarctrix laeditur. 13. c
 Pituita in fundo ventriculi existens suis vaporibus stomachum deturpare valet. 13. e
 Pituita in pancreis, & in prima cavitare, quæ inter ventriculum, & pancreas est, inest, quæ per urinam expurgatur. 13. e
 Pituita ad renes obstruendos. 13. a
 Pituita ad vesicam descendens ibid.
 Pituita ad vasa spermatica descendens semen infecundum reddit. 13. c. d
 Pituita in v. er. acetabulis paucos efficit menses. 13. d
 Pituita in utero Venus menses decolores gignit. 13. d
 Pituita in utero corrupta tæcinam producit præfocacionem. 13. d
 Pituita vitrea ad ventrem ingruens tormina parit ibi.
 Pituita vitrea ad intestina descendens colicam, & iliacum excitat dolorem. 13. d
 Pituita faciliè venas mesenterici obstruere potest ibid.
 Pituita a ventriculi fundo ad lienem per vas venosum fluit. 13. d
 Pituita non solum in venulis mesenterici, pancreis, hepatis, & lienis inesse potest, sed etiam in carne, & spacijs. 13. d
 Pituita in spacijs, & carne existens, nisi difficilimè extrahi potest. 13. d
 Pituita melancolica admissa usque ad varices descendit 14. a
 Pituita in totum venosum ingredi potest genus. 14. a. & omnimodam cruditatem leucophlegmariam vocatam parere ibidem.
 Pituita in iuncturis, in musculis, in tendonibus 14. a. quos morbos pariat ibid.
 Pituita humori acri comixta abradit, & ulcerat. 27. d. & 28. a
 Pituitarum morbi. 36
 Pituita vitrea non acida inappetentiam & soporem efficit. 36. a
 Pituita acida, & salsa vigilias parit. 36. a
 Pituita acida appetentiam excitat. 36. a
 Pituita multam inedia m fere facit. 36. b
 Pituita granatiorem excitat dolorem, & ventriculi anxietatem. 36. b
 Pituita copiosa ræctus, agras concessiones, tormina ventris, moleculas, seu insationes, flatum, & alias affectiones ad os ventriculi pertinentes parit. 36. b
 Pituita quia crassa est, per cutem educi nequit. 43. c
 Pituita acida rigores efficit, sine febre. 57. d
 Pituita salsa boiorem gignit cum febre. 57. d
 Pituita generationis, & fluxionis prima causa est ventriculi fundus. 62. b

Totus Tertius.

Pituita prima regionis adæquatio seu preparatio per contraria alterantia fieri debet. 63. b. in qua administranda a calidis liquantibus nos cauere debemus, & ab exercitationibus, ne illa cruditates in secundâ, ac tertiam suam regionem, tunc enim multæ fierent iactura ibid. c. similiter eadem ratione a diureticis nos abstinere cogimus, & ab omnibus cutaneis remedijs, & a calidi intemperato calore ibid. d. & 64. a. & b
 Pituita existente in secundâ regione cutanea remedia non conueniunt, quia ea, ob eius crassitatem per cutem educi nequit. 64. b
 Pituita in prima cruditatum regione existens, dum preparatur a medico, simul cum preparantibus, & cum vilius ratione ea, quæ minime aliis subducunt commiscenda sunt. 64. d. & 65. a
 Pituita a frigido crassifacta a calore liquefit, ac tenuatur. 65. d. & 66
 Pituita cruda in ventriculi fundo iacens, ad primasque venas fluxens, & fluxura prima remouenda per vomitum, & preparanda prius ad vomitum agendū: mox alia pituita iam in primis venis fluxa ad deiectionem disponenda est. 89. c. d. & 90. & educenda.
 Pituita a ventriculi fundo ad primas venas fluxens, vel fluxura ad vomitum preparandæ quibus remedijs. 89 d. & 90
 Pituita cruda primæ regionis dug sunt preparationes, nimirum ad aluinam purgationem. & ad vomitum: præparantia pituitæ tres possident conditiones. 89. d
 Pituita cruda ad vomitum agendum iam parata, quibus remedijs educenda sit. 90. b. c. & d
 Pituita cruda quando per vomitum non est euacuanda. ibidem.
 Pituitam primariam venarum ad aluinam purgationem preparantia remedia a Hipp. & Gal. constituta. 92. c. & d. & 93
 Pituitosarum qui summam primæ regionis habent copia, tantum oximelite aqoso nutriendi sunt usque ad conuersionem, si virtus valida talem vilius rationem ferre possit ex Hipp. sententia. 92. c
 Pituita ubi valde copiosa fuerit in prima regione mulla hyssopo colla tamini: ab Hip. & a Gal. præbebatur pro nutrimento tenet usque ad tertium, & quartum, & etiâ septimum diem, rationesque redduntur. 92. d
 Pituita valde copiosa affectis solum nutriendi oximelite, aliquando, etiam persans cremore, & mulsu exiguo ut ait Galenus pinis dicitur. 92. d
 Pituitam corpora habentia legam serunt medium. 92. d
 Pituitæ copiosæ curandæ persans cremorē debet Hipp. 92. d
 Pituitam preparantia alia, aut quæ spiritus ebullientibus est, non est calidus ut aliqui temere putant, immo frigidus. 94. & 95
 Ad pituitam crudam secundæ regionis alimenteria ab Hipp. posita. 10. 9. d
 Trisidij mensura a capacitare membri offensi exhamitur. 40. c. d. & 41. a
 Precordia, seu hypochondria tur gida, inflata, requirunt carminatiua ad ventrem inferiorem flatum, & cruditatem ducentia per aluum. 75. c
 Preparantibus pituitam primæ regionis comiscenda sunt ea medicamenta, quæ minime acris sunt, minimeque alui subducunt. 64. d. 65. a. & quæ sint hæc remedia ibidem.
 Preparantia humores crudos. 89. d. atres habet facultates.

b 3 Tra-

Index locupletissimus

Preparantia pituitum. 92. r. d. & 93. & 94. & 95. inter quas spiriens chalc ambitus est, qui calidus non est, ut quidam boni viri falso putant, immo frigidus. 94. & 95.
Preparantia interna cruditates pituitosas, & aere secundae regionis. 107. a & b
Preparantia interna, & externa evacuationis cutanea insensibilis cruditatum tertiae, & quartae regionis diaphoretica. 114. r. d. & 115. & alimenta.
Praxagora error. 10. b
Pituita cum melle pauco pro nutrimento danda quatuor primis, senescentibus diebus, ad cruditates primae regionis recte curandas, ac preparandas, detergendas atque per alium melle melle subducendum, ne infecundam regionem fluant. 67. d. & 68. a
Pituita cremor conuenit pituita coquenda. 92. d
Pituita cremorem melli comixtum Hip. propinabat ubi pituita copia infestabat. 93. d
Pituita cremor, & sarrisus quando loco melle crudus praebeendus. 93. d
Pituita cremor, melle, & oleum dulcissimum in acerbis, & mordacibus compertis humoribus ibid.
Pituita & melle inter alimen. a. oximeli acro, & melle byssopo cocta inter pharmaca. 103. d
Pituita cremor quando non conuenit. 104. d
Pituita cremor si nimis alium ducat, tunc loco eius sarris cremor dandus. 104. a
Pituita cremoris facultas. 109. c
Pulmonis caro rara, & mollis, rarius vero densissima: be par vero carum habet mediam inter carnem renam, & pulmonis. 26. c
Pulso de bubus fonendus. 71. b. & excitandus ad collationem agendam in tumoribus frigidis, tensionibus, & obstruendis, & curabitur maxima flatum aiguita, & sicca. 71. c. & d
Pulmonis conformatio. 59. a. & b. & quomodo pulmo facit obstruatur. 59. a. & b. & 58. d
Pulsus mutationem explorare debet in cruditatibus recte curandis. 93. d
Purgatio humorum educit humor pituitosus, biliosus flauus, & atrus, vel melancholicus, & serosus. 29. d
Purgatio est illico post sanguinis missionem in cruditatibus acerbis, sine vi uiu instanti. mone: in cruditatibus autem pituitosis post sanguinis missionem vires refocilandae sunt vtilidam purgationem. 106. d
Purgatio post vena sectionem agenda ubi aqua tum morbi magnitudo sanguinea, tum cacosyma cernitur: & cum aluicula qua sunt ex hac curatione: & iactant, qua sequuntur si in oppositum medicus fegerat. 105. c. & d
Purgatio cruditatum pituitosarum & mordacium, secundae regionis. 108. a. & b
Pur optimum ex Hipp. & Galeno. 48. b
Puris albedinis causa philosophica, ex Hip. Platone, Aristotele, & Galeno. 48. b. c. & d
Puris albedinis causa philosophica non est immediata. 48. d
Puris albedinis causa medica immediata declaratur. 48. d & 49. a
Pur alimentum vena, & arteria: pur enim metaphorice vena continetur vocatur. 48. a. & b

Puris perfecti definitio ab Hipp. & Galeno statuta delineatur. 48. & 49
Puris albus sit a partibus solidis spermaticis, qua nam sint illa partes. 49. a

Q

Q Vies qualis requiruntur ad preparandam, simulque coquendam cruditatum copiam prima cruditatum regionis. 64. a. & b

R

R Elaxantia pharmaca chalybea graec dicuntur. 96. b. & eorum vires.
Relaxans medicamentum ex abietis seminibus, chamamelis, anethi, & populi nigra & c. 96. c. pinguedo, adeps sensus. ibid.
Relaxantium catalogus. 96. b. c. d. & 97
Relaxantia graec chalybea dicuntur, & na calida, & humida sunt. 113. d
Remedium ad mensuram eius quantitatem proportionem invenire oportet. 40. c
Remedia pro cute curanda mitiora, pro profundo vero curando valentiora. 40. c. d
Remedy mensura a capacitate partis afflicta elicitur. 40. c. d. & 41. a
Remedia, qua per cutem euacuant extrahendo insensibiliter epispastica vocantur, ea vero, qua per cutem euacuant digerendo diaphoretica sunt. 116. b
Regio cruditatum in toto corpore quatuor sunt. 24.
Regio prima cruditatum. 24. b. c. d
Regio secunda cruditatum. 25. a. b
Regio tertia cruditatum. 25. c. d. 26
Regio quarta cruditatum. 27. b
Regionis cruditatum prima nota: a recta. 33. d. & 34. a & b. ab afflicte ventriculi vitia per rictus dignoscenda. ibid.
Regionis primae cruditatum nota ex mala viellus ratione precessa; & ab alijs tribus externis erroribus elicitur: nimirum a corpore antea excrementis afflicto: ex cibi, & a virginitate, vel somno exiguo. 34. d
Regionis primae copiae pituitae in ventriculi fundo generis, a deiectionibus excrementorum elicitur notis. 35. a. & b. & ex vomitionibus. 35. c
Regionis primae copiae pituitae ex formatione partis afflictae magnitudine, & duritie nota desumitur. 35. d
Regionis primae cruditatum copia ex accidentibus eas cruditates consequentibus, notis traduntur. 36. a
Regionis quartae cruditates acies quomodo curandae Galenos docet. 41. b
Regionis primae maioris, et minoris copiae notis. 37. a
Regionis secundae cruditatum nota. 37. b. c
Regionis secundae, tertiae, & quartae cruditatum notis in genere. 39. a. b. & c. in specie. 39. d. & 40. a
Regionis secundae, tertiae, & quartae cruditates suas speciebus distinctas dignoscendas ex sudore ait Gal. 44. c
Regionis secundae cruditatum signa ex urina sua consistencia, colore, quantitate, odore, liquore, & contentis deprehenduntur. 46. b
Regionis secundae cruditatum, & concoctionem signa.

Rerum notabilium .

- diagnostica vera ex urinis desumpta habentur d fol.
47. usque ad fol. 56.
- Regionum omnium quatuor cruditatium simul afflicta
Nota ex calori, & frigoris sensu, & ex colore totius
habitus corporis. 57. a. & b
- Regionis prima cruditatum indicatio prima est remissi-
o seu derivatio, secunda est evacuatio. 61. c. & d.
tertia vero est partis fluxionem in aditus emenda-
tio. 62. a. & b
- Regionis prima cruditatum cetera indicationes sunt,
ad aquatam seu preparatam cruditatum tum mari-
um tum vitium totius corporis ad expurgationes apri-
atque calidi ianati languide coquentis excusatio a 62. c.
usque ad fol. 72
- Regionis prima cruditatum ad aquatam, seu preparatam
a medico scienda, per alteram contraria effici debet
63. b. in qua 2. illustranda a calidis evidenter liqua-
tibus nos cavere debemus, ne illa cruditates ad secun-
dam, ac tertiam accedant regionem, tunc eam multa
oboviscuntur illarum ibidem c. similiter eadem ratione
a diuretici nos abstinere debemus, & ab omnibus
crudis remedijs, & calore aeris improprio ibid.
d. & 64. a. & b. & a quocunque motu ibid.
- Regionis prima ad cruditatem preparandas una cu pra-
paratibus, & tractus ratione ea, quae alium mittimus
subducunt danda sunt. 64. d. & 65. a
- Regionis tertia, nempe videretur extirparum, & cor-
poris habitus cruditates prius coequae a natura, &
preparanda a medico, postea diaphoretici externi
per eam resoluenda sunt. 65. c
- Regionis prima cruditas non indicatio vitalis 74. b. quae
vel a tota universa totius corporis virtute naturae sub-
stantiæ, vel a virtute substantiæ particulari viscer-
um exhibetur tripliciter quae virtutis naturae substantiæ
simul cum suis originali temperamento conservanda
indicatione vitalis, nempe spiritus calidi ianati, & par-
tes solidae, & species citra 74. d. & 75. a. b. c. & d
- Regionis prima cruditas non pituitosorum indicatio vita-
lis, ab vaineris naturae totius corporis recepta, qualem
v. l. is rationem postulat. 75. b. c. & d. & 76. a
- Regionis secunda cruditatum tum mordacium, quam pi-
tuitosorum indicationes. 77. b. c. & d. & 78. a
- Regio prima a cruditatibus latentibus facilius per veni-
um, & per secessum curatur. 77. c
- Regio secunda cruditatum commodè per alium urinam,
& sudorem curatur a cruditatibus. 77. c. & d
- Regionis secunda cruditates magis periculo referat sunt,
quam prima regionis. 77. d
- Regionis secunda cruditates quas iacturas inferunt 77. d
- Regionis tertia, & quarta cruditas non mordacium indi-
cationes. 78. & 79
- Regionis tertia, & quarta cruditates acres vomitum,
prohibent. 79. a. & b
- Regionum cruditatum compositiones quæ sint, quot etiã
harum compositionum indicationes a Galeo consi-
ta sunt. 80
- Regionis prima, cum secunda regione cruditatum pitui-
tosorum compositiones quales insunt indicationes.
81. b. c. Ha compositiones novem sunt. 81. d. Harum
compositionum novem comparatio quo ad maiorem,
minorem, & nullam considerationem curationis vena-
sclione, alteratione, & purgatione molienda 82. a. b
- Regionis prima pituitosa lesa, & regionis secunda mor-
daci cruditatibus affecta compositiones novem sunt;
& convenientia & differentia ab alijs novem compo-
sitionibus alijs, & harum indicationes. 82. c. d. &
83. a
- Regionis prima cruditatum pituitosorum, & regionis ter-
tia, & quarta cruditatum mordacium compositiones
indicationes exhibentur, a Galeo statim, & exem-
plis illustratæ 83. & 84
- Regionis prima cruditatum pituitosorum & regionis ter-
tia, & quarta cruditatum mordacium compositiones
novem sunt. 84. a. harum comparatio, convenientia, &
& contrarietas quo ad maiorem, minorem, & nullam
considerationem habendam curationis ipsam venæ
sclione, alteratione, & purgatione molienda ibidem
b. c. & d
- Regionis secunda cum tertia, & quarta regione crudita-
tes compositæ suas desunt indicationes. 85. a. harum
cruditatum compositiones novem certantur ibidem b.
comparatio harum novem compositionum quo ad ma-
iorem, minorem, & nullam considerationem habendam
curationis venæ sclione, alteratione, & purgatione
administranda ibid. c. & d. & 86
- Regionis secunda cruditates ad primam transferri debet
regionem 85. d. servata a consuetudine agri ibid.
- Regionum omnium quatuor compositionum cruditatum
indicationes. 87. harum compositionum duo sunt gene-
ra, & quinquaginta quatuor differentie ibid.
- Regionis prima cruditates non per se sanguinis missionem
per venam caavam, sed per venam portam hamor-
roidum, & quando. 89. a. & b
- Regionis prima cruditatum roborativa remedia. 103. b
- Regionis prima cruditatum recte curandarum vilius ra-
tio. 103. d. ab Hipp. & a Galeo statim, c. 104. b
- Regione secunda quando atque tum plethora, tum caco-
chymia subest, utrinque morbi magnitudinem effi-
citur prius vena scienda est, postea purganda. 105.
c. emolumenta, & quando in oppositum sit salutaris, & q
sequuntur ibid. d
- Regionis secunda ad cruditates acres recte curandas ve-
nae cubiti sclione; hamorroidum apertio; vena malico-
li sclione; & purgatio. 106. c. & d
- Regionis secunda cruditas em pituitosam, ac mordacem
extrinseca digerentia, laxantia, & succentia remediis.
107. d
- Regionis secunda cruditatum pituitosorum, & mor-
daci tum recte curandarum vilius ratio observanda. 109
- Regionis tertia, cruditates vel in parte interiori sunt,
& ha per alium expurgantur, vel in parte exteriori,
& ista per curam diaphoreticis, & epispasticis praestatis
curantur. 110. b
- Regionis tertie cruditates in parte exteriori porositatem
existentes antequam per curam diaphoreticis & epi-
spasticis remedijs curentur prius ad cruditates tertia
regionis partis interna educendas, internis, & exter-
nis maturantibus, laxantibus, & ad aquantibus prepa-
randis una cum vniuersis venenis, & phlegmibus, & ama-
ris educendæ sunt alijs purgationibus validis quo ad
postremum posse, Et eodè tempore, quo ad diophore scilicet,
epispasticis, utrimque praestatis etiam singula bebbema
de semel alijs fortis salinis purgare debemus. 110.
c. & d. & 112. a. & b

Regio-

Index locupletissimus

Regionis tertiae, & quartae cruditatum preparatio, tam interna, quam externa, ad euacuationem cutaneam infusibilem medicandam. 114. c. & d. & 115. & alimena.

Regionis tertiae, & quartae cruditatum vniuersi corporis materij vitijs euacuatio cutanea. tam diaphoretica, tam epispastica. 116. & 117. 118. 119. 120. & 121.

Regionis primae cum tertia, & quarta regione compositio nis recta curatio. 123. d.

Regionis secundae cum tertia, & quarta regione recta curatio a Galeno constituta. 124.

Regionum cantharum compositionum cruditatum recta curatio. 125. & 126.

Regionis primae cruditates si ad secundam, ac tertiam peruenirent regionem, quinque iellurg fierent. 126. b.

Regionum cruditatum compositiones. 128. a.

Renum caro densissima est, pulmonis vero caro spongiosa rara, & mollior sic, & licet; tunc vero medijs inter utrumque continet eorum. 128. c.

Renum natura, seu formatio. 129. a.

Renellere oportet, ubi vacuare non licet. 73. d.

Renisio per longitudinem fit, derivatio vero ad latera. 73. d.

Renisio duas habet species **sursum**, & **deorsum** ibid.

Rigores, & animi defectus ob frigora a succis. 57. c.

Rigores a putrida acida sunt sine febre. 57. d.

Roborandum est prius membrum mittens seu wandans, quam recipiens. 74. a.

Roboratio membri afflicti duplex est, nam vel in egra, vel media. 73. c. & d. & 74. a.

Rubificatio epictorum efficacissima ad ventriculum roborandum. 101. b.

Ruellus quid sit. 33. d. 34. b.

Ruellus ab actione ventriculi laesi fit. ibid.

Ruellus vtiliter sunt ad actionem ventriculi affectam emendatam gignendum. 33. d.

Ruellus venterum egritudine denuntiat ibid.

Ruellus exprimitur calsi bonitatem, & malitiam ibid.

Ruellus de genere spirituum, & flatuum est. 33. d.

Ruellus differens 34. a.

Ruellus aidorosus ibidem & 34. b. c. & quid significat, ibidem.

Ruellus sumosus, & a quo calore fiat. 34. a. & quid significat.

Ruellus acidus, qui a calore promouente, & a frigidityte vincit fit ibid. & b. quid significat ibid.

Ruellus frigidus. 34. c. quid significat.

Ruellus falsus, & quid significat. 34. c.

Ruellus acidi a quo proueniunt. 14. & 6.

S

Saccharum a Galeno cognitum medium habet locum inter mulsam, & oxmeli. 104. c.

Sal, & nitrum crassescunt non a calido, nec a frigore immediate, ut putant Aristoteles sed a sicco, & ab humido liquefunt. 66. c.

Salutis desperatae signum. 73. b.

Sanguis est veluti septimus differentia humoris reponenda inter tres differentias cruditatum pituitosarum, et alias tres differentias cruditatum mordacium. 9. a.

Sanguis audacter mittendus in prima differentia crudita-

tum pituitosarum, & aerium; ubi parum ha cruditas a sanguinis natura recedunt: nihil vero in tertia differentia humorum cruditatum cum plurimum ha cruditates a sanguinis natura distet: de sanguinis missione copiosius enactura loquendo considerat vero in secunda differentia. 8. d. & 9. a.

Sanguificatio an a sectionis propria substantia, vel a venis fiat. 15. b.

Sanguis malus in primis colligitur venis veng parit, qui gignitur ante sanguinis generationem, & pituitosus est, non tamen proprius pituitosus, cum is sanguis sit cui admiscetur pituita, & ille sanguis excrementosus est, non autem malus, unde malus sanguis, & sanguis excrementosus pituitosus differt. 24. b.

Sanguis impurus, & excrementosus, biliosus, melancholicus seu atrabilis, & feruosus est. 25. b. & pituitosus proprius, per pituitae compositionem falsus ibid.

Sanguis malus proprius, qui improprie pituitosus est, & crudus nondum coctus, non autem pituitae comixtus. 25. b.

Sanguis melancholicus scabiem, lepram, elephantiasim, vitiligines nigras, & phagedenas parit. 28. c.

Sanguis bonus, ac temperatus in calore phlegmonem efficit: ibid.

Sanguis calidior, & subtilior his flans comixtus erysipelatam phlegmonosam gignit. 28. c.

Sanguis calidissimus sacrum ignem & variolas producit. 28. c.

Sanguis melancholicus ex parte crassa calida carbones, ex parte non calida caneros producit. 28. c.

Sanguinis concoctionis quatuor sunt gradus, nam primus in hepatis cauo, secundus in hepatis gibbo, tertius in sua venosi generis, quartus in venis extremis carnis. 47. d.

Sanguificationis prima alteratio in chylo facta, quae dispositio est proxima ad sanguificationem efficiendam, in venis meseraicis fit: ubi prima rubedo fit. 13. d.

Sanguis crudus quis nam sit. 58. b.

Sanguis inter cruditatem pituitosarum, & mordacium genus in medio sua natura est. 77. c.

Sanguis nouem modis considerandus quo ad eius eductionem, in cruditatibus pituitosus recte curandus secundae regionis. 106. a.

Sanguine educto vires insistant. 106. a. & b.

Sanguinis missio in cruditatibus primae regionis recte curandis non conuenit per venam canem, sed per venam portam hyemorrhoidum. 88. & 89. a. c. iellurg, quae huiusmodi si tunc per venam canem sanguis educeretur. 89. a. & b.

Sanguinis missio per venam canem cubiti cephalicam conuenit in leishargo ubi sanguis pituitosus peccat, & morbi magnitudo in cerebro fluxa, & fluens est. 89. b.

Sanguis mittendus est per venam portam hyemorrhoidum respectu derivationis in plemate phlegmonoso mesenterici, & cani hepatis: ratione vero remissionis ad euacuandam maiorem inflammationem imminuentem harum partium, si ab hepate, & a toto genere venoso ad eas partes sanguis calidissimus sua natura fluxit et per venam iccorariam sanguis tunc mittendus. 89. b.

Sanguinis missio in curatione cruditatum pituitosarum secundae regionis. 105. c. d. & 106. a.

Sanguinis missio in curatione cruditatum mordacium secundae

Rerum notabiliū.

Sanguis aut altius educendus in aerem cruditatum co-
pia secunda regionis recte curanda, quam in pituitosis
cruditatibus. 106. c

Sanguinis missionem per venam secundam qui nolunt
admittere, si maior detestio conuenit: & qui nec etiā
nolunt purgationem, quid agendum sit ex Galeni men-
te. 124. b

Sanguisatio vitata ob mensem erri obstructions. 36. c.

d. & ob hepatis obstructions ibid.

Sanitatis recuperanda signum. 72. b

Scabies a melancholia fit. 28. c

Serofa humiditas a calore magno putredine incli absuntur,
30. a

Serofam excrementum vehiculum est aliorum succorum,
quo hi succi in penitiorum partem tertia cruditatis
regionis penetrantur. 30. a

Tro scirrhos partium adinsumdo perfusio, & stillicidium
olei, non autem a que lana foras ducuntur. 119. d

Ad scirrhos diuclendos stillicidium fomentum, & sus-
summum. 120. d

Ad scirrhos recte curandos vicius ratio stricla optimē,
est. 121. c

In scirrho venis interna pharmaca danda ad alnum pur-
gandum singula hebdomada semel. 121. c

Scirrhosa partii iam a scirrho maiori ex parte curat cor-
roborationia remedia. 121. d. & 122. Decoctum pro stil-
licidio fomento, & suffumigatio, & modus, ordo, & tem-
pus, quo eo vti debemus, ut pars scirrhosa eodem tem-
pore, & curata, & roborata maneat, ne denno afficiat-
ur. 122. a. curatum ad idem ibid.

Scirrhii cruditates per cutem diaphoretica, & epispastica
vacuatione curantur. 120. d

Scropi tres sunt in metodo curatiua. 60. a

Siccare oportet ubi vacuare non licet. 72. d

Signa diagnostica cruditatis, sedis afflicta, morbi, & cau-
sa ex quinque fontibus, seu generibus exhauiuntur,
32. b. quia primo modo ab alione lasa, vel usu offen-
so, secundo modo ab excrementis excrementis: tertio
modo ab accidentibus, quae ex ea alione lasa, vel ex
eorsu offenso oriuntur; quarto modo a situ membri af-
flicti; quinto vero modo a partis lasa conformatione,
seu figuratiōe talia signa desumuntur. 33. a. b. c

Solutiōum purgantium facultates. 100. a

Solutiua parca in quantitate data lenientia, & alteran-
tia euadunt. 100. b

Solutiua ventris externa ab Actio posita. 111. d

Somnus conciliatur ex balneo. 86. c

Somnus ex balneo contrarius causa est, & signum spera-
te scilicet, & breuitatis morbo: sicut ex balneo si agri
dormire nequeat, totum in oppositum res se habet.
86. c. d

Sorbtiones non habent Graeci in cruditatibus pituitosi-
valde copiosis recte curandis, nisi elapso septimo, vel
quarto, vel tertio die: & cum his sorbitionibus pisces
saxatiles, & aues montanas dabant. 104. c

Spasmus chalcantibus exterorum pituitam incidentium
esset assiduum est. 9. b

Spiritus vitrioli frigida; & sicca est nihil igneus nec
calidus, neque acer seu mordax. 94. b. c. d. & 95

Spiritus chalcantibus ut acidus ad praecordiorum ardo-
rem valet. 94. c

Spiritus vitrioli, ut acidus parum & ferè nihil mordicat

cum mordicatio communis sit saporis acido, amari, &
acri ex Galeno, atamen parum mordicat, & parum
pro nihilo cernitur. 94. c

Spiritus vitrioli virtus, ac dosi a Quercetano declar. 4. 17.

94. d. d. Diacorde. 94. d. d. Muscolo vitrioli olei d. 17.

& virtus descripta ibid.

Spiritus chalcantibus virtus, & dosi descripta d. Crudo,
d. Libanio. 95. a. d. Vecberio ibid. b

Spiritus chalcantibus experimenta rationi conueniat. 2. 17.

& ad quatuor. 95. b

Spiritus vitrioli cauius, ut is dari possit ad cruditates pi-
uitae regionis recte curandas. 95. c

Spiritus chalcantibus, & sulphuris diaphoretici suum ca-
terorum efficacissimi intro assumpti, ac turissimi assu-
mordaces, nec ignei. 118. c

Spacia seu porositates, vel euerula in carnosa specie,
et partibus solidis insunt, in quibus saepe cruditatis cul-
liguntur. 26. a

Spongiosa paries inanes, rara molles, & parua: & reple-
ta, densa, dura, & magna euadunt. 26. c. & d

Spumofum omne album est. 48. b

Stercus bubulinum diaphoreticum est ab Hippocrate in
120. a

Stillicidium ad tumores duros, & scirrhos non aqua la-
ue foras ducuntur, ut aliqui falso putant, sed olei la-
uantis, ac emollientis. 119. d

Stillicidium decolli ad tumores duros, & scirrhos ex-
piandos. 120. d

Stupor seu torpor a pituita vitrea icore. 43. d

Suffumigum, ad tumores durissimos adinsumdos. 120. d

Sympathia partium afflictarum ab hepate laeso. 27. c. d.

& 28

Sympathia partium afflictarum a ventriculo offenso. 13.

c. d. & 14

Sympathia membrorum laesorum a capite afflicto. 14. a.

& 27. d. & 28. a

Sympathia varia plurium partium laesarum a cruditati-
bus acris. 27. c. d. & 28

Symptomata warborum pituitosorum. 36

Symptomata ab icoribus orta. 43. c. & d. & 44. a

Syncope ex cruditatibus orta, quo praesidio curatur. Sed
etiam secus spiritum vitrioli curatur. 93. b

Sudoris natura, & sapor. 44. c

Sudor succorum in uniuerso corpore existentium nota est
37. c. & 45. d. & 46. a

Sudore itenua excrementa supernatua a toto corpore edu-
cuntur. 43. c

Ex sudore, a sapore deprehensa, secunda, tertia, & quarta
cruditatum regionis, cruditates suis speciebus distin-
ctas nos dignoscere debere ait Gal. 44. c

Sudor acidus 44. c. & quid denotat.

Sudor salis ibid. & quid denotat.

Sudor lutosus. 44. d. quid indicat.

Sudor tertia conuulsionis tunc excrementum improprie
44. d. non autem proprie.

Sudor sordidus, eiusque causa, & quid denotat. 45. a

Sudor vultuosus, eiusque causa, & quid denotat. 44. a. b

Sudor fatidus, & eius causa, & significatio. 45. b. c

Sudores, qui naturales, & qui praeter naturales sunt, selio
45. d

Sudorum succorum color, & sapor quomodo deprehendi
possit. 45. d. & 46

Sudoris

Index locupletissimus

Sudores eructus, egressa a tota corpore, a gustu, odore, & a crassitie agnoscenda. 45. d. 46. a
Sudores biliosi coloris flauo. 45. a
Sudores biliosi coloris pallidi. 46. a
Sudores biliosi coloris compositi ex flauo, & pallido. 46. a
Sudor ore ab agra degustandus est. 45. a. & b. ut sapore is dignoscatur ibid.
Sudor quando fit excremento terui tercia concessio-
nis, & malus curatur. 73. d

I

Insistit, & durities differunt. 96. b
Tensio in parte molle quomodo fit. 59. b
Theriac a optimis ad ventriculum frigidum, et humidum
roborandum. 101. a
Thoraci repellenti: nunquam competunt, sed laxantia,
sine villo adstringente: & extrahentia acia laxanti-
bus amiscenda sunt. 68. d. & 69. a
Thoraci curvibilia sic a competis ad extrahendum, to-
to reliquo expurgato corpore. 68. d. & 69. a
Tophi quomodo fiant. 59. b
Topicorum praesidia non quatuor sunt genera. 95. d
Topica laxantia, mollientia, digerentia, & aperientia,
qua elidit, & humidat per se sunt. 96. b
Topica. I. localia detergentia, ante laxantia ad mouenda;
pro obstructionsibus hypochondriorum tollenda. 95. d.
& 96. a
Topica praesidia. 112. a. & b
Tormina ventris a pituita. 36. b
Torpor seu slopor apitui a vitrea icore. 43. d
Tumor mellicia cognatus. 43. d
Tumor ab aere in bilis densa ibid.
Tumoribus viscerum deteriora extrinseca a competunt,
ante laxantia, & mollientia, prius quam totum cor-
pus reliquum purgatur. 69. c. & d. & 70. a. & b.
Ad tumores durescences eripiendos stillicidium, fomen-
tum, & suffumigium. 120. d
Tumoribus duris, & scirrhis ac etiam in fomentationi-
bus, vel suffumigiis conueniunt. 120. e
Tumores vel in parvis sua natura aris, vel densa in-
sunt. 120. b
Tumore duri, ac scirrhi ventriculi, menterici, hepatis,
lienii, & vteri localis seu topici ac curatiore est
ad ministranda a tempore, ordine, & modo distribuenda.
119. & 120. & 121
Ad tumores duros tollendos tres modi maturationis re-
quiruntur. 119. b
Tumore duri, ac scirrhi, ne lapidescent ac exsic-
cantur in curatione eorum canere nos tenemur. 119. c
Ad tumores curandos duros triplo magis mollire, quam
sicci euacuare, ne hi lapidescent. 119. c. & d
Ad tumores scirrhisos recte curandos vilius ratio Ari-
steli competit. 121. c
Tumore parvis iam a scirrhis maiori ex parte curate ro-
borantia praesidia. 121. d. & 122. Decetum pro stillicidio,
fomento, & suffumigio; & modus ordo, ac tem-
pus quo, & vbi debemus, ut pari scirrhis eodem tem-
pore, & curate, & roborata maneat; ne deum tumore
afficiatur. 122. a. etiam ad idem ibid. b
Turgentia humorum vel ad copiam, vel ad prauitatem.
86. b

V

Vacuatioes a nostro corpore, & a corporis parti-
bus quot fiant. 73. a
Variole a sanguine calidissimo fiant. 28. e
Vena scilio spualiter educit sanguinem pituitum, &
bilem flauum, & atram, vel melancholicum & humo-
rem serosum. 29. d
Venae paruae apilares in partibus solidis, & specie-
carosae resedentes, potius terria suas regionis erudi-
tatum, quam secunda. 25. b. & 26
Vena malleoli scilio. 106. d
Vena scilio iam scilicet vires insinuada. 106. a. & b
Vena scilio prius fit, deinde purgatio, vbi aequi inueni-
tur morbi magni: quo sanguinea, & caecothyma, & e-
molumenta, qua sunt ex hac curatione, & iudicia. quod
sequuntur, si in oppositum dederis imperitus se gerat.
105. d. & d
Vena scilio in lassitudine vlcerosam dum eruditates acce-
citiam in genere venoso adsunt. 106. d
Ventriculus instrumentum principale gignens pituitam,
ut pituita est. 11. c
Ventriculus debilis per essentiam vel per partem insinuat
talit, vel similis, aut sua facultate elidit ea rite la-
sa pituitam erudam per se, & primo gignit, & quan-
do per accidens, & per consensum. 11. d. & 12. a
Ventriculus, & cerebrum duo sunt fontes eruditatum pi-
tuitosarum. 13. a
Ventriculus facili afficitur a flatu, & a serosa humiditate,
quando lien aquosa humiditate lasus est. 26. d
Ventriculus & vesica urinaria terminus est purgatio-
nis totius corporis, quia aqua a toto corpore, & a liene
attrahit expurgari potest per ventriculum vel per ve-
sicam. 26. d. sed in plerisque per ventriculum pur-
gatur.
Ventriculi fundus interdum omnibus eruditatum gene-
ribus plenus est. 29. a. b
Ventriculi angor a pituita copiosa. 26. b
Ventris profluita eruditatem copiosam in prima regio-
ne adesse deuiat. 26. d
Ventriculi media roboratio, non omnino reliquo purgato
corpore. 73. c
Ventriculi media roboratio tam extrinseca, quam intrin-
seca in febre quotidiana, & in tertiana spuria. 73. d.
vbi pituita generatio ad huc vigerit. id id.
Ventriculus debet esse a eruditatibus euacuatus, si intrin-
secum eum roborare volueris ventriculum, alioquin er-
ror venient. 73. d
Ventriculus eruditatibus pituitosis refertus fouendus est
plurimo oleo absinthij. 73. d
A ventriculo pare pituitam recipiens roboranda est, no
recipiat, ut est mesenterion, pancreon, & hepatis ca-
uum. 74. a
Ventriculum frigidum, & humidum pituitam gignens,
& ad primas vias mandantem cibi, & vilius ratio
roborans. 100. d
Ventriculum frigidum, & humidum intemperatum ro-
borantia intrinseca, & extrinseca. 100. d. & 101
Ventriculi fundus prima causa est generationis, & flu-
xionis pituita. 62. b
Ventriculus debilis fouendus. 71. b

Ven-

Rerum notabilium.

Ventrem purgantia externa ab Aetio posita. 111. d
 Ventriculi tumefacti duri iopicalis curatio, tempore, modo, & ordine distributa. 119. 120. & 121
 Vilius ratio limitanda est tempori, regioni, aetati, & constituti. 104. d
 Vilius ratio ad semicrudos succos pituitosos, & ad morbos, & dices rellé curandos. 109. b
 Vilius ratio in febrilio rellé curando strilla conuenit. 121. c
 Vilius ratio administranda, in compositione omnium. quatuor regionum rellé curanda. 125. d
 Vigilia ab acida, & salsa pituita. 36. a
 Vigilia ab ichore pituiti salis, & acida: ab ichore vero pituita vitrea somnolentia. 43. d
 Via aperienda sunt ad cruditates preparandas. 68. b. & c
 Via preparatur mollioribus, & laxantibus. 68. c
 Via preparandæ sunt mollioribus, & laxantibus, attamen aliquid adstringens vsu conueniendum, ad partis caloris naturalis tenorem seruandum. 68. c
 Via preparandæ tantum toto corpore purgato, & parte etiam partim purgata, & eius materia concessa. 68. c
 Via, quæ aperiendæ sunt in cruditatibus rellé curandis, laxantibus, & mollioribus, post corporis purgationem; Ideo anie corporis purgationem vis ipsæ aperiendæ sunt deterfuri externis. 69. b. & c. & d. quæ deterfunt, neque cum laxantibus, neque cum attrahentibus adiuuanda ibid. c. & quæ uiam sunt medicamenta isthuc a Galeno proposita ibid. d. & 70. a. & b
 Vias laxantia, mollientia, & aperiencia. 113. & 114
 Vinum febrilibus obest. 93. a
 Vinum succos crudos concoquit, summumque conciliat, et vrinam mouet. 72. a
 Vinum, quies, & somnus ad semicrudos coquēdos succos valent ibidem.
 Vinum ad omnino crudos coquēdos succos minime exhibendum, immo tantum ad semicrudos maturandos humores. 72. a. & b
 Vinum in summis cruditatibus, superueniente lipothymia in pane madesalio conuenit. 76. c
 Vino opheia madesalio quando danda in cruditatibus pituitosis 104. c. & 105. a. & quando vinum album post fortitionem dandum. 104. d
 Vinum oligophorum seu pauciflorum, & vinum poliphorum seu multiflorum. 105. a
 Vini emolumenta. 105. b
 Vina nigra ut crassa incongrua sunt ad cruditates primæ regionis rellé curandas. ibid.
 Vina refrigerantia arte facta ab Hipp. quæ diureticam, & simulque diæstorianam habent vinum. 125. c
 Vrina: substantia triplex spiritus calidi innati, & partes solida, & species carnosæ; et quomodo vires omnium membrorum ab usque carum substantia pendat. 74. d. & 75. a
 Vrina vlla in mesenterio influens datur. 36. c
 Visceribus spaciuitatibus infusi. 26. c
 Virilgines a melancholia fit. 28. c
 Vomitus est necessarius, ad crudem pituitam primæ regionis rellé curandam; ad pituitam in fundo ventriculi residentem, & ad primas venas fluentem, seu fluxu rami educendam, & deriuandam. 89. c. d. & 90.
 Vomitiones quibus remedijs disponantur. 89. d. & 90. a
 Vomitus administrandi tres requiruntur conditiones, ut

rellé vomitus pituiti fiat. 90. b
 Vomitus non fiat, si acres cruditates in tertia regione fuerint, vel si vis vomitus preparatæ non fini, nisi eggi ad vomendum idonei minime sint. 90. b
 Vomitus momenta, seu purgantis 90. c. interna: externa vero ibidem d
 Vomitiones ad ministrandæ in corporibus obesi modis, & ordi, ut eggi facilius vomant. 91. a. & b
 Vomendi modi, & ordo, quibus corpora gracilia facilius vomunt, sepecmq. ab Hippo. conueniuntur ad hoc rellé agendum. 91. c. & d
 Vomendi modi, & ordo ex Galeno. 92. a
 Vomitiones quot vicibus fieri debeant in corporibus crassiss, & quot in corporibus siccis ex Hipp. 92. a. & b
 Voluoli a pituita. 36. b
 Vomitus vehemens potest attrahere cruditates acres a tertia, & a quarta regione, ad secundam, & ad primam regionem. 83. d
 Vnctiones tantum inter cutanea remedia conueniunt, quæ non calfaciant, nec refrigerent, sed leniant, ac mulceant, ad coquendam, & maturandam cruditatem educendam. 64. b
 Vrina sola succi colli, vel crudi secunda regionis nota. 37. c. & d
 Vrina concoctionem, & cruditatem succorum in venis generis venosi ad esse denotat. 37. c. & cur. ibid. d
 Vrina rubra quod indicat. 37. c. & 43. c
 Vrina qualis succus in venis est, talem denotat succum. 37. d
 Vrina natura. 37. c. & d
 Vrina quot modis per accidentia impediatur, ut qualis in in venis succus est, talem denotare non possit succum. 38
 Vrina a pituita impeditur quo minus ostendat id quod in venis continetur. 38. a. b
 Vrina a melancholia, & a bile deprauatur ita, ut concoctionem, vel cruditatem in venis existentem ostendat. 38. b. & a sanguine grumoso, & a renu obstructionibus, & a pure perfetto, & a capite valde calido, & ab abscessu sub diaphragma genio, & a vesica laesa. 38. c. & d
 Vrina supra venas, renes, & vesicam concoctionem, & cruditatem denotat 38. d
 Vrina sua consistencia, colore, quantitate, odore, liquore, & contentis secundæ regionis cruditates denotat. 40. b
 Vrina sex sunt pendenda, nomen consistencia, color, quantitas, odor, liquor, & contenta. 46. b
 Vrina quid sit. 46. d
 Vrina facilius cognoscitur a calore defixitatis ibid.
 Vrina color naturalis subfusus est. 46. d. & cur. ibidem, & 47. a
 Vrina color a sanguinis rubeo colore & a pituita albo colore, & a bilis pallido, vel flauo colore aquabiliter si subfusus a capitis colorem, non autem a melancholia, & bilis rei causa redditur. 47. a. & b
 Vrina flauo colore tingida in venis biliosam ostendit cruditatem. 47. b
 Vrina albo colore crassa pituitam in venis esse crudam denotat. 47. b
 Vrina alba tenuis quid significat. 47. c
 Vrina alba tenuis in phreneticis mala. 47. c. quæ salis est quia bilis flaua ad cerebrum ascendit ibid.
 Vrina

Index locupletissimus

Urina aquosa alba, ac tenuis magnam in venis adesse cruditatem significat. 47.c
Urina aquosa alba, seu visq. de pituitoso genere est. 47.c
Urina contentum genericè ibid.
Urina contentum est urina forma reliqua vero urina tanquam materia habentur. 47.c.d
Urina contentum, seu forma signum est in urinis bonam, vel malam san guificationem saltem ostendens, ut vltimum excrementum illius sanguificationis crassum cuius separationem a parte liquidiori semper obseruare tenemur. 47.d
Urina contentum, seu hypostasys pus ab Hippocrate, & Galeno appellatur collum, & optimum metaphorice in venis, & arterijs existens: ideo Hippoc. ait pus alimentum esse vena, & artaria. 48.a. & b
Urina contentum, seu hypostasys alimentum tunicarum venarum, & arteriarum vocatur ibid.
Urina contentum, seu hypostasys suam colorem albū habet ab obbediem partium solidarum, a quibus concouitur. 49.a
Urina contentum, seu hypostasys suam naturam inter sanguinem, & pus. 49.a
Urina contentum, vel hypostasys necessario gignitur: & cur. 49. b. & c
Urina contentum, seu hypostasys concoctionem, vel cruditatem succorum generis venosi ostendit: nam concoctionem denotat, si facile a liquidiori parte urina segregetur. 49.c
Urina optima est, qua mediocriter crassa, & cuius contenta, vel hypostasys a parte liquidiori separantur. 49.c
Urina tenuis, ac turbata cruditatem significat ibid.
Urina tenuis cur cruditatem denotat. 49.d
Urina nimis crassa cur cruditatem ostendat. ibid.
Urina tenuis, & alba summum cruditatis denotat. 50.a
Urina contenti, seu hypostasys nomen. 50.b
Urina contentum seu hypostasys quid sit. ibid. & 47.c
Urina contentum, hypostasys, sedimentum, suspensum, & nebula ibid.
Urina in febre album et leue sedimentum continens, morbi celerem denotat solutionem. 50.c
Urina optima ex Hippocrate ostendit morbum breuem, aut longum. 50.c
Urina contentorum, seu hypostasys quantitas perpendenda, qua subsidet. 50.c
Urina sedimentum quibus, est copiosum. ibid.
Urina contentum seu hypostasys alba, leuis, aequalis contenta nō intermixtus semper esse debet, ut optima concoctionem denotant. 50.c.d
Urina contenta perniciosā cruditatem ostendentia sunt, vel farinosa, squamosa, furfacea, nigra, viridia, limidia, frigida. 50.d
Urina contenta optima concoctionem ostendentia mediocriter crassa esse debent, & cito subsidere debent ibid. & minime facta ibid.
Urina sedimentum an in hominibus sanis sit, nec ne. 51.a
Urina sedimentum, suspensum, & nubes, & sublimamentum quid sit, & eorum differentia. 51.a. & b
Urina sublimamentum ex Galeno etiam nubes, & an eorum vocatur in medio loco cyathi iacet. 51.b

Urina sedimentum in fundo iacet & cur. ibid. concoctionem perfectam indicans.
Urina sedimentum, etiam depositum vocatum quanto tūctum habet, tanto de graue in fundo matellæ possidet. 51.b
Urina nebula in superiori loco cyathi residet. 51.b
Urina contenta, seu hypostasys tres habent species, nempe nubes, suspensum, ac depositum. 51.c
Urina contenta has tres habent species quatenus concoctionis tres gradus obtinent. 51.c
Urina nebula in sublimi loco residens primum concoctionis gradum habet ibid. vnde cruditatem denotat.
Urina nebula alba a quo fiat. 51.c
Urina nebula fumida, fuliginosa, rubea, aut lactea, a quibus fiat. 51.d. & quid denotet ibid.
Urina nebula diuisa, & granulosa quid significat. 51.d
Urina suspensum, etiam encoroma, & sublimamentum appellatum & nubes in medio loco quid denotat. 51.d. & 52.a
Urina sedimentum in fundo sepe residens. 52.a. & b. c
Urina sedimentum omnino adsum in fundo iacens. 52.a. & b
Urina hypostasys in infimo iacens loco oīo conditiones continere debet, ut sedimentum sit, concoctionem optimam ostendens. 52.b
Urina contenti optimi lenitas a lenitate separate est. fol. 52.c
Urina contenta, vel hypostasys alias duas habent species, nempe coronam, & circumgentia. 52.c. & d. & 53.a. & b
Urina corona qua sit, a quibus fiat, & quid significat. 52.c. & d. & 53.a
Urina circumgentia, a quibus emanant, & quid denotat. 53.a. & b
Urina turbata, vel subingalis cruditas denotat. 53.c. d.
Urina turbata subingalis tres differentia. 53.d
Urina turbida a turbatione, & separationem partis crasse a liquidiori obseruare debemus. 54.a
Urina subingalis, & alia urinae emittitibus signum generalis concoctionis est separatio cito, & promptè facta dum urina possimum turbida mingitur cito, & promptè clarescit, & pars crassa a liquidiori segregatur. 54.b
Urina turbationis causa immediata est agitatio, & ebullitio a flatu promanans. ibid.
Urina cruda turbata a multo flatu urina comixta emergit. 55.a. ob calorem & deficientem agentem naturalem ac aliter autem cum calore praternaturali ibid.
Urina turbatio a calore naturali concoquente valido minime fit, nisi cruditatem copia summa fuerit, ratione cuius calor naturalis absolute validus, debilis fit. 55.c
Urina turbatio, cur prius fieri debeat ut erudorum succorum passio propria, & deinde concoctione superuentura a separationem hypostasys a liquidiori inducitur. 55.c
Urina turbata quo citius, ac vehementius clarescit, eo citius quoque bi crudi succi cocturi erunt: sicuti in oppositum quo tardius ea clarescit, eo tardius etiam cellum videri. 55.d
Urina turbata si non clarescat, tunc nulla coctio expectanda est. 55.d

Urina

Rerum notabilium.

Urina clara & mella, qua subinde turbescit, desperatæ con-

ditionis signum est. 55. d. & 56. a

Urina turbida in prima differentia si illico subsideat, &

sedimentum album, leue, & quale sit quid significat ex Galeni verbis. 56. a

Urina turbida in prima differentia qua non illico subsi-

deat, quid ostendat ex Galeni verbis ibid.

Urina sedimentum bonum non sufficit ad coctionem osten-

dendam in urina turbida & clarescilla, quia etiam ex-

lertitas temporis subsidentia faciendæ requiratur. 56. a

Urina sedimento malo existente, & ubi nulla urina tur-

bata separatio fit, quid agendum est, præ natura ro-

borandæ. 56. b

Uterique fælli ac duri, vel scirrhi curatio topicalis

tempore, modo, & ordine distribuita. 119. 120. 121

Uterus debilis fovendus. 71. b. & excitandus ad conco-

ctionem in tumoribus frigidis cucurbitula sicca igni-

ta. 71. a. & d

Pro vetero roborando possunt purgationem remedium,

Hippocratis. 119. d

X Illobalsamum, styraç, bdelium, opobalsamum ad ven-

triculum debilem roborandum. 101. b

Zingiber viride aceto maceratum ad cruditates pri-

ma regionis curandas. 99. b

Zingiber iunat concoctionem. 71. b

F I N I S.



leuaria
quodque
glidem
etudat
ama in
acquiret
acut
deficiatione
licet
edictis
regum
habent
corruo
proponunt
conueniunt
procurator
perit
Galena
medicis
supplet
euh
procurator
pharmacop
la

inge

inertio 7.d
quodque 1.b
filius 9.c
credentia 17.d
amara 16.b
acquirat ibid.d
per se 17.c
deficiatione 17.d
possunt ibid.d
adictis ibid.d
regum 17.b
habent 17.b
conueniunt 17.d
proponunt 17.b
conueniunt 17.d
per procurator 17.d
perit 17.c
Galena 17.b
edictis 17.c
supplet 17.d
procurator 17.d
pharmacop 17.b
la 17.c

expulsiu
dicitur
euenit
conuen
ludat
gignit
Galena
disputa
eius 17.b
aut
aut
fuerit
conueniunt
Gracilium
disputa
officiis
in viciis
fuerit
procurator
filius
vici
eodum
auti
expulsiu

expulsiu 17.d
dicitur 17.b
euenit 17.d
conuen 17.c
ludat 17.d
gignit 17.c
Galena 17.b
disputa 17.d
eius 17.b
aut 17.b
aut 17.b
fuerit 17.b
conueniunt 17.d
Gracilium 17.d
disputa 17.b
officiis 17.c
in viciis 17.d
fuerit 17.c
procurator 17.d
filius 17.d
vici 17.c
eodum 17.c
auti 17.c
expulsiu 17.d





DE CRVDITATIBVS RECTE DIGNOSCENDIS

RECTEQUE CVRANDIS.

LIBER PRIMVS.

In quo

Cruditatum nomina, essentia, facultates, causæ, &
organa omnino declarantur.

*Præterea de earum generibus, differentijs, & Speciebus exactè
disquiritur.*

Denique cruditatum quatuor regiones, & partium earum regio-
num sympathya, qua omnes nostri corporis partes ex
ijs fluentibus afficiuntur cruditatibus, vndique
patefunt.



C A P V T P R I M V M.

Huiusce operis vtilitas promulgatur.

A



De bellocilli
batio in princ.
pio.

Voniam ferè trigessimus huc vsque labitur annus, quo summa vigilan-
tia, longisque studijs, ac obseruationibus, semper diligentius quo po-
tui, ad Arti Medicæ rectam dandam operam, in meorum ægrotantium
salutis gratiam, id, quod vtilissimum, ac rectissimum agendum esse cõ-
sequi conatus sum; tum quadam mei naturali ductus instigatione, &
quia vt ait Salustius omnes homines, qui se se student præstare ceteris ani-
manibus, summa ope niti decet, ne vitam silentio transcant, veluti pecora,
qua natura prona, atque ventri obedientia fixæ, tum etiam religiosa im-
pulsus anxietate, simulque præmonitione, ac vniquam alicuius ægro-
tantis obitus culpabilis Medicus sim. Eaniquæ sanè ob causam, nullo meo prætermisso labore,
cuncta, quæ in hac Arte periculo relictæ sunt, & quæ ægrotum interitus culpabilem reddere Me-
dicum valent, elucidareque volui. Cum autem Artis Medicæ tria iuveniantur ge-
neralissima, quæ vt difficilia Medicum decipiendo, eum culpabilem efficere possunt, nimirum,
morbi magnitudo sanguinea, & cacochyma, quæ miseros interficiunt ægros, vel saltem eos in-
felicitè, seu contumaciter affligunt, atque cruditates, quæ eam cacochymam procreant magni-
tudinem. At vero quia de his duobus primis susè iam in duobus operibus exaratis doctrina pe-
nitur statuta est, vbi promptuarium expeditum habetur a quæ tum cuiuslibet missionis sangui-
nis rectè agenda, tum singulæ purgationis cacochymie rectè molienda: Ideo iure merito in hoc

Tomus Tertius.

A

opere

Tria in arte
Medica genera
sunt, quæ dis-
tinguenda, quo
Medicum deci-
pere possunt.
De duobus rebus
satis fatis, in-
his duobus, primi
bus voluminibus.
Nunc vero de
tertio dilu-
do agendum.
purgationis.

operē tertium constituere promptuatum enitar cuiuscunque cruditatis recte dignoscendae, recteque curandae. Et hoc sanē Hippocratis, & Galeni decretis, autoritatibus, rationibus, experientiarum, ac exemplis inire tentabo. Si namque homines eas cauerent cruditates, nunquam vilo magno corripere morbo, ex succis octo; Quae cruditates in nostro existentēs corpore, adeo cognitionis difficilis sunt, ut sapē, agrorum, iacturis desitescant. Ideoque harum cruditarum exacte studio cognicioni. Ceterum eo, quod frequenter licet a nobis haec dignoscantur cruditates, attamen difficillimē, diuissimēque earum integram ingredi valeamus curationem, tum ob earum cruditarum mentem rebellem medicamentis haudquaquam cedentem, tum propter locos, seu vias densas, & angustissimas, quibus haec insunt cruditates, ac per quas foras extrahi nequeunt; tum etiam cum causae has gignentis cruditates tolli non possint, nisi difficilē, ac diuturno temporis spatio; quippe quod sicuti cruditates ipsae iam ortae, adiunguntur, ita etiam facile a partibus obnoxiijs, seu a causis antecedentibus, seu praecipientibus vocatur, de quo reguntur, ac exinde in partem inanitam, & ipsam conflunt; ac inibi manendo putrescunt, & febrem pariuunt conuulsiuam. Verum curatu maximē difficilis interospiuatur, ubi plures loci has cruditatibus corporis offensi sunt, & ubi cruditates compositae ex contrarijs facultatibus emergunt; nec non a membris inaequaliter, & contraria qualitate interpetris, & instrumentis profluunt iactis. Tamēti ad huc difficilioris curationis haec possunt esse cruditates, quae vitæ allatas difficultates, corpora, quibus haec cruditates quoque subsunt, ad crudiorum humorum concoctionem a natura celebrandam, & ad preparationem, simulque purgationem a purito molendam Medico vtiq; inepta prorsus sint, ut interdum vlti venit; ut illi Aristidemo Domino, Domino Paulo Bragadeno hero meo, aequē multis alijs meis agros antiquis contigit, qui ipsis de causis temporis quatuordecim mensium decursu erant febriatque metis omni ingenio, omniq; industria, studio, ac diligentia ad eos patientes rectissimē curandos vias finit. Ac mirum fuit, eos ab initio vehementer, ac magno morbo vexatos, attis medicis instrumentis recte adhibitis saluatos fuisse; ac denique sospites euasisse: sicuti ē contra alios talium. vidi Medicis peritis non ducentibus ita affectos, mortem obijisse. Quoniam igitur haec cruditates morbos acutos, vehementerque magnos, nec non chronicos magnos, & paruos eorum causas sylogistica parant: proinde ad recte morbos magnos, & paruos humorales, curandos necessaria haec harum cruditarum aequē tam cognitio, quā a curatio conspicitur: ut Hippocrates, & Galenus affluerunt: immo Galenus ait a Medicis praestantissimis solas rerum causas cognosci adiuuandas: Ne itaque inter malos Medicos conuenerandis inuenerim Hippocratem inuita. Quare medicorum plerique malorum namque gubernatorum nobis finissima videtur, quae si tranquillo mari nauem regunt, nemo eos peccare deprehendat. Quod si eos vehementer ventus, aut tempestas oppresserit; iam omnibus manifeste conitatur equum imperitiam, & cuiusdam nauem perditam fuisse. Ad hanc sanē modum improbi plerique Medici, dum leuiter affectos curant, in quibus grauissimū errorē commisi nūbi perituli admittunt (cum multi huiusmodi morbi, ac longe frequentius, quā grauioribus hominibus contingant) in his quidem si delinquant, plerique latent: ubi verō in magnam, ac vehementem, ac periculosam morbum incidunt, tum ipsorum ars, & errores omnibus sunt conspicui, Horum enim cuiusque indices praesentia praesto sunt: neque in longum differuntur. Quorum etiam meminit hoc modo. Nam cum ob scientiam seruauimus vniuersalem sibi ipsis persuadent, sibi ipsam etiam artis opus singulare nouisse, non aliter, ac animum adit erinunt: ab igne examinatur, ita eorum ignorantia hae professione arguitur. Ut itaque Medicus inculpabilis, ac inculpatus, atque Medicus collega adaequatus, pro meo possit, euadere valeam, ita quacunque momentanea occasione rectissimē agendi paratus, circa cruditates allatas recte curandas; de his agere teneor, cum Hippocrates medicinā prodiderit. Quare & vniuersa ea, quae sunt morbosā, seu insalubria, & salubria explorata, & comperta esse debent, & eicē eadem singulatim, non tenuiter exerceri; si quis faciem, & inculpatum habitum, quia didicissimam vocamus sibi ungere vult: insignem enim utilitatem, tum aegris, tum hominibus artificibus adfert. Maximeque in morbis acutis ad necessarium est, cum Hippocrates exstat. Maxime in morbo acuto: Morbi enim celeritas cum occasione excludat a regressu, impellit enim, qui medicinam eleganter facit. Et eodem libro in Hurnio pag 129. ait Hippocrates, in afflictijs vehementia, & assidue incrementa, ducent affectu ob consilij inopiam plurima ad rem praesentem commoda effugiant, in tali itaque momento temporis alioquin opporuno animo sibi consistit. Praeterea etiam in longis morbis recte curandis vtilissimus tractatus erit, duabus rationibus, ad agrotum utilitatem, neque ad eos diligentissimē medendos, atque simul ad eos ab erroribus aliorum, non recte medentium erroribus, ac detrimentis tuendos: In chronicis namque, diuturnisque morbis plures medici super vocari solent: si aegri, seu agrotantes consanguinei, aut affines, vel amici non a causis, iam narratis morbi diuturnitatem procuere putantes: immo Medici (qui curationem suscepit) culpa: est rectissimē is Medicus etiam in ea curatione egregiē se gesseret, cum nobis praeceptum Hippocrates reliquerit, nunquam calamitosē afflictijs emungere, immo a morbo enalescentibus exprobare nos teneri. Quatuor enim Medicorum differentias Hippocrates constituisse iunio, qui dum supra Medicum problem, fidum, & inculpabilem recte

Cruditatis causa sunt causae quae morbi causae sunt.

Cruditates sunt causae morbi causae sunt.

Cruditates sunt causae morbi causae sunt.

Cruditates sunt causae morbi causae sunt.

Cruditates sunt causae morbi causae sunt.

Cruditates sunt causae morbi causae sunt.

Cruditates sunt causae morbi causae sunt.

Cruditates sunt causae morbi causae sunt.

Cruditates sunt causae morbi causae sunt.

Cruditates sunt causae morbi causae sunt.

Cruditates sunt causae morbi causae sunt.

Cruditates sunt causae morbi causae sunt.

Cruditates sunt causae morbi causae sunt.

Cruditates sunt causae morbi causae sunt.

Cruditates sunt causae morbi causae sunt.

A

B

Talis filio
nibus.
6. Fed. com. 3.
vnt. 37.

De pijs med.
P. 16. m. Fed.
C

Lib. de elegan-
tia 1. c. 1. c. 1. c. 1.
in Hecron. &
in Fed. 14.

Lib. precept. in
Hecron. 1. c. 1. c. 1.
in Fed. 14.

D
Fidem lib. in
Fed. 1. c. 1. c. 1.
in Hecron. 14.

1. 3. precept. in
Hecron. 1. c. 1. c. 1.
in Fed. 14.

A rectissime agerent vocari, & duci possunt: Vel enim Medicus peritus est, dogmaticus, non tamen fidus ad agendum tantum emolumentum incubens, immo ad gloriam suam invidia impulsus, & gartulus, cuius meminit diuinus senex, hoc modo. Fallax enim, & ad errorem proclius asservatio, quæ est cum garrulitate coniuncta, talis namque Medicus Artis deceptoris solum fludet gloriæ, & lucro, non autem agrogantium utilitati incumbit. De quibus etiam ait Hippocrates in Foef. Interp. pag. 40. Medicum ratione utentem, alterum inuidiosum nunquam calumniantur esse debet, atramentum illi inuidiosissimè se gerunt. Præterea vel Medicus rationalis se habet, non tamen omnino peritus, cum nodum experimentis Artis Medicæ peritissè iter decoratur. De quo ait Hippocrates. Quid enim mali contingat si mercedem auferant, qui Medica opera publicè malè exercent? At nunc ægrotes ipsi, cum sint extra culpam non facis esse vis morbi iusta est, nisi etiam de duci imperia accederet. Ac de his quidem hæc sibi dicta sunt, nisi quod nullum ex his, qui sola ratione concludunt fructum percipere licet, verum ex his, qui operis demonstrationem habent. Tertio verò differentia Medici improbi utique eorum medicantium est, qui empirici dicuntur, cum solo experimento utantur, de quibus mentionem fecit Hipp. Trahitur autem in omniagem calumniam, seu in omne genus infortunii cum vehementer peritice cum medicis, qui morbo gravi præsentia iuueni-

Vel enim Medi-
cus probus non
parum sciat, im-
mo videtur esse
parum innum-
beris An duc-
toribus incho-
ratis.

De qua re dicitur
lib. 7. circa 20.
m. de Medici
ne crudelitatem,
Vel impediatur
ratione humana
etiam.

Vel imperium
silo expugnā-
so progrediā-
de illis dantur
modis sic gerant
uocati.

Bendi ratione cum illis conflum ingerem, sed confiderem puerum, ut remedia sua proferrent: Inqui-
 sitionis enim elegantis scientia apud eos diſperſa reperitur. Et quoniam hi neceſſario in doctis ſuis, affirmo
 tamen & exercitationem bonum vtilem eſſe, poſtea quæ præceptorum multitudinem veritatē ſe verē in da-
 gere poſſe ſperet, citra & exercitationis conſtantiam? Quare hos non eo dicentibus quidem iſtis auſcultan-
 dum eſſe, ab operantibus reſpondendum eſſe. Verum alia differentia Empiricorum invenitur, quorum
 omnes quidem ad medellam accedunt morbum ſama celebræ captantes, carentes aliorum medicorū
 introductiōnem, celebrantes ſuam curationem &c. Sicuti enim primi medici ratione gloriæ & avari-
 tiæ artis medicæ finem fruſtrando noſtris ægris magnam inferre poſſunt iacturam, ita quidam,
 alia tres differentie Medicorum ſua imperitia errores committendo, noſtros intricare ægros
 queunt. Eamque ſanc ob cauſam, ſi circa hæc cruditates (in morbis diuturnis, in quibus ait Hippo-
 crates empirici admittendos eſſe, in gravior ægrotationum) reſtè curandos, omnes Hip. & Gal.
 autoritates, ſimulq; rationes, omniaq; tum ex perimentis vna, & exempla moriæ, ut etiam in
 alijs duobus operibus iam ſeri compilaverim, emoriarq; manducro, procul omni dubio, ne dū
 id, quod reſtiſſimum agendum fore, ſemper attingam: At verò etiam meos ægros à maiorib; me-
 dicorū vaſtitiæ, dolis, ac erroribus cuebtor. Tuncq; omnis Medicus hunc perlegens totum pote-
 rit eorum Medicorum eſſe, qui probi, ſidi, inculpabiles, artiſq; collegæ, ac ſocij ſunt, quibus etiā
 hæc conditiones Hip. conſignatæ, hoc modo. Ad ſuſtentandam occaſionem tolerantiæ, oratione ægro-
 tantes, qui quicquid doctriſe acciperint in medium proferant, ac pro gloria, quæ inde ab utilitate ægro-
 tantium provenit decertare parati doctriſinam ſuam ad veritatis lucem repurgantes &c. Si quis igitur
 eorum aliquid, quæ ratione proponuntur, ad veritatē non expendit, ne quænam ab alijs Medicis inſidiis,
 & earrum labibus n; ſidis Medicis ſuſpecta videri fallaci doctrina, ab inſidijs ſubmiſſa ſit.

Empirical relations
assessing...

Vel Medicus
primus, & tri-
viti - & insup-
pabilis Aspis cal-
ga solam fana-
tem, & veritatem
habere non au-
tem ioculi, nec
gloriam.

C A P V T I L.

**Cruditatis nomen, & essentia generica, simulque vis definitione
explanatur.**

Cum Hippocrates monumentis medicinalibus consignarit nomina nanque lege
quidam rerum naturae sunt sancta. Proinde vna cum nomine, etiam cruditas
quiddam genericum eodem tempore diluam. Quare cruditas nomen ne
dum, ac verò essentia, & vis concoctionis quidem nominis, essentia, & facultas
opponitur: Vnde cruditas succi, in concoctione etiam, & prauitas succi appellatur.
Quo circa si cuti succi prauitas in concoctionis, seu cruditatis nomen, non nisi
quatenus concoctio mala, defecta, praua, ac vitiosa denominatur; & prout cruditas ipsa concoctio
contrariè opponitur: sic etiam cruditatis pariter, seu incoctionis essentia, non nisi succi mala,
seu praua, aut vitiosa, vel defecta concoctio significatur, cum vitium concoctionis facultatis
coctricis partis quocunque ob intempericm, aut lesionem instrumentalem, aut externum errorem
obortum Galeni sententia: Namque sanè ob causam crudum est, quod à particula, & à coctrice fa-
cultate alterationem iuxta naturam non assumit, vt id. m. Gal. asseruerat. Pro quorum diuici-
tatione perpende cruditatem quidem palam esse frustrationem in alteratione concoctionis symptoma:
cum vitium frustrat coctionem in alteratione erant, cum autem cruditas vel omnino nulla alteratio
sit, symptoma id vtique aepsia sine cruditate omnimoda nominatur. Aut alteratur, non tamen sicuti
oportet: cruditas quidem sine aepsia id quoque appellatur: significatur tamen non vtique sicuti prius
priuatio, sed deprauiatio. Cum autem fit deprauiatio concoctionis cruditas hæc duplex, vel quod talem
& nondum conuenientem mutationem in eibus suscipiat. Per quod corruptior omnino iam, vel naturæ gra-

Nemen erudira
sic-cit effiant
declaras.
Nomen-citira
tra-ff notum co
dione oppo
nuntia.

Vide de crudi-
tate pulcherrima
Gal. 3 de
femp. col. c. 3.
Cruditatis so-
lutione.

Creditus forma,
Creditus figuratio, & virtus
obediens est.

El primer género
Cradicea tiene
una pueraria co-
nformada, ve-
getativa co-
nforme a que
hace agua.
Depositar en
materia y el
modo crudi-
ta-fre adhibe-
re a un per-
dido corrup-
ción.

A

CAPVT III.

Tria cruditatum genera esse; vel enim vitium coctionis deprauata per corruptionis modum, aut coctionis defectu per cruditatis modum, seu coctionis excedentis, per adulationis modum gentium est: Duoque tantum posteriora genera curanda a Galeno proponuntur in lib. de tuend. sanitate ostenditur.



Ceterum clarioris doctrinae gratia, hic genus cruditatum, quod Galenus in lib. de tuend. san. diluere dare non intelligit, ab alijs duobus generibus, quae sibi ipsi in lassitudines carandas, tollenda proponit, distinguere cogit: Cum in hoc toto opere de fatigandum esse polliceat, iuxta Galeni doctrinam crudelissimam, ijs in libris statutam; Supposito enim, ut inter cruditates definitiois allatae ostendi datur ea eruditae, quae ab assumpto cibo, & potu, quae a sepefit vocatur, & quae nulla omnino ciborum alteratio est 3. de symp. ca. 1. & Gal. & Hipp. ait, quod ea cruditas venae sectionem retardat, quosque chylus probe coquatur, quia nec alia sepefit iter coraria eruditae in intestinis existens comprehenditur, quae similiter venae sectionem defert, donec excrementa stercoraria per aluum descenderint, ut iidem auctores statuunt, ait enim Hipp. si febris correperit veteri stercore non subeunte, vel recenti cibo accipio, siue enim lateris dolore, siue non is quieti permittendus, dum primam ad inferiorem aluum erit receptum descendit, et si Cellus dixerit. Ergo si ex superiori parte aliquis decidit, si contusus est, si ex aliquo subito casu sanguinem vomit, quauis paulo ante sumpsit cibum, tamen protinus ei venae sectione demenda materia est ne si subsederit, corpus affligat. Vnde primo aduerte, has stercorarias non comprehendit cruditates, io hac humani corporis succorum crudorum constituta definitione. Praeterea perpende humorum cruditatem, seu vitium concoctionis facultatis coctricis imbecillius partis coquentis genere triplex esse. Nam alijs vitium est chylicationis facultatis chylicae debilis ventriculi per corruptionis modum proditum: ac tunc bilis poeacea, quae etiam bilis, & cholera praestina appellatur, ex qua deinde per adulationis modum alia bilis argutina oboritur, quae Zinaria choletia vocatur. Quocirca argutina cineri assimilatur, sicuti poeacea carbonibus asini. Nilque, quarum meminit Hipp. & ait. At quando ista subtila, incolla, & minimè contemperata fuerint, nulla arte neque dolores, neque febres finientur: Et quibus quidem acuti, acres, & eruginosi humores insistant, quoniam furores, & pueram, & thoracis lancinationes, animique abiectione inueniuntur. De ijs etiam vide Galenum. Quibus vitique duabus bilibus, aut vna harum in ventriculo resedente, si venae eandem sectio fieret, aut cucurbitae tum fieret, tum scarificatae cuti indigerentur, vel frictions attraherentur admixtila: teorur, tunc sanè haec cruditates venas, ac totum corpus attraherent, hinc etiam ager interficeretur: cum Aueroes, & Conciliator, & Auicenas, ut etiam Sauonarola adnotauit, existimare bilem argutineam adeo prauam esse, ut veneni naturam ipsa cooteneat: Vnde eam si breuem gignere non possit, quia priusquam putresceret, hominem potius interficeret. Ex quo Sauonarola cholerae Zinariae medicamenta digestio non possit: cholerae vero praeseque digestiua proponit, & si ipsa quoque veneni princeps sit. Quocirca raro febri conuolare valet, ut coarior ait: Ideo toto eius vite periodo semel tantum se vnam vidisse febrem à tali bile obortam, referre: simulque statuit hanc poeaceam in septimo die hominem egrotantem interficere, si vera praestioa fuerit, quae sua natura crassa est: Nam interdu bilis colore poeaceo viridi tincta, liquida, & fluxilis in vomitionibus à nobis conspicietur, ac tenuis, quae haudquaquam vera praestioa est: immo tunc adest coactio humoris nigri, mela neholiae, & biliosi flani, ex quibus ea viridis bilis emerge: Proinde Sauonarola istius bilis preparatiua posuit. Cum aciem harum bilium subtilatio vomitionibus tantum vera executioni mandanda sit: De ipsius euratione nihil dicam, cum ipsius cruditatis generis Galenus nihil meminerit: Ratio autem est, quoniam Galenus ibi cruditatem genericam assuinit, quatenus cruditas, ac deprauatio à perfecta sanguinis coctione, vel secundum defectum ante sanguinis generationem per cruditatis modum prodica, secundum autem excessum post sanguinis generationem per coctionis modum. Nou autem iuxta succi corruptionem, ubi cruditas per modum corruptionis profuit, com de his dixerit si verbis. Quippe corruptionis cibum tres prima generalissima sunt differentia, vna quidem sit propter ventriculi morbos, altera à varijs humoribus in ipso accumulata. Tertia ab alimentorum qualitate. Idem ferè 6. cap. commento quarto cont. 25. & Auicenn. Illa vero duo cruditatum genera enoteanda Galeno sibi ipsi, his verbis, proposuit inq. Generaliter igitur eiusmodi succiones albi, eruditae sunt; nomenclaturam vero alius aliam sortitur. Nec attinet ad praesentem dispositionem ea.

Cruditas vel per modum corruptionis sit, de eius coactione, à hoc opere ubi agitur cum eius curatio fructus sit per ventrem, & de qua à singularibus auctores nimis distat bilis Zinariae seu argutinae venenosa est. Bilia vero praestioa minus venenosa est, quae potius est. Bilia per modum colore quae non est praestioa nec natura poeacea

In ea definitio-
ne cruditas a-
ppellatur ad istam
dicitur
Necque sicuti
est coctioa nec
coctioa.

Cruditas vel per
modum corrup-
tionis sit, de eius
coactione, à hoc
opere ubi agitur
cum eius curatio
fructus sit per
ventrem, & de
qua à singulari-
bus auctores nimis
distat bilis
Zinariae seu argu-
tinae venenosa
est.

Bilia vero praestioa
minus venenosa
est, quae potius
est. Bilia per
modum colore
quae non est
praestioa nec
natura poeacea

Vel per modum
cruditatis sit
de defectum.
Vel per modum
ad istam dicitur
cum coctione
genit de, quoniam
curatio, &
coactione
vera sit.

D De ista bilis colore poeaceo viridi tincta, liquida, & fluxilis in vomitionibus à nobis conspicietur, ac tenuis, quae haudquaquam vera praestioa est: immo tunc adest coactio humoris nigri, mela neholiae, & biliosi flani, ex quibus ea viridis bilis emerge: Proinde Sauonarola istius bilis preparatiua posuit. Cum aciem harum bilium subtilatio vomitionibus tantum vera executioni mandanda sit: De ipsius euratione nihil dicam, cum ipsius cruditatis generis Galenus nihil meminerit: Ratio autem est, quoniam Galenus ibi cruditatem genericam assuinit, quatenus cruditas, ac deprauatio à perfecta sanguinis coctione, vel secundum defectum ante sanguinis generationem per cruditatis modum prodica, secundum autem excessum post sanguinis generationem per coctionis modum. Nou autem iuxta succi corruptionem, ubi cruditas per modum corruptionis profuit, com de his dixerit si verbis. Quippe corruptionis cibum tres prima generalissima sunt differentia, vna quidem sit propter ventriculi morbos, altera à varijs humoribus in ipso accumulata. Tertia ab alimentorum qualitate. Idem ferè 6. cap. commento quarto cont. 25. & Auicenn. Illa vero duo cruditatum genera enoteanda Galeno sibi ipsi, his verbis, proposuit inq. Generaliter igitur eiusmodi succiones albi, eruditae sunt; nomenclaturam vero alius aliam sortitur. Nec attinet ad praesentem dispositionem ea.

Tomus Tertius.

A 3

omnia distinguere eo, quia tantum hæc duo genera communiter cruditatum assumit nempe succorum pituitosorum, & mordacium. Ideo pergendo ait, quippe ad quam illud tantum innumerus omnium accedens pertinet, quod his succi percossi à natura non sunt, sed crudi adhuc manent: si quidem sanguis in medio est biliosorum, atque horum, quorum utriusque genus una vocabula appellari licet, vel crudum succum, vel pituitum. Illi namque ex sanguine sunt, ubi supra dictum modum est percossi, hi vero ex eo nondum perfecto, & postea exat ac erulorant, siue etiam semicollorum, qui ante sanguinis perfectionem fuerant pituitosorum, & acrim, ac mordacium, qui secundum sunt crudi, & sanguine posteriores. Hæc itaque duo genera cruditatum, simulq; horum species discipulare polliceor.

CAPVTV.

Duo isthæc genera allata cruditatum, nempe pituitosorum ante sanguinis generationem per cruditatis modum, & acrim, seu mordacium post sanguinis generationem per aduisionis modum obortarum, hic penitus elucescunt.

Hæc duo genera cruditatum contraria sunt esse. Definitio cruditis generis talis forma humana sunt pituitosorum, cum acris sit, et acris. Definitio generis acris cruditatis pituitosorum.

Definitio generis cruditatis mordacium sunt acris.

Obiecta.

Inditio. Pituita acris quomodo à vitio, et quomodo ab hepate gignatur.

Ventriculi fundum causam esse generationis cruditatis pituitæ.



Xij autem huc vsque iactis colligas, ea duo cruditatum genera vicissim contraria esse eoquod genere conueniunt, specie vero differunt, & sunt contraria, longinquæ, ac extremæ, quæ conditiones contrariorum inueniuntur ab Aristotele constitutæ. Quandoquidem ambo vitia sunt conditionis facultatis coctionis frustratæ, partem coquentis laxæ, vel intemperamento, aut vt partis organicæ, aut erroris externo, vel utroque modo affectæ, quæ definitio cruditatis succi generalissima, introspicitur à Galeno posita, vt c. 1. etiam iam dixi. Pituita vero non naturalis cruda, & praua vitium quidem est. Chylificationis frustratæ facultatis chylificationis sæpe imbecillis, vt de defectibus in calore ventriculi coquentis, vel intemperie, seu instrumentaliter, siue utroque modo offensa, aut ob errorem externum, per cruditatis modum, & ante sanguinis generationem ortum. Aliud vero cruditatis acrim, & mordacium utique vitium significatiue frustratæ est facultatis sanguificationis excedens in calore hepatis coquentis, aut intemperie, vt organicæ obnoxii, per aduisionis modum, & post sanguinis generationem genitum. Vltra quod etiam vi temperamento, simulque consuetudine contraria sunt. Neque obijcere poteris asserens, omnes humores tum naturales, tum præter naturales, qui prauis, & crudi omnes existimantur in hepate celebrari, ergo pituita cruda, & praua ventriculi sanè vitium nequaquam reperitur, neque chylificationis facultatis chylificationis, quippe duntaxat vitium est hepatis, ac sanguificationis facultatis sanguificationis. Nam pituita, vt Galenus statuit ante sanguinis generationem, ac per cruditatis modum cruda gignitur, pituita vero naturalis, & cocta in ea sanguinis generatione procreatur. Vnde ad Galeni auctoritates concedo de pituita naturali, & perfecte cocta ab hepate genita: vt vero præter naturalis, & cruda ante sanguinis generationem oborta à ventriculo pendet. Vnde nego eam crudam pituitam, vt crudam à seciore proficisci. Quandoquidem cruditatis pituitæ causam immediatam, quæ vt ait Aristoteles, prima est, vt syllogisticam Galenus assignare tenebatur: quæ vtique ablata necessario quoque cruda pituitæ generatio tollatur: dum posteritati prodidit, his verbis. Porro à nobis demonstratum est pituitosum humorem, ex pituitosis cibis in prima hoc est ventriculi concoctione fieri, vt biliosum, & melancholicum in seciore. Adnotatur & in concoctione, quam obit in ipso pituitosus in sanguinem: proinde nullum ei peculiare datum instrumentum est ad sanguinis purgationem, cum à ventriculo emanet, hinc pituita cruda in venis diu morando, in probum transmutatur sanguinem à natura concocta, corpusque optimè alere potest. Acris vero humoribus, nempe bili, melancholice, fetosique excremento instrumenta Deus, & Natura assignare voluerunt, ad sanguinis depurationem, cum hi humores in hepate fiant, vt Galenus asseruerat, qui humores vt combusti, non amplius in sanguinis naturam transmutari valent, eum id, quod aptum est in sanguinem conuerti, in his non adit. Quæritur de cruditate proprie loquendo, quæ per cruditatis modum emigrit, ac pituita cruda appellatur, eius causam in membro assignando, statuit ventriculi fundum læsum cruditatis causam esse: sicuti naturaliter se bene habens probè chylificationem concoquit, dum Galenus ait: idcirco dicitur ea, quæ in parte ventriculi inferiore conueniunt, proinde ac si omnino non fierent, & despicere, & contemnere solent. At quia coctionis opus in partibus ab ore inferioribus fieri nemo negat, necessesse est hanc ipsam partem, quæ malè disposita fuerit, cruditatum esse causam: quæ videlicet vel ob inordinatam alimentorum ingestionem, aut multitudinem, aut qualitatem. Hinc nedum Gal. statuit ventriculi coctionis instrumentum esse, verum etiam 5. de vfu part. c. 4. & 17. de vfu part. c. 2. ait ventriculi propriam actionem coctionem esse. Eamque sicut & ob causam pituitæ cruda causa duplex est, vel enim prima, ac immediata, aut secunda. Prima enim conuertibilis est, cum ipsius cruditatis generatione; secunda vero minime ree probabilis est, cum itaque quoties ventriculi

Lih. post. pardi cam. de appositione.

De sympt. diff. c. 1. de sympt. c. 1. de vfu part. c. 1. de vfu part. c. 1. de vfu part. c. 1.

C. 1. de vfu part. c. 1. de vfu part. c. 1. de vfu part. c. 1. de vfu part. c. 1.

2. Post. cap.

De vfu part. c. 1. de vfu part. c. 1. de vfu part. c. 1. de vfu part. c. 1.

D. 1. de vfu part. c. 1. de vfu part. c. 1. de vfu part. c. 1. de vfu part. c. 1.

5. De loca. p. c. 1.

2. De vfu part. c. 1. de vfu part. c. 1. de vfu part. c. 1.

Atriculari fundi, vel intemperie, seu instrumentaliter læsi facultas chylicatrix calido innato de-
fectiva languide chylum coquens fuerit, ibi necessàrio pituita cruda tanquam cruditas à Gal-
dy/pepsia appellata, semper quoque genita erit, ut nedum vitium actionis coarctis, seu malis
concoctio, verum etiam ventriculi fundi: Et è contra vbi pituita propriè dicta genita fuerit, ibi
etiam necesse est vt ventriculi fundi lici coctrix defectiva sit, tamen supposita recta victus ratio-
ne, à qua pituita non gignitur, cum ibi cibi, & potus non sine pituitoso ergo sequitur assump-
tumque ventriculi fundi lici, adeit cruditas ipsa, & existente pituita cruda vicissim etiam
ventriculi fundus læsus est: Secunda verò causa hepar quidem est, nam et si sanguine pituito-
so tamen etiam hepatis sanguificatio defectiva sit, prout hepar à ventriculo imbecillatur;
non tamen sequitur, quod per propriam actionem, gignat pituitam: Ideò, læso hepate, non
semper gignitur pituita: Nam iecur pituitam crudam procreat, prout à ventriculo chylus vt
sanguificationis, seu sanguinis gignendi materia proxima malè elaborata, ac malè disposita ad
probum sanguinem procreandum: Vnde non nisi pituitosus sanguis oboritur valet. Ideoque ipsi
insultu obijcere non poteris, si dixeris hepar, cum quatuor succorum massæ sanguineæ per-
fectissimum sit, cum longè maior coctio sit illa, quæ in iecinore celebratur, quàm ea, quæ in ventricu-
lo fit: ideo non dicas hepar pituita crudæ perfectissimum principium esse; ergo cruda pituita ad
hepate gignitur, non à ventriculo: Quia nego, hepar crudæ pituitæ perfectissimum principium
esse, immo pituita crudæ coctissimum, principium habere: succorum autem quatuor natura-
lium, ac probe coctorum massæ sanguineæ tantum perfectissimum conspiciuntur. Cum facultas hep-
atis sanguificatrix, semper optimum sanguinem quatuor succorum generare nitatur: hinc etià
chylum malè à ventriculo elaboratum corrigere, ac emendare perpetuò conatur, et si in totum
nequeat, immo solum in aliqua parte malitiam eam crudæ pituitæ, à ventriculo genitæ denique
possit. Ceterum pro integrâ notitiâ istius primi generis crudatrum pituitosorum primò con-
templat interdum pituitam gigni ventriculi fundi chylicatrice non lici, per accidens; quan-
do chylus non probe à ventriculo celebratur, non defectu ventriculi, sed eo, quia in ventriculo
chylus alterandus debito tempore morari nequit, quoque à ventriculo probe coquatur: &
eo, quia chylus, qui primam sanguificationis faciendo alterationem, seu præparationem in ve-
nis meseraicis, vt ait Galenus inibi non sumatur debito tempore. Quod vtrique quatuor de
causis contingere potest, vel enim quando bilis in ventriculi fundum confluxit, quæ sua mor-
datitate, ac moris commotio, prohibetque alimentum, morari in intestinis ad eundem modum etiam
ventriculum sensu, quàm intestinum intellinum exaltiori pradium egeret alimentum prius propelle-
re deorsum quàm plane concoctum esset, & si quidem morus vehementer crudos cibos cogit ex-
cernere; eoque tempore natura minime ociosa, ad hepar eos crudos trahit cibos, pro partium
nutrimento: cum factus sit male nutriri, quam nihil nutriri; hinc cruda emergit pituita: Aut
dum ventriculi retentrice labefacta, chylus debito tempore minime retinetur, vt in clytiaca pas-
sione vlt venis; Vcl vbi chylus in ventriculo, & venis in mesenterio non dum coctus fuerit, ad he-
pate calidiori attractus, aut ob nimiam copiam cibi, & potus assumptam necesse sit prius di-
stribui, quàm coctio facta sit, cum Galenus de promptis. Demonstratur præterea est; vbi pro-
prio, & commode nutrimento destituuntur, urgeri, vel eius, quod non commodum est, aliquod rapere,
talc potest esse, quod nondum in ventriculo, venisque concoctum est. Ergo necesse est, cum homo largius
se cibis per hoc tempus impleverit, eo & asuendi succi plurimum in corpus animalis rapi, idque multis
de causis, & quod deterius in ventre, venisque concoquatur, quod copiosius est: & quod multum in corpo-
re modum ideo subit, aliqui verò codices habent attrahitur, quia multum superest, & quod citius etià,
quàm par est, propterea quid venter venis, vena reliquis omnibus animalis partibus rapi, quod nondum
concoctum est, permittit. Secundo autem speculat pituitam duncaxat à ventriculo, non autem
à cerebro promanare, vt alijs dicam. Insuper pendendo cruditatem propriè tantummodo pi-
tuitam quidem esse, per cruditatis modum genitam, vt rationibus allatis patenter notum est.
Crudum enim est, quod à particula alterationem non assumit iuxta naturam. Nam naturalis pi-
tuita mihi dulcis, cum vitis sit, penitusque coctæ, et si quantitate nimia fuerit, tunc solum copia
peccabit, non autem cruditate, vt malitia, vt Galenus expresse dixit, vbi crudam dilucidando
pituitam ait, eam crassiores, ac viscosiores ex qua in articulari rophi, & calli, qui appellantur, ho-
rum generatio est. Est ibi vnd cum pituita cruda, etiam sanguis, & bilis commixta adesse pos-
sint, & carat. Aliquando quidem igitur rursus immor sanguinem est, vt plurimum vero pituitosus,
aut ex pituitoso, & bilioso mixtus, aut etià sanguine, cum ipsi permixto. Proprie vero humor crudus
in febribus pituita crassa vocatur à Galeno putrescens huiusmodi modis, vt est ibi videtur: Ex diluci-
datione verò generis pituitosi, & ex definitione posita alterius generis cruditatis acrimia, &
modicam, genus id iam manifestè patet. Vnde hac alia longum demonstratione opus non ha-
bet. Verum tantum dicam genus id vique propriè cruditatis non esse eo, quod non per modum
cruditatis immo per adusionis modum genitum cruda à iecinore, magis multo feruidiore. Præterea
pendende, non dum loco allato, Galenum pituitam crudam à biliosis humoribus contradi-
ctum vltum loco, vt infra videbimus; sed etiam alibi; vbi ait cruda, quæ in primis erant venis de-
ijciebantur à biliosis iuxta tantibus humoribus, qui in tota corporis mole residebant, & qui febri-

Obiectum

Solutio.

Iecur pituita
cruda concoctis-
simum seu emen-
dissimum princi-
piū est, non tu-
tem perfectissimū.

Pituitum conco-
ctissimum dignū.

Quoniam ratio-
nem, chylus ma-
lè laborans ad
hepar trahit, &
debito tempore
in ventriculo ad
motum sit.

Secundum specu-
lationem dignum
est, immo.

Vbi, etiam tunc
non prius in pri-
mo prout reser-
uata, à bile con-
cui huiusmodi per
exponit etiam
se edocet ita.

Lib. de symp.
difficil.

De loc. affli.
6.7.

De pite. 6.10.
11. de pite. 6.10.
11. de pite. 6.10.
11. de pite. 6.10.
11. de pite. 6.10.
11. de pite. 6.10.
11. de pite. 6.10.
11. de pite. 6.10.

De nat. fac.
6.7.

De nat. fac.
6.7. de nat. fac.
6.7. de nat. fac.
6.7. de nat. fac.
6.7. de nat. fac.
6.7. de nat. fac.
6.7. de nat. fac.
6.7. de nat. fac.

De vlt. part.
6.1.

De vlt. part.
6.1.

De function.
6.1.
In decem.

De nat. fac.
6.10.

De pite. 6.10.
11. de pite. 6.10.

De pite. 6.10.
11. de pite. 6.10.
11. de pite. 6.10.
11. de pite. 6.10.
11. de pite. 6.10.
11. de pite. 6.10.
11. de pite. 6.10.
11. de pite. 6.10.

De vlt. part.
6.1.

De pite. 6.10.
11. de pite. 6.10.

Quorum pos-
sibile.

ardentem excitabant: Viterius aduerte Galenum vocasse plethoram, seu plethoricam disposi-
tionem ex recentibus cruditatibus mordacibus exortam, hoc enim improprie plethoram pro
cacochymia defumendo, dicentem. Si quis febricitaret, & adfit plethorica dispositio, verum ex re-
centibus cruditatibus sit, ac morsum sentiat, afflictiūq; os ventriculi. Sicuti etiam cruditatum pleni-
tudinem pro copia improprie appellauit: Proprie enim plenitudo tantum sanguinis efficit enim
Galenus. At ubi crudi succi exuperant, antequam morbus inuaserit, tunc vacuabitis sed ubi iam feb-
bris corripuerit, ut ante monui, nequaquam habebis verborum crudorum succorum exuperantiū
inditium tum colorem veluti plumbeum melancholici excrementi, aut ex pallido album, omniaque
potius quam rubrum, &c. si verò etiam admodum creuerit talis plenitudo, tum & corporis illius grani-
tas inest, atque ad motus pigritia, tum mentis tarditas, & sensus bebetudo,

A

De cruditatibus
sanguinis.

CAP V T V.

Verumque cruditatum genus allatum, in tres differentias à Galeno scindi-
tur: prout hæ differentiæ ad sanguinis naturam, seu ad caco-
chymia essentiam referantur; ac ad sanguinis missio-
nem spectantes, seu non spectantes sint.

B



S hæc autem duo cruditatum pituitosarum, & mordacium genera, in tres
vtrique secantur differentias, quatenus vtrunque cruditatum tam pituito-
rum, quam acrium, seu mordacium genus æque, vel ad totam ferè pletho-
ram, aut ad totam penè cacochymiam, seu ad mediam naturam inter ple-
thoram, & cacochymiam relatiui est: nec non prout ubi plethora est, auda-
citer sanguis etiam educendus est: in eo verò, vt cacochymia est, nulla san-
guinis missio euacuatio ad ministranda quoque est: et si ibi sanguis mis-
sio vel refrigeratio, aut depuratio, seu reuulsio à morbi magnitudine sanguinea, vel presente,
vel incipiente, aut imminente, causatiua, seu impura, sine fluente indicata interdum agenda sit,
quoad autem mediam naturam inter plethoram, & cacochymiam, consideratis sanguinis de-
tractio vacuatio molienda est, licet audacter tunc sanguiniseductio refrigeratio à morbi ma-
gnitudine sanguinea causatiua indicata, seu depuratio à magnitudine sanguinea morbi impu-
ra indicata, vel reuulsio, sine deriuatio à magnitudine morbi sanguinea fluente sine fluxu in-
dicata, quandoque executioni mandanda sit, vt vbertimè loco proprio demonstratum est. Quan-
doquidem cruditatum pituitosarum genus, in humores paululum crudos, paulò à sanguinis for-
ma distans, ac in semicrudos, simulque semicrudos mediam habentes naturam communem, seu
neutram æquè de plethora, ac de cacochymia participent: Galenus diuidit, nam media natura
habetur per eorum participationem, neutram verò per negationem, cum nec plethura, nec caco-
chymia reperiatur, sed medium quoddam est inter vtrunque: Atque in penitus crudos omnino
cacochymos diuidit succos penitus à sanguinis specie alienos. Actium pariter, & mordacium
adulscorum genus isdem rationibus, in humores parùm affatos, pauloque à sanguinis forma,
desidentes, sanguinisque formæ paululum excedentes distinguit. Insuper, & in alios succos, se-
micrudos vad, & semiuiscos. Tandem, & in alios humores vndique perassatos, acres, & morda-
ces fecat. Tenemus autem perpendere numquid vnaqueque harum differentiarum crudita-
tum, vel in toto vniuerso corpore, aut in vna, vel pluribus, non autem in omnibus cruditatum
regionibus sit; aut in aliqua particula, ac etiam si tertia omnino cruditatum tum pituitosarum,
tum mordacium sit, vel secunda, aut prima differentia, & an sanguis cruditati commissus probus
plurimus, aut exiguus, aut mediocriter se habuerit: Nam quo ad sanguinis euacuationem detrac-
tionemque si sanguis optimus fuerit plurimus, andacissimè sanguis rationabiliter mittendus venit;
Sic exiguus nihil sanguinis educendum, si verò mediocri quantitate sanguis fuerit, religiose qui-
dem premeditatione iam facta, postea rectè agendum est. Sex autem hæ cruditatum differentie
principales in plures, ac innumeras alias differentias scindi possent. Verum cum nunc hanc rem
agendi locus non sit, immo, ubi humorum specierum declarationem ingrediar, videbo. Isthæc
autem omnia narrata ex his Galeni verbis colligas, ita exarantis Sunt autem vtriusque generis in-
numera particulares differentie: Ceterum quæ ab his, qui in talibus sunt periti innumeras species iam
descriptæ: quarum tamen ipsarum ad hoc omnium meminisse necesse non est, vt etiam satis sit eas ad
vnam caput redigere, quod tibi veluti scopum agendorum proponas. Nam quoniam alij priusquam ad
exactum sanguinem nutrimentum peruenit, veluti semicrudi sunt. Alij profus incocti, erediq; sunt. Alij
paulò absunt à sanguinis forma. Rursus alij sanguinis faciendi, sive vt ita dicam sanguificationis vebu-
ti vltima pars, qui vtrique excessu caloris, proueniunt Quorum alij paululum, alij plus, alij plurimum à
sanguine recesserunt. Vbi paululum, vel circa sanguinem relictum, vel ultra processum est, audacter
mittendus est sanguis. Vbi plus consideratiui agendum, vbi plurimum in his nullus omnino mittendus
est;

Si in vniuerso cor-
pore crudita-
tum genus tra-
hatur differentia.

Mordacium hu-
morum crudita-
tum genus tres
generatim diffé-
rentias.

In pluribus lo-
cis rectè pos-
sibile hæ crudita-
tes, & vbi sunt
dispositæ sunt
differe.

C

Lib. 2. de magni-
tudine morbi,
cacochymia.

D

Com. 2. Aph. 24.

4. De cruditatibus.

67.

Dignoscendis recteque curandis. LIB. I.

A est: Inspicere vero, & quantitatem conueniet, ut verbi gratia, si bonus sanguis & xigius sit, reliquum vero succus plerumque, utique in his abstinentiam & detractionem sanguinis est: Sin his quidem exiguis, sanguis vero copiosus, & aliter inuadenda vena est. Nam quarta, seu septima differentia humorum, quae sunt inter istius duo generis cruditatum media conspiciatur, quae utique non nisi sanguis exacte perfectus, & exquisitus coctus, habetur, cuius quantitas semper intellectui promerenda venit, in sanguinis educatione. Atque ad cuiuslibet harum sex differentiarum, succorum crudorum copiam comparata.

perfectus enim
est sanguis
inter has sex
differentias
seorsim reponitur.

CAPVT VI.

Quot nam pituitosi cruditatum generis species sint, exploratur. Ac de pituita dulci, acida, & vitrea agitur.



Ceterum, ut omnino primis cruditatis genus in suas species diuisum elucescat, perpende pituitam albam, tamenque etiam crudum succum esse statuerit Galenus: Nihilominus pituitam a succo crudo quidem differre Galenus fassus est, dum pituitam naturalem, & coctam a pituita praeternaturali, seu succo crudo fecit, ac ubi pituitam crudam primae regionis in cruda pituita, omnimodaque cruditate secundae regionis distinxit. Quod igitur in venis pituita fertur, eum sit animalibus ex se nulla variatione eget. Aduerte sane hoc loco, ac scire oportet, tanquam ex his generibus aliud vitale, naturaleque in animalibus est, aliud inuile, ac praeter naturam: Sic pituita quod dulce est, id salutare esse animanti, & naturale. Quod vero acidum, salsumque est, acidum quidem omnino crudum esse, salsum computruisse. Porro omnimoda cruditas pituita intelligenda est, quae in ea conuersione incidit, quae in venis agitur, non autem in ea, quae prima est, quaeque in ventriculo perficitur. Eam vero omnimodam cruditatem, quae hydrops appellatur, leucophlematiam Graeci auctores nuncuparunt. Praeterea omnia, quae frigida, ac humida potestatis sunt, immo omnium, quae in corpore nostro, sunt frigidissima, ac humidissima sub cruditatis pituitosorum genere reponuntur. Nam salina, quae neque fluida admodum, neque aquosa sub pituitae genere inuenitur. Omne pariter frigidum, ac humidum, siue valde crassum fuerit, cum omnium aliorum succorum tenacissima pituita cruda sit, siue fuerit aqua, ut in alcite contingit. Pituita namque aquae naturae respondet. Sane licet pituita secum ichorem sic se habet. Nihilominus tamen minus quidem quatuor tantum pituitae principales species praefectum; tres enim primis species constituit saporum ratione, ut antea vidimus. Dulcem nempe, acidam, & saldam, cum pituita solummodo aut dulcis, aut acidula, seu salta conspiciatur, dulcis vero duntaxat, quae insipida apparet, veluti aqua insipida, a sapore conspiciatur, salutaris quidem habetur, ut iam antea dictum est, ex Galeni verbis. Cum frigida exacte non sit, & cum naturae accommodatissima ob eius dulcedinem sit, ut lib. I. de Medicis iam Hippocrates sententia dictum est. Vnde proprio receptaculo caret, hinc sicuti in sanguine dulci, ita etiam in pituita dulci spiritus aereus, seu caloris naturalis substantia introcluditur, ut proprio loco iam ostensum est. Proinde pituita in venis tederens temporis processu, salina praeternaturalis, praua, ac vitiosa, seu male conspiciuntur quatenus maxime cessat, & penitus crudae existunt. Aliam vero pituitae speciem addidit nimirum vitream, eum scripserit. Est & tertia alia pituitae species, quae expentibus videtur acida, est autem minus frigida quam vitrea magis vero quam dulcis, sicuti & alia species est salta. Ex quibus patet Galenum quatuor pituitae species constituisse, vnam coctam, tres autem crudas, ac prauas. Praeterea clarius inquit. At vero his huius humoris plures esse differemias. Nam vna quidem species eius admodum frigida, ita ut maximos dolores afferat, quum in locum et alidum impacta est. Et saepe namque multos dolores eorum, qui colici dicuntur, est acri clysmate tali humore emacuat statim sedatos interiri licet. Hic videtur pituita similis affectui nitro siso. Altera vero species pituita est, quam excreantes saepe expunt quidem sensibilem obtinentes dulcedinem. Tertia praeterea species alia pituita est, quae expentibus acida sentitur, & quae modum alia salta habetur. Scias vero Acidam, ac vitream ita crudas, si frigidas, ac humidas esse, ut veluti in andragoga, & hyoficiam succum in nostro corpore se habere, nihil a calore naturali regulatum adeo, ut in cetera pituitosorum cruditatis differentia capite praecedenti declarata respondent a sit, tamen vitrea magis pemitiora, quam acida habetur, cum frigidior sit. Quatuor aut Gal. Acida autem, ac vitrea si moueatur per corpora sententia permeans infert rigorem sine febre: Quod si qua putredo moderata illis aduerit epulam committit febrem: Dulcis autem exacte frigida, & humida non habetur: hinc veluti ex dimidio coctum nutrimentum est, ait Galenus: Ideoque ipsam si in secunda specie cruditatis pituitosorum posueris recte facies. Verum consideratione dignum est, licet quod sicuti vitrea pituita crassior, frigidiorque acida conspiciatur, ita in vitrea generatione ventriculus imbecillior, seu frigidior, habetur, seu cibi, ex quibus vitrea emanat, magis pituitosi existunt.

De naturalibus
De animalibus

De animalibus
De animalibus

De animalibus
De animalibus

De animalibus
De animalibus

De animalibus
De animalibus

De animalibus
De animalibus

De animalibus
De animalibus

De animalibus
De animalibus

De animalibus
De animalibus

De animalibus
De animalibus

De animalibus
De animalibus

De animalibus
De animalibus

De animalibus
De animalibus

De animalibus
De animalibus

De animalibus
De animalibus

De animalibus
De animalibus

De animalibus
De animalibus

De animalibus
De animalibus

De animalibus
De animalibus

De animalibus
De animalibus

De animalibus
De animalibus

De animalibus
De animalibus

De animalibus
De animalibus

De animalibus
De animalibus

De animalibus
De animalibus

De animalibus
De animalibus

De animalibus
De animalibus

De animalibus
De animalibus

De animalibus
De animalibus

De animalibus
De animalibus

De animalibus
De animalibus

De animalibus
De animalibus

De animalibus
De animalibus

De animalibus
De animalibus

De animalibus
De animalibus

De animalibus
De animalibus

De animalibus
De animalibus

De animalibus
De animalibus

De animalibus
De animalibus

De animalibus
De animalibus

De animalibus
De animalibus

De animalibus
De animalibus

De animalibus
De animalibus

De animalibus
De animalibus

De his fac.

Quoniam succus

frigidus, & hu-

midus sub pitui-

tae genere cadit.

Quoniam pituita

frigidus, & hu-

midus sub pitui-

tae genere cadit.

De his fac.

Quoniam succus

frigidus, & hu-

midus sub pitui-

tae genere cadit.

De his fac.

Quoniam succus

frigidus, & hu-

midus sub pitui-

tae genere cadit.

De his fac.

Quoniam succus

frigidus, & hu-

midus sub pitui-

tae genere cadit.

De his fac.

Quoniam succus

frigidus, & hu-

midus sub pitui-

tae genere cadit.

De his fac.

Quoniam succus

frigidus, & hu-

midus sub pitui-

tae genere cadit.

De his fac.

Quoniam succus

frigidus, & hu-

midus sub pitui-

tae genere cadit.

De his fac.

CAPVT

C A P V T V I I I

Discremen inter ventriculi pituitam, ac cerebri: Quomodoque à ventriculo, & quomodo à cerebro, ut à duobus fontibus pituita profuat. Et quomodo pituita excrementitia, receptaculo proprio carens, cunctis corporis partibus inesse valeat, disquiritur.



Veniunt Hippocrates Artes, ac opifices optimos, & peritos eos quidem statu-
it esse, quibus facultas operaturæ est æque tum per naturæ, tum per artium
instrumenta: Naturæ autem instrumenta, naturæ humanæ corpore instrumenta
sunt, quibus artis instrumenta incitativa, emulativa, adjuvativa, curativa,
& conferuativa proportionē respondere debent, sicuti natura ipsius indigentia
requiritur: cum autem naturæ instrumenta varia, varique modo sunt: quia
principaliter, alia vetō generatiora non principaliter; Alia verō retentiva, alia
alia recipiētia, alia attrahētia, aliaque veluti viæ sunt, alia denique nutrienda:
idem melancholizē spiritum, & bilis flauæ amaræ chylis, seu vesicæ fæcæ, seu excre-
mentis partibus nostri corporis miuimè accommodatis, vt propria receptacula affi-
per que ipsa excrementa superuacua euacuari possunt: & contra vetō pitui-
tis etiam pituitæ pectegmentum nullum proprium instrumentum configuatum d
sunt, vt patet: quæ alioquin, si in artibus, & in opificibus, aut in quocumque

Optimi medici
diagnosunt in-
strumenta aera-
re & scrip-
tore ad instru-
menta fieri in-
tuitu.
Naturae instru-
menta plurima.

Alia generatua principaliter, alia vetò generatua non principaliter: Alia verò recitencia, alia transmittencia, alia recipientia, alia attrahentia, aliaque veluti vi sunt, alia denique nutrabilia: Verùm sicuti acide melancholica splen, & bili faula amare chylis, seu vesica fœlea, excrementis quidem confitis partibus nostri corporis miuinè accommodatis, v' propria receptacula assignata fuerunt, per que ipsa excrementa superuacanea euacuari possunt: & contra verò pituitus naturalis, hinc etiam pituitus pecternaturalis nullum proprium instrumentum configaturum à natura habet, sed cum alijs humores in eadem conuenienter colligantur.

Cut pituitary ex-
crements; mol-
lusc receptac-
ulum etiam fuit
fieri huius rei-
que adhibetur
est.

Lib. de arte 9. 70.

Slipp, de priske
vand i løst.

Lib. 2. c. 14.
Gal. 3. de muf. c. 5. in fine.
Hippo. de puf. med. in fine.
De puf. m. in p. 2. c. 10. & 144. & 1. de fuf. med. fac. 30.
F. De decret. Hippo. 2.

Lib. de plenit.
f. 81. G. c. 13.
2 De nat. fac. c.
9. de corr. 1. 2.
ph. 13. de alibi.

Hipp. 4. de mor-
bis 5. de 5. de 5. de
Forf. de lib.
3. De nat. for. x.
4. de c. 7. de c. 8.

Gal (in f. de m.
vales 3. e 4.º)
4. De tfo part
6.º

9. De wien past
bestaat uit drie
leden: de voorzitter

Vendurile în firmele din principalele paze sunt în plin creștere, în special în cazul de pe lângă, c. 1.1.

quod si, de atrabile est quia in prima conditione est ralis pituitum fit ut de cauda, Tetrastus in bacillis per pro separatum vel ut pars infirmamentalis, vel ut similis, aut sua facultate est etiam ipsa pituitum causam pigmentum per se de primo.

Per accidens
Quando ventri-
culi foribus re-
fusa videntur
ne venisculi
pariter solida
non loquantur.
Per accidens
si videretur ut in-
strumenta chy-
lificationis &
graviditatis
esse primum
trudantur.

Gal. qui etiam statuit magna ex parte ventriculum cerebri, & cerebri ventriculo suas affectiones transmittere. Vnde ventriculi ofidiosum, quod vis affectum facile in finitem affectum cerebrum ducit, ut Galenus clare statuit. In Epiglotide enim generatur etiam humor phlegmaticus viscosus ad hoc, ut humectet instrumenta voci inferiendia: qui si ex aere efficeretur, in durefactus, & copia quoque peccet, vocem, & anhelitum lardere potest, ut reor. Et aphonia efficeret: ac etiam deglutitionem tollere, ut in duobus agris vidi, pro quibus argentea siringa fusa fuit, pro alimento affumendo. Verum enim vetò picuitia, quæ tum à ventriculo, tum à cerebro emegit, ceu à duobus crudatis piscuiformi fontibus: ea est, quæ omnes corporis nostri partes, atque totum infans folet: ac id sanè plus, & minus pro ut etiam plus, & minus cruditas copiosa, & fluxilis sit, nec non ventriculi ex plerique fibris transmissa facultas exiliens, & cerebri ex plerique in arteriarum motu confensus validior, aut imbecillior appareat: cum omnis pars nostri corporis semper fudeat ea, quæ molesta, & noxia sunt expellere, atque vel foras emittere, aut ad imbecilliotem partem transmittere. Hinc Dens, & Natura partes nobiliores, ac principales ad vitam nostram manuteneandam alijs valde robustiores con stituunt: Quocirca Hipp. affert morbus grauiissimos esse, à validissima corporis parte ortos, eò quia talis pars valentissima necesse est, quod totum corpus gubernet, quæ laborante, etiam totum corpus affici necesse est: Sin autem ab ipsa validissima parte ipsa, quæ laborantem aliquam partem cruditas fluxerit, morbi diuturni sunt: Sicuti è contra dum ab imbecilliotibus ad robustiores, ratione consensu partiu, humor fluxerit, ipsi morbi breuitas quæque erit, ratione valide partiu foras expellentes, & non recipiens fluxionem humoris: Nam si eam recipere pars ipsa, morbus grauiissimus, ac fortassis mortiferus fiet. Sed de capite præsertim ait Gal. quòd ob crudorem humorum multitudinem in capite aceraturum, vel ob inflammationem, aut spiritum flatuolum, aut sanguinis multitudinem, ut bilem mordacem, aut intermentanciam, dolor canis continet.

Cerebri magis à ventericulis cō-
freto afflicti, quam sacro, ac
quàm ab alijs partibus.
In epiglottide
cacharrus otio-

C A P V T I X.

De partium sympathia, quæ à ventriculi, & à capite pituita fluente affici
possunt, agitur.

Cruditas aetern, in ventriculo orta, primò si valde crassa, motuq̃ inepes, seu copiosa, & virtus expultrix non valida fuerit, in ventriculi fundo magis colligitur: & ibidem coacervatur: Praterèa in ventriculi cauitate inest, vel tunica ventriculi, & fibrillis, seu villis annexa, atque tunc facultas, tum coctrix, tum retractor, sed plus coctrix laediur. Insopet etiam suis vaporibus os ventriculi afficere potest, ac ibidem vapores calescere, ac in pituitam iterum conuerti. Vitæius in pancreis, & in prima cauitate, quæ inter pancreas, & ventriculum reperitur, pituita à ventriculo genera, quæ per venam ætygos, & per veficam expurgatur, vt Hippocrates, & Galenus afferunt. Hinc ea pituita sua crassitie, si in meatibus tenui, seu in sua parenchymate retineatur, illibi, & obstructions, ac dolores nasci possunt: & à calore innato non valido, & arenæ, & lapides in renibus oriri valent, vt senili ætati contingere solet: Sio autem à validissimo calido innato suau, & plurimo magna in copia ipsa pituita liquata vsq; in vesicæ vrinæ descenderit, ac ibidem permanferit, tunc vring difficulatem, & etiam lapides per congestions, & concretions modum procreat materialiter, vt pueris concipit. Pituita verò præterea venis aggregata per renes expurgatur aie Galenus: hinc etiam per vasa spermatica, cuius verò spermata permiscetur, atque descendendo in emissione feminis emeditur, semetque infundendum red-

Pluvius, in ven-
ticulo gemitis,
ad quos pariter
transfugeremus,
Et j. de v. per.
c. 2.

Clal. in G. de m.
vulgar. 3-48 17,
de com. 1-16

si fieri in parafitibus vna cum semine retineatur, corrumpitur, in venenique naturam transmigratur: similiter in vteri acetabulis, & venis defende, tuoc si in vtero fuerit, menses desolatos facit: si in vtero in acetabulis vteri multa pituita sit, eotempore menfura pauca colunt: Dum autem in vtero corrumpitur, profocationem gignit vterinam: si in vtero vitrea pituita ad ventrem accesserit, tormina parit: si vero ad infertina peruenierit, & colicum, & ilei do- lorem, & lienteriam: atq; si falsa fuerit, etiam dysenteriam, acinellum procreare valet pituita cruda. Pituita vero melenenteria, & omnes primas venas, cum sint hę veng angustę, facillime obstruere potest, tam sua copia, quā crassitie, leotore, ac visciditate, quas ingredi facillimē valet, cum ventriculo hę veng proxime sint: & cum in melenenteria succus, qui in gibbo icterici fa- sanguis, quadantenu coquatur, antea veluti preparatio in hepatis radicibus facta, ad sanguificati- onem efficienda: Ideo crudiora in melenenteria manet: et si in hepate simeuntur quoque atque etiam a fromacho per melenenteriam ad lienem per vas venosum, seu venam coronariam, pituita cruda fluat: hinc nō modo in venulis melenenteria, hepatis, & lienis: Verum etiam in carne, in spi- ritibus inter venulas, & in porosificatis coacervatur: Vnde si libidem macoat, putrefacitque febris valde diuturna efficit: quoniam is crudus humor ita difficilē coquatur, atque diu, sicut lapidis

Thomas Terrance

B. $\frac{1}{2}$ g. extra

CompuLink

si supra eam sit effusus, quandoque; cum bullis veluti fermentationem ebullitionemque excitat, ubi scilicet adscititia putredo nigro illi succo naturaliter se habenti accessit. Hic autem innotat dignum esse inuenio; Galenumque Hippocratem succum melancholicum, seu melancholiam naturalem omnibus in locis impropiet atram, seu acidam bilem naturalem appellantes, atram præternaturalem vocant, melancholiam verò naturalem, atram bilem. Que sanguinis sex est, etiam atram bilem inuocant, seu succum nigrum naturaliter se habentem; ex quo atra bilis proprie vocata putrescente pigri valet. Hinc pergendo, ait. Pari modo, & id nigrum facit, quod nondum illum veluti ebullitionem, fermentationemque terræ efficit, est naturale, id est melancholia naturalis, quod autem in tale mutatum est nempe in atram bilem proprie vocatam vim, ac speciem id iam præter naturam est, seu quod ex vltio non naturalis caloris acrimoniam affuerit, ac veluti emis quidam sit redditum. Sic quodam modo & sex vltia non vltia diffidet: illa namque admodum calidiora est adeo, ut eam vrat, liquet, & corrumpat: altera verò, quæ nondum est vltia ad omnia medicos vti deprehendas, ad quæ terra humiliori alijs, quæ simul sicca, ac refrigerandi facultatem habent, per hoc enim exemplum, facis vltæ, ac non vltæ intelligit asserere, atram bilem vim frigidam, & siccam cum aliquo subdominante calore possidere. Melancholiam verò vim frigidam, & siccam omnino obtinere, sed illius rei exacte infra meminero. Mihi enim modo satis est ostendere atram bilem esse generis cruditatum acrium, & mordacium, vt etiam Gal. hanc veritatem alijs quam plurimis in locis confirmat. Vbi hanc acidulam esse asserit. Sed quoniam hæc ipsa atra bilis in hoc quoque aceto similis acerrimo sit ob crassas tamen subsistens partes, et maxime contraria est. Proinde quibus corporis partibus pura, impermissaque addarctis eas prorsus excedendo vtear. Vnde cum iucum gigni ab hepate valde plus iusto calidior, intestina vicerando, humor ille dyenteriam parit, ait Gal. hoc modo exarando. Deuenit autem ad dyntem flatum, qui ex ventre in fecru digressus est succus atabilis, cum sit propterea, quod vltierius in corpus non digeritur, imbi diutius moratur nempe in hepate; ac postea à iecinoris cauo ad intestina descendendo excreuit. Nominatur autem talis excretionis species à nonnullis dynteria; quæ vtique ab atra bile dynteria lethalis habetur, vt ait Gal. flama bilis, vt quæque intestinorum erodere alias aloud videtur: nimis in quo potissimum hærescit, sese firmaverint, interdum quoque insanabiliter prorsus dynteriam reddere. Proinde Hippoc. in apborismis scriptum reliquit. Dynteria si ab atra bile neperit, lethale. De aciditate autem atræ bilis etiam inquit Hippocrates, quem Hippocratis locum Galenus alibi citando ipsius Hippocratis verbis ait. Et interdum ex emara acidissima effusa amaror videlicet magis vltio nigrum adspiciunt colorem. Hinc per eius colorem, & saporem hæpe atram, nigramque acidam veteres Græci nominant, vt pallidam, amaram etiam appellatam, vt testatur Gal. Insuper quoque acerba ipsa est, vt ait Galenus inquit acerba enim est, atque acida, bilis atra, & contrahere ipsam id est ventriculi ac constringere, non quoniam sit flama vltierius nata est, vt de aceto asserit Hip. dicens quæ ab aceto est acrodo seu acerbitas picrobolus prædest. Hanc autem atram, seu nigram, & acidam bilem adultam præternaturalem frigidam quidem, siquidem siccam est, cum aliquo tamen calore iunctam subdominante iam parum atrea Gal. verbis rationibus, ac experio fecis vltæ desumpto manifestum est. quadatenus verò etiam demonstrari potest eo, quia bilis atra ex sufficienter immodico calore oboritur per adustionis modum, ergo sequum est, quod accretur naturam eius caui efficiens, atque idcirco vt sufficienter immodicæ æcis natura sit. Pretere a ite sic etiam bilis nigra generatur omnino ex immodicæ caloris sanguine, & feracitate, vltius enim quidam nigra bilis efficitur frigida quidem eò quod terra caloris autem participet, siquidem, & acrum, & com. 3. prog. 2. 7. atram bilis in veluti emercit vehementer affectorum humorum feruendo excitat febrem ait Gal. id est febrem quartanam excitat, vt 3. prog. 2. 7. & 2. de sympt. caus. 5. Nilominus Gal. totum in oppositum de promit. atram bilem terream, frigidam, siccamque esse statuerdo. Pretere omne acidum frigidum potestate conspicitur, cum dixerat Gal. Eadem ratione acida ratione sum ca, quæ simpliciter essent, sicut oxalida, & oxylepatum: tum mistis quoque alijs qualitativibus & e. nullo fecus refrigerantia experiri sum, quæ sunt mala prona, mala prona, mala, mala, sicut, & acra, ipsamque acrum, & ait hinc aciditatem ipsam acerbiter sequi, ac aciditatem in terra comprehendit. Acidumque, vi frigoris efficit. Pro solutione verò istius ardui dubij Primò speculat acidum calorem quo ad causam efficiemem, multis modis posse gigni, nam vel per gradum cruditatis in simplicibus acidis, vt ait Gal. Aciditas provenit calore ipsos quidem insipienter conquirere non tam perfectam mutationem, a quæ alterationem efficere potente. Vnde statuit à calore mutante, & à frigida vinceat, aciditatem eriri posse, hinc er omnia acida terreque substantiæ esse frigida, & sicca, nec non repellentia, vt acerba. Porro per eundem cruditatis modum in ventriculi coctione viciata ex tarditate coctionis, aut cruditate, in qua vltus sentitur acidus, vt ait Gal. aciditas emergit, & hoc eodem modo acida pira oboritur. Pretere aciditas per modum putredinis ex rebz suisuibus corruptis à calore nimio extrahit, exhalare faciente partem suam, seu in pinguem, ac dulcem, & calidam, manente terrea natura, frigida, sit vt ex vino, acetum nasci, accidere solet, veluti qui acetum vinum esse mortuum asserunt. Nam hi propriam vini caliditatem perdidisse quidem, verum ex putredine assumpsisse aliam nempe frigidam naturam, vt deinde istorum sententiam laudat Galenus, insuper aciditas per modum nimis adustionis à calore immodi-

Etiam, & de
fract. 4. cap.
Atra bilis vero
naturalis vel
fæci niger atra
bilis impropiet
est, quæ proprie
melancholia voc
catur.
Atra bilis pro
prie vi frivtha
est ex melanchol
ia, id est ea fec
pò vltæ genita,

Atra bilis
genita in hep
te morando.
Ex quo dynt
ria fit.

Bilis atra acida,

Ter saporem
& colorem bilis
fuit vocatur.
3. De du. Hipp.
c. 5.
De vltio in
ma com. 3. g.
& com. 1. de fract.
com. 40.
Bilis atra acida
est.
De atra atra bi
lis frigida, de se
ca est autem ob
aliquo calore
subdominante,

Primum istam
nia fundamentum
ipsum est.

Sordidum fun
damentum,

Verum funda
mentum.

A
Vi patet, 2. epid.
com. 1. de du. 1. f.
2. 3. 4.
De eadem fecde
de atra bilis c. 9.
& 1. de vltio in
ma com. 3. g.
1. de du. Hipp.
c. 5.
Ibidem, 2. de
putredine.

B
De atra bile c. 9
Ibidem.

3. De dynteria in
3. de symptom.
caus. 5. 1. f.

De atra bile c. 9
& 1. de vltio in
ma com. 3. g.
De atra bile c. 9

4. Aph. 14.
De pira in
in fin. c. 1. f. 2.
De du. Hipp. c. 5.
De du. Hipp. c. 5.

C
De emercit.
com. 4.
De Meth. c. 1.
De vltio in
ma com. 3. g.
De vltio in
ma com. 3. g.

3. De dynteria.

1. De dynteria.
caus. 5. 1. f. 2.

3. De du. Hipp.
c. 9. 1. f. 2. de
caus. com. 3. g.
& 1. de vltio in
ma com. 3. g.

D
De dynteria
c. 9. 1. f. 2. de
caus. com. 3. g.
& 1. de vltio in
ma com. 3. g.

De dynteria.
caus. 5. 1. f. 2.

De dynteria.
caus. 5. 1. f. 2.

De dynteria.
caus. 5. 1. f. 2.

A Immodico extraneo, tum putredinali, tumq; combustiuo gigni valet, quoties ab eo calore vilius aliquid vel dulce, vel amarum, aut acidum nõ vltum, comburendo euaporare faciat, aut dulce sanguinis, aut pituitæ, aut amarum bilis fluxæ, aut portionem duleis melancholiæ, & hinc acidissimum saporem efficit, vt in atra bile concingit. Vltierius aciditas etiam per modum concoctionis à modico calore hepatis fieri valet, à quo etiam probus sanguis celebratur, non quidem ab eo calore, vt ab eo exhaletur dulce, nec amarum, immo prout dulce sanguinis, & pituitæ, & amarum bilis pallidæ ab aciditate melancholiæ naturalis excrementosæ segregantur, cum per huius vim bili infusam, cum melancholiæ acidam attrahentem pro sanguinis alimentalis, & optimi desfectione, seu deputatione; tumq; per chylum fealem, bilem pallidam naturalem, excrementiciam ad se attrahentem. Præterea etiam contemptior ea duo exempla, à Galeno posita, aceti, & cineris esse tum declarandi, tum verificandi temperamētū atræ bilis. Idcirco perpende, quod Galenus ait acetum compositum esse, tum contrariarum tum qualitarum, tum substantiarum: Quocirca & qualitatem virtualiter calidam, & frigidam acetum continere in se statuit in parte namq; faculenta calidam, in alia verò tenui frigidam vim possidere: Vnde fit ut in aceto longè plus teneis pars est, quàm faculenta. Ideo fit etiam longè magis refrigerat, quàm calfacit: et si ad caloris reuocationem procliuus sit, & cum asperum molestinumq; habeat transitum, caloris quoque particeps sit, ait enim: *Veluti sex est in illi visque, & in aceto est eiusmodi quippiam, & forsani ipsum est, quod caloris est particeps: quod verò frigoris id, quod tenue est. Nā quod maior pars frigidius sit, quam calidius, &c. & postea inquit, ut ante dixi, ex contrarijs facultatibus compositum est acetum, perinde ut lac.* Forte verò caloris reuocatione possit autem etiam asperum, molestumq; habeat transitum. &c. Hæc enim verba pro response quæ situi ante propositum exarat, cum dixerit. *Vnde nam igitur quibusdam obsema caliditatis sensus obnotatur? Vltierius scias Galenum de cineris natura ita scripsisse. Cuius combustorum ignorum reliquia, sic vincta: ut, composita ex contrarijs tum qualitatibus, tum substantijs. Habet enim in se partem remouam, partim veluti fuliginosam, siue quomodocumque, quis appellare volet: atque hæc sãd partes sunt tenues, & quæ maceratis aqua cineribus, & percolatis vni asportantur, atque abeunt. Quod verò reliquum est terrenum, & infirmum, & moris vne eius calida facultate deposita. Sed non omnis eius eadem temperatam prædixit est, sed pro combustile materia diuersitate, variatur. Si ergo atra bilis quadantenus aceti fecce parti affimiletur, procul omni dubio probe facies, etiam si longè magis aceti parti tenui frigida respondet eò, quia bilis atra amurex, & soci simul est, vt ait Gal. ergo ex hoc vtique bilis atra calore aliquo iuncta est. Sin cineri ea comparetur, certum est quoque atram bilem partim de fuliginoso possidere feruore, et si magis de frigida terra natura ipsa obtineat; tamen atra bilis fuliginosa ita est, vt à Platone, & à Galeno eius terræ fermentatio feruor iure merito appellata fuerit: & ipsa ab agente igneo genita quidem est. Quid enim in corpore humano fuligo est, nisi vapor fuliginosus ex humorum aduisione obortus? Cum fuligo corporis humani ex materijs vaporis, vltisque immodicè edatur. Vnde fuligo pro adusta materia assumitur. Quocirca fuliginosus, ac fumus in aere existentibus atram comparauit bilem Gal. ait enim, fuliginem ex immodicè assis, vltisque est namq; fuligo vapor terrestris, sumus nullio quadam ex terrestri, aqueoq; substantia, tenuium partium & alibi ait. Hæc enim pleniùs fluxa bilis calfacit, & ut ita dicatur, superassata atram exhalationem, seu fuliginem quandam &c. Postea verò inquit. Quæ enim veluti fuliginosa, ac saniosa, & sumosa recrementum appellamus, in aliditatis genere, ea omnia terre asint, tenuium partium & velut smaccolia cum immato calore, quemadmodum fumus, cum igne: apparent enim in hoc euidenter aëria omnia, & calida, & sumosa materia adusta recrementum, ostenduntia siferptam quidem esse in se ipsa ignis vim, non tamen adhuc penitus ab igne separata: flamma enim ita nata est, & non adhuc sumus esset. Hinc bilem atram adesse significat somnium fumus, caliginis, ac tenebrarum ex Gal. Tertio autè perpendo Galenum exarasse sed atra bilis de atra bile alloquendo pro priè dicta in quibusdam partibus in super moueatur, in quibusdam immota manet, in alijs pareat, aut feruere incipiat inordinatas fieri febres necesse est. At verò quoties in cunctis venis eadem sit affectio, emperante atra bile quartana consilij febres antea verò exaruit quartanæ atrabilario humore consilij, & item prodium de generatione huius humoris, quæ duplex est, non ex sanguine crassiore, non etiam à fluxa bile vehementer assata. Præfaciendū autem eam atram bilem non esse à prædominio calidam, immo frigidam; nam alijs in locis antea statutus, quibus ait, atram bilem esse frigidam, tunc humorem melancholicum, seu quartanæ massæ sanguineæ humorem intelligit: ideo idipsum statueret, cum volueret de atra bile quoq; propriè dicta quartanā concitante, vt alibi ait, proinde promulgauit. In qua rationis autem nullus rigor ex calido, frigidoq; est: nigra namq; bilis frigidus natura sue est: sed cum putredinem quandam ab ipsa admixit, cuius causa febre: accendit, tantum possidet, quantum etiam putredinis. Ex hac tenore autem fundamentis allatis patet atram bilem propriè appellatam compositam quidem ex contrarijs tum qualitatibus, tum substantijs esse: sicut etiam acetum, & cinis, sic se habent: atramen atræ bilis calorem absolute, seu simpliciter potencialiter frigiditate ipsa predominantem sanè minore efficit liquidò constat. Cū atræ bilis pars tenuis comparata, singulq; pars crassa, cineri assimilata, profectò longè maiores sint, quàm pars crassa, seu scilicet aceti: proportio nata vna, & pars tenuis fuliginosa cincti respondens sunt. Hinc atræ bilis partes frigidiores*

Tonus Tertius.

B 3 cxi

Quoniam fundamētum.

Quoniam fundamētum.

Solutio dubij prima.

Responsio secundæ.

Prima responsio declaratur.

Secunda responsio declaratur.

Tertia responsio.

Secunda responsio omnino patet.

dum bilem æquæ cum ex pallida naturali, cum ex flava calidiori præternaturali componi factus est, cum dixerit. Quandoque hunc quoque in vomitu, dejectioneque, aut pallidum, aut flavum, aut ex utroque compositum, ac medium licet intueri, quæ utriusque composita bilis splendida habetur flava namque quod veluti ignem in bile splendet, ipsam reddit flavorem. Tertia autem species mihi videtur esse, bilis rufa, quæ utriusque minus flava, hinc etiam minus splendida est, atamen de rubeo aliquantisper participat colore. Quoniam & flavum, & rufum, & pallidum nominantur huiusmodi bilem; plenius sunt medicorum libri, in quibus hoc, vel illo modo appellatur, sicuti in quibusdam indifferenter. Melius est hoc in loco illud rufum adnotare, ut exactius quis dicta assequatur, quod rufus color ad flavum proximè accedit. Ergo rufa bilis posterior flava est in hoc autem differant, quod alter magis ad album, alter ad splendendum vergit. Nam & amara bilis aliquando rufa apparet, aliquando flava, sapinis autem & pallida tibi videtur esse: si quidem albior, & turbulenter soluta sit rufa: si verò splendet sit, & purior flava, nam quod veluti ignem in bile splendet, ipsam reddit splendorem. Comparandum autem rufum flavo color, & pallidum rufo, ait. Quantum verò flavo rufum est albus, tantum illo rufo pallidum albus, Quantum rufus minus albus est flavum, quàm rufum, tantum flavo rufum rubicundum, quia & sanguinis color nonnunquam flavus, & rufus existit, nonnunquam rubicundior apparet: Unde & sanguinem ipsius aliquando flavum, aliquando rubrum dicunt. Rufa ergo bilis ex rubeo, & flavo conficitur colore ad albedinem vergens, & ad flavum bilis proximè accedit. Quarta verò bilis amara species, tubæ quidem existimatur. Ait enim Hippoclitus, quæ rubra verò à sanguine ratione bilis ruberæ: de qua Plato in Timæo ait ut annotavit Gal. Platonem dixisse. Interdum sanguine tincta amaritudo bilis subrubrum colorem habet. Hinc ait Galenus, sic & rubram bilis vocant, quæ sanguinis ferum est amara: bili pallide, seu flava, aut rufæ commixta, quæ subrubra vocatur. De qua etiam alibi dicit, & alio in loco habet, Sic igitur & rubram nonnulli bilem nominantur, quæ ad tenuem sanguinem consistentia proximè accedit. Sed quoniam non conersent, nec vero bilis eam appellant, ac etiam quia ei amara bilis commixta persentitur. Quinta autem species utriusque etit vitellina bilis, quæ flava, & rufæ bili proxima est colore, caloreque maiori, & crassius consistens, colore tamen, simulque calore minori, & consistentia tenuiori est quàm ceteræ bilis amaræ species in se ponendæ sunt. Vitellina etenim denominatur, ut ait Galenus. Quandoquidem quæ flava est, efficitur vitellina: ita enim nominata, cum ovarum vitellus, tum colore, tum crassitudine se assimilaret: postea inquit. Sed vitellina flava ipsiuscens progignitur, & alibi ait. Næ sepe flava bilis plurimum humida reddit, quo tempore non amplius flavum, sed pallidum colorem refert: sepe numero etiam eo crassescit, ut vitellum immittatur. Unde à nonnullis illi vitellina nomen inditum est, & alio in loco de parte, seu via, in qua ea fiat exarat. Ipsa verò ergo bilis, seu pallida, seu flava, seu vitellina vitæ generationem in vasis obtinet. In venis namque parvulis flava morando incalescit, simulque ipsificat. Quandoque verò vna cum bile flava etiam tenuior serosus succus commiscetur in ipsa extrinsecus venulis, præsertim hepatis seu ventriculi, ubi etiam atra bilis fit, ut in dysenteria perniciosissima contingit, ut antea iam dixi, ac inibi simul incalescere, & crassescere potest, simulque in vitellinam transmutari valet bilem. Quemadmodum etiam eodem modo vitellina fieri potest bilis ex pituita flavae bili mixta, ac petasata. Cum rei meminisse voluit Galenus hoc patio. Bilis autem flava, ut tenui ista humiditate, & calore pallidior, & consistentia humidior redditur, ita cum dilata ipsa tenuis humiditas furit, & incalescat, & ipsificat crudiorum ovarum vitello similis apparet, atque ob id vitellina vocatur. Hinc notatu dignum esse invenio, eam tenuem humiditatem, seu vicietium causam esse, ut bilis flava non ita tenuis penitus ne dum in venularum angustissimarum vias extremas vna cum pituitæ aliqua portione quoque penetraret: verum etiam, ut interdum extra venulas in carnem per porositates permearet, ut non nisi postea vitellina iam facta longo temporis spatio ipsa bilis tolli posset, ut se possim in f. berbus tertianis exploratui habere denique per feculum talem bilem egredi compertui. Immo potius talem bilem vidi æruginosam, quàm fecus: Vitellinam etenim in æruginosam converteri Galenus statuisse invenio. Cum de promptis vomitus tum sincere nunc tempore pallide, seu flave, vel rufæ bilis, ut ait, quæ ovarum vitellis similatur, quæ postea æruginosa aliquando colorem referre conspiciuntur, id est post evomitionem factam ab aere, ex siccata illa humiditate, vitellinum colorem causante, bilis æruginosa, & quadantenus obscurior etiam evadit: Unde æruginosa fit. De qua etiam inquit, flava autem bilis, cum supra modum affatur, primum quidem æruginosam migrat si cernit, deinde in rufam. Quomodo autem fiat æruginosa, ait. Et ubi animalia calida aut fame, aut siti torquentur ad atrum colorem vergit, interim illum habens æruginosum, interim isatidis, qui quidem magis est colore brassicæ siccus. Hinc nota, quod sicuti æruginosa bilis viridis elara est, ita viridis bilis isatidis coloris fusca est, ut infra videbis, ambeque à iccinonis vi, in venis emergunt: sicuti poracæ, quæ præstina etiam vocatur, quæ sine morbo vomitur, ac deicitur, ut Gal. ait lib. 3. de alim. fac. cap. 39. nec non græguina Zinzara appellata in ventriculo procreantur per corruptionis modum prodire ante, ita in dictum est, de quibus modis serino non habetur. Verum ad septimam bilis amaræ speciem, quæso, accedamus, quæ utriusque viridis obscura, seu viridis fusca est, illatis appellata, cum Galenus ex ararie. Et fusa à bilis quæ ab isatide herba, cuius fuscus colorum refert, isatidem appellatur, & postea deprimitur interire isatidis color ad atrum colorem vergens, quæ quidem

Tertia species
rufa.

Difformis inter
rufam & flavam
bilis.

Quarta species
tubæ est.

Quinta vitelli-
na est.

Notatu dignu.

À sua specie bilis
in æruginosa
est.

Septima bilis
amaræ species.
Quæ fuscior &
obscura
vocatur.

A
4. De feb. tuen.
cap. 13. G.
5. De vitellina
12.

Ididem.

Ididem.

Ididem.

B

6. Epid. com. 5.
7. De dec. Hipp.
& Vitell. 3.
8. Epid. com. 5.
com. 14.
9. Epid. com. 4.
com. 14.
Com. 1. de nat.
hum. com. 4.
De atra bile 2.

3. De nat. feb.
4. Epid. com. 5.
com. 14.
Com. 2. de nat.
hum. com. 4.
De atra bile 2.

C

4. De vitellina
12.

De atra bile 2.

D

1. De feb. tuen.
cap. 13. G.

In 1. proo. com.
3. de nat. 10.

10. De simp. m.
fac. 34. E.

Lib. de atra bile.
com. 2. de nat.
hum. com. 4.
De simp. m.
fac. de feb. 2.

Com. 3. de nat.
hum. com. 4.
De simp. m.
fac. de feb. 2.

magis

A magis est colore brassy fusus. Eam verò obcuram nuncupavit Gal. exarans etenim arguiosa bilis vomipar, & subrubra, & atra, & obscura. Eamq; ex flaua affata fieri patet sicuti etiam alie amaræ biles in venis obortæ eodem modo fiunt. Nam Gal. de ipsâ, & de crocea, quæ octaua species est, ac de ferruginea, seu de rubiginosa, quæ colore rubiginosi ferri similis se habet, quæ nona species est, ait. Porro admodum ebiliorum id est viridis, aut crocea id enim utroque modo vertas, licebit, quia gemina significat in altera significatione bilis crocea, seu pallida copiam permixtam in altera rubiginosa significabit. Virides itaque linguas dixit Hippocrates Galeus explanat in in compuni pita vsu mortales nominant, virides quosdam se vidisse dicentes, quibus in biliosis color mutatus fuerit ob pallidum scilicet bilem nimis copiosam, tumque assatam. Hanc autem ipsamdem, & fame, & siti, ac pimia, seu longa defatigatione fieri certum est, ut infra videbo. Crocea autem, seu octaua species à Gal. statuitur, ut antea vidisti: Verum prius ab Hippocrate in textu eo constituta fuit, vbi ait. Si autem aquosa admodum, aut candida, aut admodum crocea, aut spumans deiciatur, hæc omnia mala sunt, & in text. à i. a. it. Mala etiam sub crocea. Item Gal. de bile rubiginosa dixit t. 2. & text. à i. postea etiam scriptis. Si verò subnigris sit deiectione de rubiginosa bile (id enim, ut antea diximus est, secundum vocula chloras id est viridis, aut crocea significatur est) vehementius consumptionis inditum est, si levis sit deiectione. Itaque namque diu species deteriores longe sunt ceteris declaratis, cum eo longè à statu naturali distent, ac eo quoque ad deterriam atram accedant bilem. Ceterum adhuc etiam extrusa bilis amara, quæ etiam magis à naturali pallida bile recedit, quam crocea, & rubiginosa, & etiam quia atræ bili proxima inuenitur; tamen in hominibus eam reperi non esse, cum in tauris tantum cum ipsam vidisse, falsus sit Galeus, dicens. Et ubi pallida animalia aut fame, aut siti, tunc inuenitur ad atram ebiliorum vergens, interdum illum habens eruginosum, interdum carneum, interdum istis, & postea. Et quorundam ego taurorum bilem vidi carneam, flaua nimirum super affata. Nam ille taurus, vixit violententer tractus super a modum fuerat defatigatus: itaque eo labore cum exaudisset, solum est temperatam eius fuisse calidiorē: probabileque est sic violentum pertrahum tenuisse, cum etiam efurisset. Quatuor ergo ipsi de causis tauri illi bilem carneam contigisse patenter inpegnitissimo labore, seu defatigatione, ex candescencia, siti, & sume. Verum tamen verò præter has species, multæ aliæ, ex ijs compositæ inueniuntur biles, nomine carentes, sicuti de illa dixi & pallida, & flaua composita, de quibus mentionem facere voluisse Galenum hoc modo, & exploratum habeam. Conspicitur præterea nonnullam, & arguiosam, & fusca bilis, & rursus rubra, item & alia, quæ nomine carent, & id maxime ubi morbus sit ex putredine. Hæc autem de bilis amaræ species ex Galeno tantum me dixisse volui, cum quidam certa doctrina est, tum eo, quod doctrina ista nigri sparsa per omnia ferè Galeni volumina est: Vnde magno meo labore isthæc compilauit, ne amplius ita me defatigare. In Auicenna verò libris ista certa doctrina desideratur, ac etiam non ita inueniuntur difficultes illi collectio specierum bilis amaræ, ab Auicenna cholericæ appellatur, & à scriptoribus, hæc species plurimæ in Gymnasijs profitentibus collectæ sunt. Proinde de his bilibus ex Auicenna Meuse nihil agere volui.

Crocea etiam ab illis, flaua, & obscura.

Crocea etiam ab illis, flaua, & obscura.

Deterior species bilis inter croceas est.

Quatuor de causis bilis croceæ Galeni sunt in opusculis inueniuntur, & illæ sunt: aut fame, aut siti, aut defatigatione, aut putredine.

C A P V T X I I.

De atra bilis speciebus.



Mnibus à amaræ, & flauæ bilis explicatis speciebus, quæ mordaces sunt cruditates, minus à naturali statu recedentes, quam alie mordaces atræ bilares sunt cruditates. Ideo nunc eas atræ bilares specie distinguas, & acidas amplectar cruditates. Quoniam, ut iam dictum est, sicuti cinis sua natura potenciali frigida, & sicca pro combusta materia diuersitate variatur, sic etiam atra bilis, quæ cinerem penitus imitatur, atque terrea est frigida, & sicca, procul omni dubio pro combustis succi, ex quo sic, diuersitate species quoque ex illa variatur. Hinc tot atræ bilis species interim erunt, quot succi in nostro corpore sunt, qui à calore tum combustio, tum putredine in cinerem, ac in atram conuertere possunt bilem: Cum autem maxime humoralis quatuor duntaxat succi seorsum specie distincti sint, qui comburentur, ergo quatuor tantum atræ bilis species erunt. Quarum prima vtique ex picuita superaffata, ut à iucco albo, exordiar, emergit, dum picuita potissimum falsa in ardente febre (cum in morbis ardentibus maxime atra bilis sit) putrescit, ac in bilis naturam transfert, denique in atram bilem facile migrat, ut omnes scriptores confirmant. Secunda verò species ex melancholia naturali exurgit, cum dixerit Galenus, ubi scilicet adscititia putredo, nigro illi succo naturaliter se habenti, accedit, ut iam dixi cap. 10. atra bilis fit, dum ex ipsa putredine quod autem in salem mutatum est vim, ac speciem, id itaque præter naturam est, cum quod ex vitio non naturalis calor acrimoniæ ascribitur, ac veluti inis quidam. De qua etiam ait Rursus nigra longè malignior ex quoque, quàm que naturalis redditur. Pariter 2. de crassibus cap. 12. ait Crassum verò sanguinem, ac veluti sex, quando immo die calidum exaruerit, atra bilis fit, & alibi ait monstratum nanque est, quod crasso sanguine nutritur.

Prima atræ bilis species ex picuita adscititia accedit, ut iam dixi cap. 10. atra bilis fit, dum ex ipsa putredine quod autem in salem mutatum est vim, ac speciem, id itaque præter naturam est, cum quod ex vitio non naturalis calor acrimoniæ ascribitur, ac veluti inis quidam.

Cap. 10. De bilis præter naturam, de cinere scriptum.

De bilis præter naturam, de cinere scriptum.

De atræ bilis, Gal. 2. aph. 43.

In tractatu de febre quæ 1. m. 2. De non facit.

1. Mense 12.

ritus, qui veluti limus purioris est, facillimeque nigra bilis efficitur: id idemque etiam ipsam melancholicum, sine atrum appellamus excrementum. Ideoque discrimen inter melancholicum excrementum, & atram bilem nobis posteris prodit. Quoniam igitur non concrevit atra bilis ab atro quidem sanguine distincta est, non tamen iam, & ab his, quae propriè nigra nominatur. Nam & talia sepius eorum vomuntur, & deieciuntur, quae excrementa melancholica, & nigra ab atra bile sanè quàm plurimùm non solum facultatè abradunt, atque terram ferèrèdante acidissima sed qualitatibus quoque ferèrèl-
bus differant, quippe haec atra bilis acidissima neque acerbitate, neque acore, vt melancholica manifesta participat, cum bilis atra non galls, ingentissimè aciditatis ipsam vomentibus, tam olfactu recti, seu sedi odoris non illis solum, sed alijs astantibus quoque immoretur. Quod si de melancholia non asserendum venit: quia ne terram quidem excrementa nigra melancholica fermentant, vt illa atra bilis. Caterum ibidem vide hæc duo discrimina, à Galeno statuta, ac etiam à Pelope suo præceptore antea explorata: Quando quidem atra bilis ita maligna, & exitialis, vt combusta se habet, vt non nisi hominem interi scire valeat. Hinc nos docet Galenus eum humorem à principio morbi strenuè nos purgare deuiçit, Nam si id de melancholico fucco etiam statuere incipit, qui non ita exitialis, ergo eò magis de atra bile idem intelligitur, cum dixerit. Caterum de atra bile, quæ longa experientia mihi certo cognita, comperitaque sunt, nunc addam profuturâ ipsi, qui medicæ artis operibus studeant, omnes enim quotquot ex melancholico humore sunt affectus, statim inter iniuria, strenuè purgans talem humorem euacuantibus crescere prohibebit. Caterum quoque hæc atram bilem tetigit Galenus vbi ait atram ex sanguine crasso igni nigri, eamque nique corpus nutrire possit, neque denovo in sanguinem converti, cum id, quod dulce, pingue, leue, suauisque crassi sanguinis est, omnino iam ex halatum sit, atque omnino terreum cinerulentum, simulque fuliginosum manferit. Tertia verò atra bilis species ex sanguine quidem crassiori sit, qui vel supra modum affatur propter vehementem caliditatem, quia vt etiam 3. de sympt. caus. cap. 3. fol. 28. B. ait Galenus, omnino ex immodicè cocto sanguine, & feruente rebus cinis quidam nigra bilis efficitur, vel qui transfundatur, atque in alteram naturam transit sanguis cum putrefactum, vt etiam antea, expositum pars tenuior sanguinis sit flava bilis, alia vero sanguinis crassior pars iam putrefacta, nigra, & adusta bilis quidem quadit, atra bilis appellata, quæ tertia species modò in delineatione quartæ species eò magis patebit. Quandoquidem quarta ipsa species atra bilis ex bile certè adusta exurgit, ait enim Galenus. Gemina verò bilis ex illis generatio, nempe vel flava bile supra modum exulta, affataque, vel crasso sanguine supra modum affatur propter vehementem caliditatem, & postea habet flava etiam bilis quandoque in atram conuertitur, cum affata fuerit, nec non etiam inquit. Et item est prodium de generatione huius humoris, quæ duplex est, iam ex sanguine crasso, tunc etiam flava bile vehementer affata. Subinde verò inter utranque bilem comparationem statuitur, vt etiam fecit lib. de atra bile cap. 3. inquit, Nilio verò hæc præfata perniciosa censenda est ea bilis atra, quæ à flava superaffata progignitur: quanto nimirum & humor humore effacior est, neque flava bilis, quæ ea, quæ sanguinis veluti subsidientia existit, &c. Subinde ait, Hæc igitur atra bilis à flava bile exulta orta aliquando malefica est, quæ derodit partes, in quibus abundè collecta est, alia verò atra mitior, quàm hæc est. Verùm mihi notatu dignissimum esse innenio ex Gal. vt alibi quoque iam dixi, humorem utranque à calore putredinali in cinerem iam redditum, adhuc etiam actum calefactum, causam esse efficientem non potredinali faciendæ in ventura pceditione, hinc etiam accessionis anticipatio causari, si per sudorem foras humor adpositum non eueritur: sicuti in oppositum, si cinis actu calefactus non fuerit, tunc paroxismi post positionem materialis seque per utique effluere potest. Cum cinis illa bilis adusta commixta sit vna cum bilioso flauo humore predominante, sua natura frigida, & pigra: Cum humor biliosus ab atro potius retardatur. Ideo nos docendo Galenus ex Hippocrate quomodo in quantam differantur esse febrem continuam quoties intermittat, præbendæque per errabilem modum secundum antepositionem, aut postpositionem. Ait. Quantum enim humorum febris alium tempore per febres continuas, ac desinit in atram bilem, quod ammodo resistit illi, proinde quæ calore febriifico agerèrèdatur, maxime quoque sudores superveniunt, ac ibi anticipatio non fit. Sed si non ante naturâ quod ammodo excreverat, veluti cinerem vehementer affaturum humorum, bis rursus permanent in corpore, & calefactus putrem quendam recipit affectionem: Idque quoties et acidum feruendo excitat febrem: hinc etiam accessionis anticipatio fit in febre, & quæ rursus eadem febre pariter cum eo quod febricitat atra bilis exuans: tunc rursus alia reliquia feruente rursus alteram excitant febrem: et cognitur nondum vna habere omne corpus affectionem, sed atra bilis in quibusdam partibus insuper mouetur, in quibusdam immota maneat non lerefcente, immo pigra in alijs putreat, aut feruere incipiat, inordinatas febres fieri necesse est. Ex quibus patet quomodo atra bilis, ex flava bile orta etiam in febre terrena possit esse causa efficiens anticipations, & causa materialis postpositionis. Caterum Galenum inuicem dixisse, sanè in atra bilis sit ista species etiam vitæ illa subinde vertitur, quoties ipsa quoque igneo percossa est calore, nec tamen quinta atra bilis species constituenda censendum est, cum vigilina ex flava fiat.

De un bile, 3

De un bile 39

B

Causa de viti-
tatis motu
1000 30

1. Porzhu de

1. Porzhu de

1. Porzhu de

1. Porzhu de

1. Porzhu de

1. Porzhu de

1. Porzhu de

1. Porzhu de

1. Porzhu de

1. Porzhu de

1. Porzhu de

1. Porzhu de

1. Porzhu de

1. Porzhu de

1. Porzhu de

1. Porzhu de

1. Porzhu de

1. Porzhu de

1. Porzhu de

1. Porzhu de

1. Porzhu de

1. Porzhu de

1. Porzhu de

1. Porzhu de

1. Porzhu de

1. Porzhu de

1. Porzhu de

1. Porzhu de

1. Porzhu de

1. Porzhu de

1. Porzhu de

1. Porzhu de

1. Porzhu de

1. Porzhu de

1. Porzhu de

1. Porzhu de

1. Porzhu de

1. Porzhu de

1. Porzhu de

1. Porzhu de

1. Porzhu de

1. Porzhu de

1. Porzhu de

1. Porzhu de

1. Porzhu de

1. Porzhu de

1. Porzhu de

1. Porzhu de

1. Porzhu de

A

CAPVT XIII.

De succis nigris medijs inter melancholicum naturale excrementum, & inter atram bilem existentibus.



*V*trum inter atram bilem exactam, acque melancholicum excrementum, & alij nigri humores non dum in atram bilem exactam conuersi hercle dantur ex Galeni obseruatione, quos refert se uidisse illo tempore pestilenti excretos egrorum salute, qui partim adusti erant, & de quibus etiam alibi dixit, inquiens: Ita autem hoc loco accipi volo melancholicum humorem, ut qui non dum exquisitè in atram bilis naturam transferit, sed in quodam sit confusio consistens, & quidem pro varietate humorum, in quos conuertitur sanguis febres sicut sola malignitate, & non malignitate differentes ut in tumoribus, qui carbunculi appellantur contingit. Et antea dixerat sic ergo & quicunque per calidam, siccamque intemperiem sunt morbi, ut ardores causæ crassum, atrumque sanguinem reddunt. Simile quoque in affectu longa hæc prolixiore æstate pestilentia oritur, nec paucis eorum, qui seruati sunt, nigrorum distorum exceptio per inferiorem ventrem scibat die maxima ex parte, vomo, vel seipsum, vel undecimo: Quosque nigros succos in tres differentias secando, prout magis, seu minus hi succi de atræ bilis naturæ participant, ait. Quorum etiam ipsorum complures differentia apparebant: quippe cum aliqua ad atram bilem proximè accederent mordicatione, retroque odore: quædam verò ne mordicationem quidem, nec sedum odorem in deiectionibus haberent: multa verò quoque inter hæc media consisterent, quia, quadamtenus isthæc mordicabant, partimque male oliebant. Quibus verò ægrotantibus excretio per inferiorem ventrem haud talis scibat: ij corpus totum pustulis, quæ nigris exanthematibus similes essent, circum undique scituit, interim quoque, & veluti squama decidebat: siccescentibus nimirum ipsis, evanescentibusque Caterum paulatim pluribus post crism diebus. At qui putam, ex allamque, atram bilem deiecerunt, omnes periire: talis namque assatum sanguinem esse indicat.

De atra bile c.
1. & c. 4.
a. De d. feb. 9.

De atra bile c. 4
B

Ibidem.

CAPVT XIV.

C Quatuordecim atræ bilis species esse, quatuor enim simplices allatæ, decemque ex ijs quatuor compositæ: Quadraginta & duo verò species succorum nigrorum inueniri, demonstratur.



*Q*uatuordecim atræ bilis exactæ species, quæ ex his simplicibus quatuor componi valent, decem utique adesse intrespicio: nam aliæ omnes quatuor componuntur, aliæ verò ex tribus, ac hæc certè tres reperiuntur: quandoquidem interim ex sanguine bile flaua, & melancholia, interim ex sanguine, bile flaua, & pituita, interim ex bile flaua pituita, & melancholia perasatis constringitur. Interdum verò ex duobus tantum formatur, quandoque etenim ex sanguine, & bile, aliquando verò ex sanguine, & melancholia, nonnunquam verò ex sanguine, & pituita: vel ex bile, & melancholia, aut ex bile, & pituita, seu denique ex melancholia simulque pituita commixtis: qui utique decem modi generationis atræ bilis exquisitè existunt compositi, quibus additis alijs quatuor simplicibus omnes quatuordecim erunt modi.

D melancholia, nonnunquam verò ex sanguine, & pituita: vel ex bile, & melancholia, aut ex bile, & pituita, seu denique ex melancholia simulque pituita commixtis: qui utique decem modi generationis atræ bilis exquisitè existunt compositi, quibus additis alijs quatuor simplicibus omnes quatuordecim erunt modi.

Cæterum quot modi sunt essendi atræ bilis exquisitè, tot etiam modi essendi cuiuslibet speciei harum trium differentiarum allatarum, succorum nigrorum.

Quoci-

ca

ipsorum humorum, qui nigri à Galeno appellantur quadraginta duo modi essendi censentur.

✠

CAPVT XV.

Quatuor in corpore humano cruditatum regiens, loci ille sunt. Primusque locus explanatur.



Vm mea in hoc opere omnium cruditatum, recte curandam, cuiuscunque corporis partis doctrinam vniuersam, aequè tum morbis curandis, tum lassitudinibus tollendis inferuentem, tradere interfit. Hinc harum cruditatum habitus essentia, causis, ac instrumentis simul, nec non generibus, differentiis, ac

que denique speciebus omnino exploratis; superest, ut earundem cruditatum locos, quibus hæc insesse solent, simulque pco vt in ijs locis sint, nostrum corpus corporis naturæ summa providentia cruditarum copia colligitur, potissimumque copia pituitosorum: quia in ventriculo procreatur. At vetò cum hæc cruditates crassæ, viscosæ, & lentæ sint, ideo facillimè ob angustiam capillarum venularum venæ portæ mesenterici, & loci, qui circa hepatis conspiciuntur, priusquam ad hepatis ipsum perueniant, retineantur in istis magnorum sinuum, quæ super cibum ob foramina cribri angustia transire, seu descendere nequeunt, permanent.

A mesenterici namque angustissimis capillaribus venis cruditarum copia ita retinetur. Cum mesentericon veluti cribrum, & vis sit, per quam iecur à ventriculo chylum in sanguinem conuerrendum, vt arbor à radicibus attrahit, vt Galenus fassus est. Cæterum ipsius cruditarum regionis primæ Galenum meminisse inspicias, cum de promptucrio Malum nempe sanguinem in pituitosum, & crudum qui in primis maximè venis circa iecur, & quod mesentericon vocant colligitur, & postea aliquibus interceptis verbis habet, qui in primis venis crudorum copiam habent deinde

verò inquit simplex illud quo ad cruditatis abundantiam, qua in primis est venis. Alio in loco autem medicinalibus archæuicis consignauit. Si enim ubi in primis venis crudi succi copia est. Denique posteritati conducit, inueniens, ut circa iecur, & primas venas de cruditarum pituitosorum copia loquendo, qua in primis venis, qua scilicet circa iecur, & mesentericon sunt. Cur autem venæ portæ propagines in mesenterico repositas, ac etiam in hepatis cauo residentes, amul

lis venæ caue in hepate ipso existentibus per crucis modum annexas, simulque venam ipsam portam; primas venas Galenus vocauit, facile est intelligere. Quandoquidem quoad sanguificationem ab hepatis parenchymate celebrandam primæ appellatur venæ tum quatenus sanguis primam rubedinis dispositionem à venis ipsis mesentericis per consensum ab hepate recipiat, tum eo, quod etiam primò chylus sanguificandus in ijs venis venæ portæ reperitur, per hepatis cauum suum iter efficiens, subindeque secundo sanguine, in iecinore iam iam facto per hepatis gybbum, ad venam secundam cauam appellatam, sanguis ille peruenit, ac postea ad totum diffunditur corpus. Quocirca vena caua, seu domus se habet, venæ verò primæ, veluti portæ quidem et estimatur, per quam materia sanguificationis hanc venam cauam, tanquam domum nutrimenti corporis nostri ingreditur. Venarum autem venæ portæ capillarum, ac extremarum partis concaue hepatis meminit Galenus, Simarum partium venæ ab ea, que in porta exoritur in tenuissimas extremitates finitur, & paulo antea dixit obstructions à crassæ, & viscosæ humoribus spirituosæ, seu flatuosæ distentiones, idque in extremis vasorum partibus, qua ex vena ipsius portæ exoritur. Verum perpende sub tatione illius pri-

mæ regionis cruditarum etiam primas ceterè vias omnes, quæ vasa non sunt, comprehendit in ventriculo existentes, pancreo, ac etiam illa prima cauitate inter ventriculi fundum,

& pancreon iacente, quæ per venam azigos expurgantur, ac per vnam. Hæc autem cruditates in hac regione adsunt, seu in corporis centro, aut profundo, vel veterata, seu recentes fuerint,

✱

Prima cruditas regio iecoris, seu profundo corporis nostri laborum, nempe prima vixque etiam prius venæ non iecur caput facit.

Malum sanguinis generationis factum, nempe, pituitosa crassa.

Prima cruditas regio ois cauitatis, cuiusque venæ sunt venæ portæ, in corporis centro repositæ.

Et cum prima cruditatum distans regit.

In prima cruditatum regione de venæ ois venæ portæ, & vñ tribus de causis nec omittit, adiacet.

A

B

Lib. 3. de magis ratione sanguinis c. 3.

4. De locis c. 3.

4. De vena c. 3. lib. 3.

4. De vena c. 3. lib. 3.

4. De vena c. 3. lib. 3.

4. De vena c. 3. lib. 3.

4. De vena c. 3. lib. 3.

4. De vena c. 3. lib. 3.

4. De vena c. 3. lib. 3.

4. De vena c. 3. lib. 3.

4. De vena c. 3. lib. 3.

4. De vena c. 3. lib. 3.

4. De vena c. 3. lib. 3.

4. De vena c. 3. lib. 3.

4. De vena c. 3. lib. 3.

4. De vena c. 3. lib. 3.

4. De vena c. 3. lib. 3.

4. De vena c. 3. lib. 3.

4. De vena c. 3. lib. 3.

4. De vena c. 3. lib. 3.

4. De vena c. 3. lib. 3.

4. De vena c. 3. lib. 3.

4. De vena c. 3. lib. 3.

4. De vena c. 3. lib. 3.

4. De vena c. 3. lib. 3.

4. De vena c. 3. lib. 3.

4. De vena c. 3. lib. 3.

4. De vena c. 3. lib. 3.

4. De vena c. 3. lib. 3.

4. De vena c. 3. lib. 3.

4. De vena c. 3. lib. 3.

4. De vena c. 3. lib. 3.

4. De vena c. 3. lib. 3.

4. De vena c. 3. lib. 3.

4. De vena c. 3. lib. 3.

4. De vena c. 3. lib. 3.

4. De vena c. 3. lib. 3.

4. De vena c. 3. lib. 3.

4. De vena c. 3. lib. 3.

4. De vena c. 3. lib. 3.

4. De vena c. 3. lib. 3.

4. De vena c. 3. lib. 3.

4. De vena c. 3. lib. 3.

4. De vena c. 3. lib. 3.

4. De vena c. 3. lib. 3.

4. De vena c. 3. lib. 3.

4. De vena c. 3. lib. 3.

4. De vena c. 3. lib. 3.

4. De vena c. 3. lib. 3.

4. De vena c. 3. lib. 3.

4. De vena c. 3. lib. 3.

4. De vena c. 3. lib. 3.

A

CAPUT XVI.

Secunda regio cruditatium promulgatur.



Alter autem cruditatum locus hercle medius est inter profundum, seu centrum corporis nostri, æq; inter superficiem, siue altum, nimirum in tota vena cava, ac in eius omnibus propaginibus; quæ regio, & genus vasorum venosum, & vasa, & sinus generis venosi à Galeno quidem appellatur. Ait enim in venoso vasorum genere apparere subesse illi copiam semi crudorum succorum, & postea inquit. Quæ enim hanc febrem nempe ardentem faciunt causa in venoso genere.

Existentes & alibi. Quoniam venosi generis febres sunt passionis & alio in loco exarat cuiusmodi enim sanguis sit, qui in vasis continetur. Vbi etiam depromit an intra venarum sinus malos succos continetur. Denique scribit de vrina omnino cruda, quæ habetur veluti disperata concoctionis accedens, quæ talis est venosi generis passio: nempe sinus venosi generis, vt alio in loco declarauit his verbis,

Ban intra venarum sinus. In hac autem regione omnimoda cruditas quidem fit: tum pituita; tumq; aliorum succorum, cum vena cava suis propaginibus per omnes corporis partes alendas extendatur, cuius cruditatis vitio; meminit Gal. vbi ait, quod in vasis sanguinis cruditas accidit, & de tuenda san. c. 4. ait tertio ab his loco eius, cui totus sanguis impurus, excrementosusq; est, nempe pituitosus, qui talis est per pituitæ commixtionem, sicuti etiam biliosus, & melancholicus, & serosus est per excrementum sanguini commixtum 6. epid. c. 2. t. 83. At verò hæc quidem regio, quoad latitudinem, in tres scatur partes. Alia namq; venæ caue vasa lara, & magna, cordiq; propinqua, alia verò angusta à corde longinqua, alia verò inter vtrunq; media conspiciuntur: Ceterum venulæ angustiores, ac extremitates, in quibus sua angustia facillime etiam line magna copia; immo tantum crassitie, viscositate, simulq; leniore excrementorum obstructions confluant, eū in carne dispergantur potius quidem ad tertiam cruditatum regionem spectant, quam ad secundam, de quibus ait Gal. vbi verò in extremis venis, & corporis habitus residit, & concoquendum, pariter, & per habitum resoluendum. Ceterum quia tales extremitates, & angustiores venæ, vel carnis musculorum, vel glandulæ contingere possunt, vel carnis viscerum; hinc eò quia frequentius obstructions in venulis viscerum effici solent. hinc ait Gal. Ergo & obstructions in iecinore, liene, & renibus facit, maxime quibus in his visceribus vasorum exitus angustior natura sunt. Verum de ijs, qui in hepatis gibbo sunt, postquam exarauerat de extremis venolis vena portæ in cauo hepatis residentibus, vt iam c. præcedenti ostensum est, inquit. Ad eundem locum alia quoq; venarum extremitates à cœca vena in gibbas viscera partes distributarum perueniant.

Secunda cruditatum regio sinus est venosi generis totum venæ causæ quæ vasa solida de quibus exaratur de eorum morbo dicitur sanguinem probo lambitur

Sanguis impurus, seu excrementosus, biliosus, melancholicus, seu acribilis, & serosus est, tum quoq; de pituita, qui propriè molles dicitur, vt sanguinem pituita coacta est, & quæ excrementosus & impurus est.

4. De ven. sin. c. 4.
4. Aph. 6.
3. De crud. c. 7.
4. De ven. sin. c. 4.
1. De crud. c. 4.

4. De ven. sin. c. 4. & de mor. sin. c. 4.
3. De symp. c. 50.
6. 1.
30. De symp. m. locut. c. 12. 7.

4. De ven. sin. c. 4.
4. 9.

3. De ven. sin. c. 7.

3. De locat. c. 6.

CAPUT XVII.

Tertia cruditatum regio tangitur.



Terminus autem cruditatum locus, caro quidem est, in cuius porositatebus, seu spatijs cruditates colliguntur; dum hæ cruditates à genere venoso in carnē ipsam ingrediuntur; ipsæque spatia, seu porositates eas etiam implent. In hac autem regione, tum partes solida, tum species carnosæ vtrique comprehenduntur suis capitibus vculis iunctis, siue in carne, siue in porositatebus, aut spatijs, meatibusque inter venulas existentibus, fortassisque in ossibus, ac in ossium medulla,

Druditatum copia fuerit, quæ fortassis per medullam ad ossium capita deferretur, ac ad iuncturas, hinc etiam forsitan ad dolorem artritidem vocatum parere valet, per ossium lacerando. Præterea et vltra carnis tum partium solidarum, tum speciei carnosæ spatia, & porositates quoque (vt iam dictum est c. præced.) venulæ extremitates venæ caue, quæ ijs partibus insunt, in hac tertia regione, reponende sunt: quibus etiam sine cruditatum copia obstructions inscuntur. Eamque sanè ob causam hæc extremitates venulæ in hac cruditatum regione vnâ cum carne habitus corporis comprehendendo, ait. Vbi verò in extremis venis, & corporis habitus residit, & concoquendum, pariter & per habitum resoluendum. Vnde alibi, dum inquit. Eilo igitur crudifucci copia in solidis animalis partibus, non in venis, ibi quidem per venas non exiguas, nec extremitates, veluti porositates se habent, intelligit: immo venas sinus generis venosi secundæ cruditatum regionis intendit. Quod autem Galenus hanc tertiam regionem in speciem carnosam, ac in partes solidas secuit, colligit, vt etiam alibi dixit, tum ex carnosæ speciei, tum solida ipsi corporibus compleuit, & postea habet solidorum verò generi ex solido nutrimento carnosæ generi. Ergo hæc tertia regionem modò carnem, modò corpora solida nuncupauit, cum exararet excrementorum, quæ in carne consistunt, & subinde ait, & in solidis mordaciaz antea verò dixit, & in carne continetur, & postea habet. Deinde eius, qui in carne succo residet. Deniq; verò, vt antea vidisti, depromit, crudifucci copia in soli-

Tertia regio est caro, quæ in partibus solidis tum in speciem carnosam secuit.

4. De ven. sin. c. 4.
4. De ven. sin. c. 7.

31. Meth. c. 1.
4. De ven. sin. c. 4.
4. De ven. sin. c. 4.
4. De ven. sin. c. 4.
4. De ven. sin. c. 7.

TOMUS Tertius.

C dis

A autem cuncta explanare volui, vt omnino cuiuscunque membri tertix cruditarum regionis natura elluceat, circa eas recipiendas, ac retinendas cruditates; vt his satisfactis, mox facilius easdem æquè tum dignoscere, tum curare valeamus cruditates. Ne vlla doctrina nostrum id promptuarium singulæ cruditatis rectè dignoscendæ, rectèque curandæ, deficiat.

C A P V T X V I I I.

Quarta cruditarum regio exploratur.

Gal. lib. de inap.
quod in ap. 2.
lib. 1. de men.
fam. 2. 39. de lib.
Gal. de crit. de
vitiis resp. lib.
de p.
4. de men. fam.
6. 4.



Vartus autem cruditarum locis vtique corporis nostri super facies, seu elcircumferentia, seu alior regio à profundo contradiſtincta conspicitur; nimirum cutis, quæ porofitatis, seu mearibus prædita est, per quos sudores milijformes efflorescit, nec non humores tenues biliosi egrediuntur: Neque mihi obijcere poteris, si asserueris, hanc quartâ cruditarum regionem à tertia allatâ, non fecari, cum Gal. deprempſerit. Non est igitur abundantia eius laſſitudinis, quæ vlcereis sensibus præſert

Dubium, si vi-
deatur curis nec
ita regionis ef-
fe.

B causa immo humorum, quæ in cute, & carne continentur ac rimonia. Nam etsi caro, seu partes solida, & cutis simul vt partes icotentes vtletis sensum, nepe à crimonâ, & mordicatione æquè percipiât. Vnde in relatione ad laſſitudinē vlcerosam videtur eo io loco Gal. hanc quartam regionē à tertia non diſtingui. Nihilominus ibidem Gal. & in relatione ad hunc sensum vlcerosum eam ab altera scionxit, dum ait. Qui igitur vlcereis sensum facit, incipiendum enim ab hoc est, motus quidem grauem excitat sensum, seu corpus vlcereatur: idque vel circa cutim tantū vtique, quom est moderatior, vel circa subiectam illi carnem, quom est valentior: vel circa vtrang. quom ad huc est atrocior: Proinde harū quoque regionum curationes agendas sibi proponendo, vnius regionis curationē ab alia segregauit, nobis posteris ita tradendo. Prius verò eius, qui exigunt, & iuxta eam est, enatio dicitur. Deinde magis, qui in carne refidet. Si ergo in relatione ad laſſitudinem vlcerosâ hæduſ regiones diſſonât, cōmibus absolutè quoque diſſinât, vt re vera ita se res habent. Inter aut succos acres, & mordaces à cute reſidētes, ichores qdē, seu ichoroides humores cuti subſiſt, seu iſūt, vt ex Hip- & Gal. habet.

Solutio.

4. De men. fam.
6. 4.

2. Epid. lib. 1. 4.
2. 4. de p. 2. 4.
2. 4. de p. 2. 4.
2. 4. de p. 2. 4.

C A P V T X V I X.

Varias cruditates acres, & mordaces tertix, & quartæ cruditarum regionis, diuerſiſque in locis, variaque copia peccantes, per sympathiam ab hepate, affectus varios parere quoque poſſe, demonſtratur.

C Aeternum pro vndique hoc noſtro decorando promptuario, omnes ſcire oportet variatates, quibus acres ab hepate orta cruditates, diuerſis modis, per diſtinctam partiū sympathiam, varias procreare valent affectiones. Nam ſcienti antea per sympathiam à vetriculo, & à cerebro varias obnoxias eſſe partes exploratam habui, hioc et diuerſos gigni poſſe affectus: ita etiam modo idē, quod per iccinoris originē, & primum conſenſum oriri valet, inuenire maxime congruum erit. Quâdoquidem ait Hip- & Gal. vt varios proſignat morbos, varius humor acer, & mordax, prout bilioſus, amarus, seu bilioſus, acidus, aut melâcho- licus, aut acer pitoſoſus, & mordax, inſuper vt calidus, ſiccus, craſſus, aut tenuis, nec non copioſus plûs, & minûs, per ſeq. ſolus, vel alio deteriori, vel ſalubriori commixtus. Vterius in co, vt vel in ſolido corpore, aut in ſpecie carnoſa, vel in cute, aut in extremis venę cauę, seu portę ramulis capillaribus reperitur. Præterea ſi in corpore ſolido, vel in principali mēbro animalium ſcūtati, aut viralis, puſſatilis, ac irafcibilis ſcūtatis, vel altricis virtutis, aut proliſcę ſcūtatis, aut in membro non principali, ſed in membro principalibus partibus, & ſubordinato, ac inferuiente, aut ſeruiente præparatoria vt in pulmone, vetriculo, & vaſis ſpermaticis, ac paraſtatibus, vel ſeruiente latoria, vt in virga vici, in neruis ſenſus, aut motus, aut vtriſq. vel io tunicis venarum, vel arteriarum, aut in membro ſolido, neque principali, neque principalibus ſubordinato, immo dum

Hip. de ſtrobil.
2. 4. de p. 2. 4.
2. 4. de p. 2. 4.
2. 4. de p. 2. 4.

D taxat ijs principalibus deferuiente, vt ſuor membrauz, seu paniculi, cutilaginez, ac tēdones, ſi u chorde. Eſti in ſpecie carnoſa, vel viſcerum, aut muſculorum, aut glandularum, vel tandem in adipe, seu pinguedine: Quatenus dico, quod humor talis varius in plaribus locis ijs diuerſis exiſtens, copiaque etiam diuerſa peccans, varias funções impediens, varios quoque affectus herede efficere poſſet: cum iecur per eius veoz cunctis corporis humani partibus facillimè eos humores acres, & mordaces, ab eo genitos tranſmittere valeat; pariter idē ipſen ſacere patet: Vnde ex quo Hip. pteuicam non niſi alterius acris, & mordacis humoris à iccinoris calore ingente geniti, commixtione a bradere, vlcereque, & mordicare poſſe aſſeruauit, inquit, Pinita namq. acris humoribus permixta, ubi in loco minime aſſueta irruerit, ea exule erat, cum ibi ſupra dixeret. Vbi igitur ad venter uenerit, y laborat, ſi ad aures, ubi morbus eſt, ſi ad naves: grando exoritur ſi ad peſſus r. mēdo appellatur. Vnde poſtea inquit. Cum verò ad ſauces teneras, ſi fluxu ingruat, eas exaſperat, & exinde ait. Quibus ita ſe habentibus ſauces exulcerantur, exaſperantur, & incenduntur, calaſſa verò humorem ex capite attrahunt, caput autem riuſus à reliquo corpore aſſumens ijs tranſmittit: cū igitur

Lib. de ſtrobil.
2. 4. de p. 2. 4.
2. 4. de p. 2. 4.

Idem.

Idem.

Tomus Tertius.

C 2 hunc



DE CRUDITATIBVS RECTE DIGNOSCENDIS,

RECTEQUE CVRANDIS.

LIBER SECVNDVS.

In quo

Cruditatum, & regionum earum compositiones co-
numerantur, ac diluuntur.



CAPVT PRIMVM.

Generum cruditatum compositiones traduntur.



A
Aph. 15. & b
de mor. san. 4. 7.
& 1. de diff. lib.
6. 3.

Voniam simplicibus rebus res compositæ naturæ, & doctrina posterio-
res se habent Cruditatum itaque simplicium generibus differentiis,
speciebus, & omniq[ue] regionibus iam satis explanatis, superest horum
compositionem statuere. Genus vero cruditatum duplex inspicitur.
Nam id vel ad modum generandi, aut ad eius naturam spectat: Si enim
primo modo, tunc tria vtiq[ue] cruditatum genera conspiciuntur: Quan-
doquidem per modum corruptionis cruditas in ventriculo exoritur,
ut bilis præsina, seu Zinaria est: interin per cruditatis modum gigni-
tur, ut pituita vitrea seu acida habetur: Interin vero per aduersionis

modum emrgit, ut bilis flaua, vel atra, aut melancholia, seu falsa pituita reperitur. Quocirca
alias primi, & secundi generis simul cruditas componitur: Hæ geminæ etenim cruditates faci-
le in ventriculi fundo, & progigni, & permanere valent, ut in vomitionibus apparent. Alias ve-
rò quoque ex secundo, ac tertio genere compositio fit, ut vomitiones nos monent, tametsi e-
tiam interdum horum omnium trium generum compositio pateat. Verum si secundo mo-
do cruditatum genus desumatur, tunc vel pituita, aut bilis aspera, aut bilis acida erit, in-
super vel melancholia, vel serosum excrementum, quæ omnia tunc in sanguinis missione, tum
in succorum purgatione conspicuè manifestata sunt, ut ex Gal. autoritate iam dictum est lib. 1. de
magn. morbi cacoeh. in sanguinis etenim missione ait Gal. omnes medici in vera scissione dicere so-
lent interdum serosum, inter dū melancholicum, aut pituitosum, aut biliosum nonnunquam, & natu-
ralem sanguinem effluxisse. De humorum autem eductione inquit sunt autem hæc omnia purgato-
rio medicamento, proprium ut abstrahere humorem appetente vel flauam, vel atrā bilem, vel pituitam, vel
aquosam superfluitatem, licet: cruda, praua, ac vitiosa tantū pituita præter naturalis, bilis amarāq[ue]
dum similiter præternaturalis fuerit, nec non atra bilis, quæ etiam præternaturalis se habet: At
verò melancholia, & superfluitas aquosa, cum naturalia sint, sua natura, non nisi multitudine,
peccare possunt. Ideoque solummodo de his prioribus succis fuisse verba scriptis mandauit, quan-
tenus isthæc praua sunt: cum autem hic, ne dum de prauorum humorum copia, ac verò etiam
de melancholia, & serosi recrementi superfluitate agere mihi ipsi in meorum ægrotantium vti-
litas gratiam) conducatur, proinde, inquam quandoque ex omnibus ijs quinque succis nimi-

Tomus Tertius.

C 3 rum

B
6. Epid. com. 1.
cont. 18.

1 Aph. 17.

rum ex pituita cruda, & bile amara præter naturali, & bile atra, melancholiz, & seroso excremento compositionem confurgere posse, aut quod ex quatuor vel tribus seu duobus succis, ex his humoribus allatis, compositio sortiri potest. Cæterum vnum tantum adnoto, hoc est, quod serosum excrementum, etsi sua natura prauum minime sit, ætamen in aliorum humorum omnium, qui crassi, glutinosi, lentique sunt compositione semper plurimi mali causa est. Nam si sua tenuissima qualitate ceu quidem vehiculum habetur, alios succos crassos prænartatos, ei commixtos in partes penitiores nostri corporis tertie cruditatum regionis angustissimas docens, ac inibi illi crassi succi morando putrescunt, ac tunc omnino serosa illa humiditas à calore putredinali consumuntur, illique humores putrefacti, ac in cinerem, & atram bilem iam conuersi, adhuc crassiores facti, non nisi difficultate posse educi possunt: quippe quod in quartana febre iam morbo determinato, solum hi humores per sudores dissolui posse videntur, vt Galenus falsus est. Quod equidem Illustrissimo D. Paulo Bragadeno contigit: Vnde hac de re duntaxat iure merito artem medicam Hippoc. his verbis illustrauit. *Qui à quartana arripimur à magno morbo non capiuntur: immo si capiuntur prius, moxque superueniat quartana, liberantur,*

Com. 1. prog.
pass. 17. & 1. ad
diff. feb. 1. vii. &
3. opid. cum. 17
pro. 177.
6. Epid. cum. 6.
cum. 7.

B.

CAPVT II.

De cruditatum generum, simulque specierum compositione,

Verum ne dum cruditatum generum allatorum, ac verò etiam specierum compositiones inuenies, cum non modò cruditates pituitosorum, ante sanguinis generationem oborte cum alijs cruditatibus aerium, & mordacium post sanguinis generationem exortis componuntur. Verum etiam ex cruditatibus tum pituitosorum, tum aerium, & mordacium, sub eodem genere repertis, compositio inuenitur. Cæterum generum horum cruditatum compositio pessimi quidem morbi causa est: vbi biliosus, amari, ac adusti succi copiosi quidem simulque crassi pituitosi, crudique etiam commixti fuerint: vt Gal. nos docuit, dicens. *Itaque morbi sunt pessimi, in quibus vtrique memorati succi abundant, quibus succedere demonstrauimus febrem semitertianam.* Hinc Philini Vxor, ijs affectibus obnoxia circa diem septimum obmiserat. Vigesimo verò obiit. Circa autem cruditatum specierum compositiones, cum ferè iocundit esse possint, ne tempus contectam, eas non tangam. Verum sicuti occasio postulat, in ægris curandis eas inueniam compositiones,

C
1. Epid. cum. 9.
cum. 17.

CAPVT III.

Cruditatum pituitosorum, ac mordacium differentiarum compositio perpenditur,

Ritum autem differentiarum cruditatum aerium, cum alijs tribus cruditatum pituitosorum differentijs, antea ex Galenus lengentia declaratis, compositiones nouem numero esse valent. Ponamus enim pro faciliore negotio E. F. G. esse primam, secundam, & tertiam cruditatum pituitosorum differentiam secundum accessum, & recessum à sanguine optimo, similiterque H. I. K. pro prima, secunda, ac tertia differentia cruditatum mordacium ponantur. His namque statutis alijs E. cum H. vel cum I. seu cum K. componitur, Alijs F. cum H. aut cum I. vel cum K. componitur, Alijs verò G. cum H. vel cum I. aut cum K. componitur. Nam A primæ regionis B secundæ regionis C & D. tertie & quartæ regionis cruditatum assignantur. Pituitosorum cruditatum differentie primæ E, secundæ F, tertie G. Mordacium verò differentie primæ H, secundæ I, tertie K assignantur. Quocirca hæ nouem compositiones repetiuntur: Quarum tertia, sexta, & nona deteriores sunt, quia tertia à sanguinis natura magis recedit, quàm prima, & secunda, ita pariter magis sexta, quàm quarta, & quinta: nec non magis nona, quàm septima, & octaua: Cæterum quinta, & sexta deteriores sunt alijs prioribus: tamen octaua, ac nona adhuc deteriores conspiciuntur quinta, & sexta: Ea propter in quatuorbus compositionibus audacius quidem sanguis educendus, timidus verò humores purgandi: sicuti in deterioribus totum in oppositum humoribus, vel turgentibus, tum propriè, cum non propriè, vt exposui lib. de magn. morbi cacoehyma, aut iam coctis, seu præparatis audacius purgandi sunt humores, timidus verò sanguis detrahendus.

D
Lib. 1. c. 1. illius
opid.

CAPVT IIII.

Regionum allatarum cruditarum compositiones elucescunt.



Quatuor autem hæ cruditarum regiones ita simul componuntur : Quandoquidem interdum omnes quatuor regiones componi apparent . Nonnunquam, verò tres tantum, & ita duobus modis, nam vel prima, secunda, ac tertia una cruditis obnoxie inspicuntur, aut excepta prima ceteræ omnes simul cruditis copiosis conqueruntur regiones . Aliquando verò duæ tantum simul componuntur, & hæ sex inveniuntur compositiones, vel namque prima, cum secunda affecta leditur, aut cum tertia, seu cum quarta, aut secunda, ac tertia cruditarum copia simul offensa sunt, vel secunda, & quarta, aut tertia, & quarta simul componuntur . Ea propter nonem vtiq; harum cruditarum regionum compositiones contingere possunt .

Finis Libri Secundi.





DE CRVDITATIBVS RECTE DIGNOSCENDIS RECTEQVE CVRANDIS. LIBER TERTIVS.

In quo

Cruditatum generum specierum, simulq; regionum notæ scien-
tificæ explanantur; Pro quo executioni mandando caput
quartum libri quarti Galeni de sanitate tuenda, ex alijs
Galeni decretis, autoritatibus, rationibus, ac ex-
perimentis ad verbum expressis,
dilucidatur.



CAPVT PRIMVM.

Primæ cruditatum regionis plures locos esse, à fontibusque quinque
cruditatum copiosarum notas certas colligi posse,
demonstratur.



Um autem cruditatum primæ regionis duo loci quidem introspiciuntur, **A**
sinus videlicet venæ portæ, qui iterum in hepatis canum, mesentericisque,
& lienis partis interioris capillares v. enas scinditur. Nec non cavitates ex
extra eas primas venas residentes, primæ quoque metiò viæ appellare,
siue in eo corpore glanduloso à Galeno Pancreo, & caliceo nuncupato
fuerit, siue in ventriculi cavitare, seu fundo, vel parietibus, seu tunica, seu
tunicatû fibris, aut in cavitare ea fuerit, quæ inter ventriculi fundû iacet
& in intestinis. Tamen in plerisq; cruditates copiosæ, in hac prima regione
existentes, in ventriculi fundo, seu in parte, & causa cruditatem pituitosetû generante inueni-
unt: Arque in mesenterico veluti in radicibus angustissimis iccinoris, ac etiam circa hepar, nem-
pe in iccinoris cauo à natura colligantur, potius quàm ad aliquam partem principalem fluant,
ut Galenus ratus est. Cæterùm ipsarum primæ cruditatum regionis, partium signa diagnostica
vtrique tradere teneor: sicuti etiam de cæteris alijs tribus regionibus, id ipsum tacere deinceps.
Cum autem à quinque fontibus non modò cruditatem in aliqua parte læsa malè coeunte ge-
nitam fuisse, ac rescidere; verùm etiam genitam fore dignosci possit: eum Galenus sedes læsæ
notas certas statuendo, artem medicam, his verbis, illustrat. *Nunc verò ea duntaxat, perstringâ,
quæ nostrò proposito magis accommodata videbuntur. Nam comperi læsas affliones non solum ob simi-
laret, à quibus eduntur agrotantes. Verùm etiam ob alias quasdam particulas, quæ licet afflioni non
habent, eum tamen quandam præflare videntur: sic etiam instrumentalium partium morbos, afflioni
nocentes deprehendi, quibus præcognitis, inveni deinceps continenter plurimos homines infestantes.
Quo circa primus modus dignoscendi tum cruditatem in aliqua parte genitam fuisse, ac imbi-
residen-*

Lib. de venar.
distictio, 1. dist.
1. 2. 3. 4.

1. De loc. aff. 1.
2. De loc. aff. 1.
3. De venar. sin.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10. Mich. 2. 3.

B
1. De loc. aff. 1.

A resisdentem, cum partem instrumentalem affectam esse, ex actione læsa facultatis coëctricis offensa partis organicæ alteratæ obnoxia, aut ceu partis intemperatæ simularis, aut veluti partis instrumentalis malè se habentis desumptus est, tamquam ex visu affecto nota certa, & scientifi-
ca acquiritur. Hinc ait Gal. ut a nocumento partis cruditate, ceu actione vitiata laborantis cru-
ditas ipsa dignoscatur tanquam partis, ea cruditate, imbecillitas reddita. Ceterum quoniam actio
læsa facultatis offensa, aut propter sedem illius actionis affectu per protopathyam suam, vel ob
sympathyam ab aliqua alia parte lædente esse potest. Ideo Gal. ait. Quippe vitata actione semper
investigare studebam, quamvis sedes, vel ipse affectus, vel alteri consentiret: quoniam eam invenisse,
& c. Præterea prædictis & atatem, & naturam laborantis, tum anni tempus, ac terram, &c. Postea ve-
tò illico ait. Peram superioribus duobus libris hunc præcedentibus, nisi fluxa admodum fuerit memo-
ria; didicisti affectus sedes quinque modis posse deprehendi. Næpe ab excrementis ex quibus atq;
ijs accidentibus symptomatibus, quæ affectus partibus adnascuntur, ut ex templi causa affectio lie-
ne intumescit, ventriculusque à liene lædatur, totumque corpus improbè nutritur, cum sanguis
à melancholico excremento à liene affecto depurari nequeat. Vnde in hoc modo etiam notæ à
positu, seu à situ partis læsæ cadit, cuius meminit Hippocrates, & Galenus. Item actione læsa,
quibus tribus modis committitur, & color præter naturam, qui in habitu corporis contingit affec-
tū aliqua parte, ut læso ventriculo color albus, affectio autem hepate color flavus, seu pallidus,
aut atiginosus sit, sicuti liene offensus color niger visu venis, & figura per figuram verò non mo-
dò vltimam delineationem partis mensuraturæ locatè intendit Galenus, sed etiam naturam, seu
spongiformem, aut solidam partis in situ aliquo residentis, ut etiam statuit Hippocrates, & ve-
iam lib. 1. cap. 16. istius operis dixi, cum dixerit Hippocrates partes intumescere ex figura naturæ
partium fieri. Eamque sanè ob causam natura læsa figuræ alicuius visceris, ut lecinoris, seu lie-
nis in ampliorem, durioremque figuram mutatur. Verum ad eam figuram ica præter natura
maiorē, ac duriorem percipiendam nobis signum diagnosticum à situ, seu à positu, tæcū manus
aequirendum desumptum esse debet. Vnde sæpè Gal. partis naturam substantiam, actionē, vñum
ae situm pro eodem accipit. Ait enim. Altera nempe cognitio per ipsam rei naturam, si quidem hec
tum cuiusque particule substantiam affirmabit, tum actionem, tum vñum, siquidem, à quibus præcedens,
non solum quod sanari non potest præiudicat: sed etiam quod recipere sanitatem potest de inveniendis ei
remedijs deliberabis. Addita tamen alia cognitione, quæ per experientiam acquiritur, cni longo usu
est opus. His namq; modis Gal. semper sedis affectus, eruditate generantis certas, ac infallibiles
invenit notas ex quo veluti doctissima quadam ambitione ductus, isthæc verba sæpè manda-
vit. Proinde primum investigavi, quomodo cognoscende partes offensa sunt, invenique earum quasdi
scientiæ à deprehendi posse notitia, nonnullas verò artificiosas vocata cōiecture, atque ideo ipsas ma-
gnæ ex parte rebus numerum certas, & scientificas fieri, Enimvero enim est artificiosa cōiectura vis.
Verum & has iostas, & dispersiones eis priores, quæ videlicet scientificam notitiam admittunt indigere
semper inveni alicuius partium notione. Itaq; medicinam professus vsq; ad senectutem nullam in
hodiernum vsq; diem calumiam subij, neq; curando, neq; præiudicando id quod celeberrimis quibsdam
medicis in erudum accidere meminim. Quod si gloriam quis ab artis operibus non à sophisticis sermionibus
affectu qui volueris in nullo negotio, facile compendio colligere poterit ea, quæ per omnem sævè atatem dili-
gēti inquisitione inveni. Idque sibi persuasum habeat hæc vna, & ratione morbos cognoscas, & remedia
invenias, utramque quidem scientificam, aut certè cōiecture quadam, quasdi participes artificij, &c. Hinc
totius curatini generis indicationem sumere simul remedium, & quantitatem, & qualitatem, & id-
oneam materiam invenire; Hæc habentur à Galeno, circa sedis læsæ, & cruditarum, ut morborum,
causarum, dignotionem. His autem consiliis prius cruditatis fundi ventriculi ex iam hæc-
tenus fundamentis exploratis, notas rectas eliciam.

Præterea modis
dignoscendis cru-
ditatem in ali-
quo loco reside-
ntem ab offensa
læsa facultate
coëctricis est sit-
u ex visu partis af-
fectæ.
Actio læsa seu
visu affectu, quod
per effectum aut
per cōiecturem
ab alia parte seu
a tumore.
Sed etiam modis
ab eac remota
causa.
Tertius modus
ab accidentibus,
quæ ex templi
causa contingit.
Quartus modus
ex a situ partis
læsæ.
Quintus modus
ex a parte natu-
ræ præiudicantem
seu figuratam
desumptum.

3. De sym-
ptom. c. 5.
3. De loc. affec-
t. c. 1.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.

De pñis medi-
c. ad c. 1. c. 2.
De pñis medi-
c. ad c. 1. c. 2.
De pñis medi-
c. ad c. 1. c. 2.

Lib. de pñis
medicinis.

3. Meth. c. 2.

Ibidem.

3. De loc. affec-
t. c. 1.

C

D

CAPUT II.

Cruditatum pituitosarum primæ regionis notæ rectæ ab actione ventriculi
vitiata hauriuntur. Quocirca de ructibus agit.



Ruditas itaque futura, nec non iam facta in chylicificatione vitiata, ceu in læsa vē-
triculi actione ex ructibus quidem deprehenditur: cum ructus non nisi chyli-
ficationis læsæ exhalationes sint. Vnde viles conspiciuntur ad actionem ventriculi
ipsam patefaciendam, quia Gal. ait per ructus, actionem & ventum chylica-
tricis facultatis ventriculi ipsam fore, indicare: sicuti per deiectiones cam actionem
nam ipsam fuisse nos dignoscere posse, statuit. Quippe quod Gal. statuit,
ructus plures, non modo cruditarum facultatis chylicatricis, cum factam, tum venturam osten-
dere. Verum etiam futuram ægritudinem denuntiare. Hinc ructus affici bonitatem, seu maliciā
exprimit, cum ex easo difficilis confectionis, improbi fucci, ac plurius excrementi quidem,
facillimè cruditas procreetur. Ructus namque de genere profectò spirituum, statimque
in su-

3. De vitiis crudi-
tatis c. 1. c. 2.
Lib. de arte pas-
tu c. 1. c. 2.
3. De aliis fac-
t. c. 1. c. 2. c. 3.
3. De aliis fac-
t. c. 1. c. 2. c. 3.
3. De aliis fac-
t. c. 1. c. 2. c. 3.

Ructus de aliis
c. 1. c. 2.

Ructus differe-
ntia.
Nidorosus ac-
tus.

Sumofus ructus
a quo calore
fit.
Acidus ructus a
quo calore
fit.

Sumofus ructus
fit nidorus? quo
modo generatur.

Acidus ructus
quomodo coar-
ctus & a quo.

Acidus ructus a
pituita acida vel
in ventriculo ge-
nitus vel in ore
hinc oritur.

Pyndus.

Est.

in superiore ventre genus est; inutilis, qui à ventriculo ad os mouetur, pro naturæ providentia inutilem rem expellens ex materia in ventriculo existente proditus. Cuius diffi-
cultatis sunt, ut vel nidorosus, seu fumosus, aut acidus, aut spiritus, seu salis habeatur. Nidoro-
sus autem ex ijs emergit, quæ facili coctionis, celerisq. corruptionis sunt, & à ventriculo calido, &
squalido, ac igneo, aut à parte instrumentali, seu à parte simulari intemperata adnascitur, cum
nobis posteris Gal. prodiderit. *Quibus biliosus humor, aut omnino præsum excrementum quodvis in
ventriculo sepe congeritur, in ijs, quæ natura cœli sunt facilia celeriter corrumpuntur: veluti homini-
bus, quibusdam, qui calorem naturæ habent non humidum, neque bene temperatum: sed squalidum,
atque igneum: hi enim, quæ alij facillimè concoqueris faciliè alterata ea corrumpant, ructusque eis ac-
cedunt omnino nidorosus.* Sicuti etiam fumosum ructum à calore ventriculi igneo, ac immode-
rato emanare Galenus affirmavit. Acidum verò ructum è conera ab imbecilio, frigido, ac in-
firmo ventriculo promanare asseveravit. Nidorosus enim ac fumidus idem prorsus est. Verum
ait nos distinguere debere, an nidorosus ructus, & actio ventriculi læsa simul fiat, vel ob intempe-
riem corporis ventriculi, ut parvis similis, vel ut à parte instrumentali, cui insit humor bilio-
sus, & an in in cavitate, aut in tunicis, aut in ore ventriculi inhaereat: & num quid is succus in
ventriculo genitus, an in hepate, an potius in eo uniuerso genere venoso, aut à corpore fluat: ut
ibi est Galenus perlegere. Ructus autem sumofus, nidorosusque, ut ab os utellaris sentitur,
indicat non bene cibos coctos fuisse, consequenterque chylicationem ad esse læsam, simulque
corruptam. Pariter aut de acido, quo ad actionem depravatam, non tamen corruptam. Nam
eorum in oppositum ructus acidus se habet. Vbi nanquæ est, ibi quidem actio læsa desit.
in frigida qualitate apparet, hinc etiam cruditas frigida, nempe pituita ab ægæne frigido pro-
ducta indicatur in ventriculi fundo, in quo etiam manet: Quocirca ructus acidus perpetuo
fallus est Galenus, pituitam acidam crudam significat, ex qua profluat; tamen si mala victus
ratione sine ventriculi quoque læsione promanare possit: cum Galenus de promerit. Si autem
superueniant acidum ructus. Quod autem ructus acidus fiat, & propter ventriculi frigiditatem,
& propter pituitam sæpius in eo acernatam, & propter ciborum multitudinem, aut si pauci quidem sint
potestate tamen frigidiorum. Ceterum inuenio utique acidum ructum etiam ex pituita acida
gigni, quæ prius in cerebro frigido cum genita fuerit, deinde ad ventriculi fundum descende-
re, inbique collecta, ut ex Galeno colligo, quæ quidem pituita postea ventriculum lædendo
causa esse valet, ut actio ventriculi propria, hoc est, chylicatio vitiata emergat: Proinde in
acido ructu distinguendum est, an ex pituita fiat genita in ventriculo, aut in cerebro: nam si in
cerebro prius ea fluxio à capite tollenda est, ut ait Galenus 7. meth. cap. 1. & cap. 2. Verum
fidus ructus, qui etiam à raphano fit, aut ex cibis malè olentibus, ac frigidis, seu ex corruptione,
& putredine putente cibi assumpti, aut excrementi retenti. Vnde ructus is crudam ætem putri-
dam, seu corruptam denotat: Sicuti ructus salinus ex pituita à capite iam defluxa, salisque, in
capite genita, & crassa exortus, pituitam in ventriculo existentem, & in capite obortam
fuisse ostendit.

A
4. De vitiis part. 8.
6. De vitiis part. 12.
6. De vitiis part. 14.

1. De alim. fac.
c. 6.

1. De temp. c. 6.
& 1. de loc. aff. c. 6.
1. De temp. c. 6.
1. De loc. aff. c. 6.
& 2. de vitiis in
ma. c. 2. 2. 2.
& 1. de sympt.
c. 1. 1.

B

1. De loc. aff. c. 4.

1. De sympt. c. 4.

1. De loc. aff. c. 4.

Gal. com. aph. 2.

2.

1. De sympt. c. 4.

2. 2. de vitiis in

ma. c. 2. 2. 2.

2. De temp. c. 6.

C

Lib. Gal. simi-
lano de sim. mor.
cap. 1.

1. De loc. aff. c. 4.

4.

De raphano &
8. p. 7.

C A P V T I I I.

Idem fit à mala victus ratione præcedente, & ab alijs tribus
externis erroribus.



Cibi. & potus
inordinatus cru-
ditatem mouet
fuit.

Itiatam autem chylicationem, hinc etiam consequi ex ventriculi crudita-
tem iam ortam fuisse ventriculo quoque sano, ac valido existente ostendunt
cibi, & potus incongrui præcedentes, seu in substantia, qualitate, vel quan-
titate, modo, tempore, ac ordine incommodo assumpti, ut ait Galenus, &
ut dudum dictum est capite ipso præcedenti: & lib. 2. istius operis capite 2. Vbi
demonstratum est errorem cœcum, ex quo vitiata chylicationem fieri
videmus, quadrimembrem esse, alter enim in excrementis, quæ in ventre habentur. Alius
in cibis, & c. Alius in tempore summi, aut summi exigui, quarum omnium rerum
etiam causas exposui, quibus alium externum addidi errorem, qui ex
nimio veneris sequitur vitiis ex quolibet enim horum externo-
rum errorum, chylicatio frustrari potest, cum
tunc à calore naturali cibi concoqui ne-
queant, hinc cruditates ne-
cessario utique c-
mergunt,
ut
iam viderimus dictum
est.

D

1. De loc. aff. c. 4.

& 1. de sympt.

c. 1. 1. de alim. fac. c. 6.

6. de vitiis in ma. c. 2. 2. 2.

1. De temp. c. 6.

1. De temp. c. 6.

CAPVT

C A P V T I I I I.

Cruditatum pituitosorum copiam, in ventriculo genitam, in primaque cruditarum regione collectam esse, ab excrementis exeuntibus: nempe ex deiectionibus pituitosis, aut pituitæ commixtis, elicetur.

De loc. aff. 24.
2. Epid. com. 3.
com. 44.



Excrementa verò quoque vitia sunt ad chylicationem læsam, simulque cruditatem in ventriculo genitam pacificandam, ut Galenus exarauit: Nam propriè ait deiectiones sua forma cruditarum, seu concoctionem eorum, quæ in ventriculo coquantur denotare: sicuti excrementa, in cerebro genita, per nares expurgantur: Et sicuti vitia concoctionem, seu cruditatem in hepate, totoque genere venoso iam factam ostendunt. Quomodoque ea, quæ per tussim excernuntur, ea, quæ in pectore, ac pulmone resident, manifestant. Ideoque si feces subalbidæ, seu defectæ inæquales, asperæ, hinc quidem congestæ non fuerint; existente pituita copiosa in prima regione, saltem una cum fecibus pituita mixta erit: præsertim si octo diebus pituita præparatio oximelle copiosè adhibito singulo mane iam facta, postmodumque iniectione enemate ex benedicta laxaria composito: Quandoquidem tunc una cum deiectione pituita copiosa oculorum intusione, glutinosaque certè tibi apparebit, ut semper infinitis meis ægris vñ venisse, exploratum habui: inter quos præsertim illustrissimus D. Paulus Bragadenus est, cui in quacunque tali deiectione iam præparata copiosissimam pituitam egressam fuisse unicuique, deiectionem intuspicienti, patenter notum est.

Excrementa cruda excrementa a cruda deiectione non sunt.

C A P V T V.

Idem ex pituitosorum vomitionibus colligitur.

De febrib. 12.
13. 14. 15. ad 1.
16.
17. Ad Glisc. 2.
18. & 19. de vit.
19. 20. 21. 22.
23. De symp. 2.
24. & 25.
26. Gal. com. 24. 25.
26. 27. Ad Glisc. 2.
28. & 29. de Sym.
mod. fac. 12. 13.
14. & 15.



Racilius verò longè hæ cruditates primæ regionis ab excrementis, per vomitiones exeuntibus, cerni possunt, quàm deiectionibus: Hinc non aliunde Hippo. inquit pituitam, hyeme genitam in ventriculo vomitionibus facillimè educi: nec non totum corpus ætate purgandum fiat, per ventrem superiorem fiat, cum facilius tunc administraretur, quàm per secessum. Insuper Gal. asserit cruditarum copiam primæ regionis, à vomitibus hercle eisdem copie cruditarum educit inuestigari, cum id, quod in vomitibus cernitur, in ventre manifestius sit. Hinc singuleus, & angor stomachi, seu morbus oris ventriculi fit.

C A P V T V I.

Cruditatum primæ regionis copiam, ex figuræ naturæ partis læsæ mutata à suo naturali statu deprehendi, necnon à situ, manibus tactu sedis affectæ colligi, ostenditur.

De pñis med.
de Gal. 1. ad
Glisc. 2.



A formatione autem, seu à figuræ, tum substantiæ, tum naturæ, simulque à magnitudine, & à situ sedis offensa primæ cruditarum regionis tales cruditates in primis residere vñ inuenies, ut ex Hippo. & Gal. iam patet, ut alibi fusè demonstratum est. In prima namque regione mesentericon, ac pancreon vitiosæ reperiuntur, quæ substantiam continent sua formatione, seu figuræ, vacua, molli, rara, non magna, compressionique facillimè cedente, velut spongia se habet. Proinde, ne dum à cruditarum crassitie, & viscositate obstructionibus læduntur, ut renes faciunt, qui duri, ac densi apparent. Verum etiam multò plùs à cruditarum copia facillè obstruuntur: Eamque certè ob causam his partibus à cruditarum copia repletis se cundum totam earum figuræ naturam naturalem, ne dum in venulis, ac porositatibus, seu spatia suis hæ partes repletæ, densæ, tumefactæ, magnæ, duræ, compressionique nihil cedentes necessariò iam lædè crunt. Vltèrius etiam his cruditatibus earum partium calor nativus suffocatur: Vnde intemperatæ, ac imbecillæ euadunt, quippe quòd interdum contingit, ut à suo naturali calore imbecilli, cruditarum pars tenuior resoluta, manente parte crassiori, ac viscosiori, hæ partes lapidescant, ac tumore scintillo concitentur: Quocirca hæ cruditates facillè tunc tactu manuum percipiuntur.

C A P V T

CAPVT VII.

Cruditatum primæ regionis copiam ex accidentibus, quæ eas cruditates consequuntur, deprehendi posse demonstratur.



Affectionem, quæ
ex pituita fit.

Symptomata verò, quæ vt vmbra corpus cruditatem copiosam pituitosorum, primæ regionis cruditatum subsequuntur, hercle sunt & primo, vbi pituita cruda, vitrea, non acida, à Praxagora, & à Philotimo cruda propriè appellata in ventriculi fundo fuerit, ad stomachumque ascendens, inappetentiam ciborum efficit, vt Galenus ratum efficitur si ad cerebrum peruenierit, soporosam affectionem parit, vt etiam à dulci pituita somnolentia fit; At verò ab acida, & salia pituita vigilæ exortuntur. Verùm ea acida pituita in ventriculi fundo iacente, si ad os ipsius ventriculi se raperet, procul omni dubio semper homines famelici euaderent, vt etiam à bile acida atra, & à melancholia naturali, id ipsum emanat, ob aciditatis constrictionem: Sicuri rotum in oppositum pallida bilis, seu flaua, vitellina, & crocea ob amaritudinem stomachum ledendo nauisæ inuehant. Ex salia autem pituita scis sequitur. Præterea pituitosus. & crudus succos habentes ingram multam ferunt. Insuper dolor grauatiuus, & anxietas ventriculi, atque quam plurimæ, ac fere infinitæ affectiones, quæ circa stomachum obortuntur ex cruditatum pituitosorum copia: Verùm præsertim ructus, ægræ concoctiones, tormina, voluuli, seu inflationes, aut flatus, & affectiones omnes, ad os ventriculi spectantes à Galeno traditæ, vt ijs in locis eum est videre. Caterùm ex mesenterici læsione hæ affectiones emanant. Aie enim Galenus: si vel ieiunis causa, vel ventriculi, vel intestinorum vniuersorum maxime ieiuni, mesenterici a vena omnes habituali intemperie afficiantur, facili etiam vna refrigerare possunt omnes fistularum iccoris partium venas: quo fit, vt ad hepatis quoque vniuersum corpus intemperies ipsa perueniat. Vnde inuestigandum est, an à mesenterico, vel à ventriculo, aut à liene, seu intestinis afficiatur: Porro interdum mesenterici vena à ieciniotis cauo, phlegmone affici possunt. Ea propter mesenterici inflammationis signa Galenus posuit, & Fernellius: sicuti etiam supurati signa ab Hippoc. & Galeno. Caterùm notandum esse inuenio. Aliquos fuisse, vt ait Gal. falsò existimantes fluxum hepaticum ex faeculare iecinoris attractrice obnoxia, reuera chylum ad sese non attrahente & eorum nō esse hepaticum affectum, immo mesentericum tantum; perantes, quòd iecur mesenterici venis, veluti manibus, quæ ex ventriculo ei cibum afferant, vitur, hinc ijs cruditatibus, læso mesenterico, vident cibum per venas mesentericæ, & mesentericæ intestina distribui non posse, vt solebat. Verùm enim verò, cum non detur vlla naturalis vis, influens non modò in mesenterico, nec ventriculo, verùm nec etiam in hepate, vt alibi conetta Auicenn. iam dictum est, vt Valefius statuit: Nihilominus non est negandum in mesenterico, quod facili à sanguine malo, crudo, crassoque obstruitur, vna cum sima hepatis parte, ob eorum venularum magnam angustiam ira obstruam, ac veluti à radicibus angustissimis suis, hepar impedire, quominus hepar ipsum ab ijs radicibus suis obstruam alimentum à ventriculo nempe chylum sanguificandum attrahere valeat, & ita mesenterico in pluitibus egris vidi conesusum fuisse fluxus hepaticæ. Caterùm potissimum hoc affectu Reuerendum Plebanum huc Venerijs Ecclesiæ D. Thomæ Augustinum, non enim fortitum perijisse reminiscor. Ad hæc autem mesenterico ita obstruam improbx sanguificationis quidem dispositiua causa esse potest: Quandoquidem iam dictum est Galeni sententia, chylum primam rubedinem, ac primam sanguinis alterationem in venis mesenterici, acquirere. Si itaque hæ venæ obstruam, calorque suo naturali destituentur, nunquam chyli eam primam alterationem sanguificam ingredi poterunt: sed sanguificatione à mesenterico quidem non disposita, nec hepar probum procreare.

Sanguinem valebit, hincque ob mesentericum ita ipsum sanguificationem deprauatam, seu defectam esse, tunc manifestum erit. Verùm cruditates copiosæ in prima regione coacervatas esse, venis profusius facili denotant, cum mesenterico per intestinum rectum expurgetur, nec non ventriculus, ac hepatis cauum;

Denique

copiosis cruditatibus primæ regionis, difficiles anhelicius, rufes, ac hypothyimicæ syncopes, & mors ad eor perueniendo fluentibus, gignuntur.

✱

Lib. de pleura.
vlt. G.
4. De ven. san.
c. 4. & 1. de diff.
fibra. G.
Gal. lib. de ple.
c. 11.
6. De sec. cal. & s.
insidem.
11. Meth. c. 1.
1. Epid. ex Toef.
1010. 1011. &
Gal. 1. ad Glm.
214. & 11. Meth.
mod. 3.

B
8. De eum. m. 3.
1. 1. de.
1. De fin. ven.
c. 9. & 4. de san.
1000. c. 1. & 1. de
loc. aff. 6.
5. De loc. aff. 6.
de 2. ad Glm.
c. 14. & 11. meth.
c. 1.
11. Meth. mod.
c. 14.
5. De loc. aff. 7.
& 11.
Lib. de meth.
101. c. 7.
6. Ep. de a. 118
& 11.
3. De loc. aff. 7.

C

1. Contr. c. 11.

Etiam lib. Gal.
attribuit de
comp. v. m.
benito c. 11.

D

6. Aph. 2.
11. Meth. 11.

6. Aph. 2.
Gal. 1. meth. c. 3
& Paul. lib. 2.
77.

A

CAPVT VIII.

Cruditatum primæ regionis copię maioris, & minoris notæ
exhauriuntur.

g. De sympt.
causis.

g. De sympt.
causis.



Rimæ autem regionis cruditatum copia maior, seu minor à symptomatum quidem partium illius primæ regionis magnitudine grauiori, seu remissiori, simulque à partis læsæ maiore, seu minori imbecillitate desumitur. Cruditatis namque magnitudo, vt ait Galenus maior, aut minor vtique pro vt plura, aut pauca, seu efficaciora aut mitiora symptomata, ab ijs cruditatibus concitata habeantur, elicitur. Quocirca si cruditates multæ fuerint, etiam hominibus tremorem inducere possunt.

B

CAPVT IX.

Cruditatum secundæ, tertię, & quartæ regionis ex cap. 4. lib. 4. de tuenda
san. Gal. notæ in sequentibus capitibus explanandæ proponi-
tur. Vrinamque solam succi secundæ regionis fir-
mum signum esse demon-
stratur.

g. De sympt. cau-
s.



Onfiscutis autem primæ regionis cruditatum notis, nunc secundæ regionis cru-
ditatum notas enucleabo. At vero quia Galenus secundæ, tertię, simulque,
quartę regionis ordine miro statutas omnes patefacit cruditates, et si quoque
harum trium regionum clarioris doctrinę gratia, primę regionis cruditatum
tangat. Eamque sanè ob causam Galeni caput explanare enitit, vt prom-
ptuarium id omnino Galeni doctrina decoretur. Proinde cum Galeni locum
dilucidans, primo secundę, mox tertię, denique quartę regionis cruditatum rectas declarabo
notas. De secundę itaque regionis cruditatibus ait. *De ijs vero, quæ intra venas sunt, nullum
manifestum nec euident signum habemus, præter solam urinam, ac postea ibidem id ipsum confir-
mando, ait. Ne sudor quidem succorum, qui in vniuerso corpore continentur nota est: urina ve-
ro eorum tantum, qui in vasis continentur, & paucis verbis interceptis, inquit. Sicuti verò urina
succorum, qui in vasis sunt.* Ceterum cum id mille alijs in locis Hippocratis mente confirma-
rit, alijs auctoritatibus non est opus, nisi vbi de vrinę rubrę significatione mentionem fecit, hoc
modo. *At verò sanguinem abundare crudiorem, & serosiorum rubra indicat urina, qui in venis
videlicet secoris, & profundi corporis ipsius hepatis continetur.* Causa verò cur vrina conco-
ctionem probam, seu viciatam succorum generis venosi ostendat, est; quòd vrina non nisi se-
rosa humiditas superflua, ac inutilis à natura expulsa, quę prius in chylo reperiatur, veluti
sua tenuitate, vehiculum chylum ipsum quadantenus crassum per angustissimas mesenteriei ve-
nulas, ad hepar ducens. Vnde prius hæc serosa humiditas cum ea dispositione sangui-
ficationis in venis meseraicis facili inuenitur, posteriùs verò tum in venis hepatis,
tumque in sinu generis venosi vna cum sanguine elaborato, seu con-
cocto existit, hinc sicuti sanguis, in meseraicis venis
preparatur, ac in venis hepatis, nec non in to-
to genere venoso coctione perfici-
tur, ita quidem vna cum
sanguine necesse
est, vt e-
quę
serosum id quoque excrementum alteretur. Eamque sanè ob cau-
sam necessariò, qualis succus in genere venoso repeti-
tur, talem urinam semper denotare,
pro comperto habe-
tur.

Vides clonidionem seu cruditatem
venis succorum in
venis propter
venosi adesse
denotat.
Causa est vrina
hanc adesse sed
denotat.
Vnde notum.

g. Propter a. 6.
vbi ad 1. 7. de t.
epid. com. a. 1. 10.
et de t. 7. de t. 1. 1.
de lib. de vna
significat. 7. 1. 1.
g. Epid. 1. 1. 1. 1.

D

CAPVT X.

Aliqui modi, quibus vrina impeditur, quominus ipsa succos in genere venoso residentes ostendere queat, promulgantur, simulque explanantur, ne decipiamur.



T verò speculationibus dignum esse inuenio, interdum impedimenta per accidens adesse, quæ inhibent. quoties vrina succorum generis venosi concoctionibus, seu cruditatibus cognoscendis conferre possit: hinc hæc omnia impedimenta,

exploranda summo iure veniunt; ut ijs cognitis in vrinis, hac doctrina, à Galeno statuta, nihil decipiamur. Quandoquidem vrina deprauari valet ab aliquo succo alieno, extra genus venosum iacente, qui tamē, dum vrina extra venas est egruila, ipsi vrinæ postea commisceatur, aut albus, vel niger, aut flauus, aut viridis fuerit, ac ita colore, liquore, substantia, & contentis, eo succo depruari potest. Humor namque pituitosus in prima ea cauitate inter ventriculum, & septum transversum iacens conclusus, ubi per vrinas in vesicam versa pituita, morbi sit solutio, ut Hipp. ait. Preterea etiam pituita, & in mesenterio, & pancreo, & liene, aut hepate, seu vetro, vel capite, verum potissimum in vetriculi fundo coaceruari valet postea verò à natura per vrinam expelli potest: Vt etiam Melancholia, seu atra bilis, vel niger succus nondum in atram omnino conuersus bilem in liene, atque bilis flaua in hepatis gibbo residet: omnes namque humores isti facillimè vna cum vrina laudabili, cum sua substantia, coloreque tum suo liquore, & coactis extra genus venosum commisceri potest, ac exinde per vesicam educi; aut vnus, aut duo simul committi succi: Vnde ex quo hi humores quidem etiam laudabilem, concoctamque vrinam, quæ prius in sanguine probè cocto generis venosi inerat suo colore tingere possunt, sua substantia incrassare, suoque liquore opacam reddere, atque etiam vrinæ contentos deprauare: Hinc videmus interdum vrinam albam, aliquando flauam, quandoque verò nigram: nonnumquam autem viridem; ex bilis flauæ, & atræ permutatione in vrinam delapsa, ut in Vetro D. Dominici, Caluo, mei amicissimi, frequenter contingere solet, cum vtique eius Mulieris hypochondrion tensione offensum sit. Verum præter melancholiam, atqueque bilis nigredinem, alia vtique nigredo, nempe sanguinis grossi in aliqua parte collecti, nigrique penitus iam facti accidere potest: quæ nigredo vrinæ cum permisceatur, vrinam nigram producere quocumque valet: vt Montanus adnotat. Porro in roto genere venoso vrina concocta contineri potest, simulque succi concocti, at tamen vrina profectò ob renum obstructions propter renum imbecillitatem calidi innati prohibetur quominus contenta, & materia vrinæ colore cinereo naturali decorata per renes ipsos pertransire valeat, quippe duntaxat vrinæ aquositas tenuis, & alba transiit: Ac tunc vrina cruditatem denotat, non tamen res ita se habet. Præterea albedo quoque in vrina vltra pituitæ albedinē à pure frigido in aliqua particula genito, ac in cyathi fundo mox descendente. At verò alijs tribus modis vrinæ significationem eorum, quæ in sinu generis venosi sunt aliquod impediens deprauare valet. Quandoquidem & à capite valde calido, & ab aliquo præter naturam circa septum transversum iacente, nec non à lesa vesica vrina deprauatur. De primo enim modo Hippocratem inuenies afferentem: cum caput supra modum percalfactum fuerit copiosa vrina redditur. Si quidem in eo liquatur pituita, quæ liquata parim quidem ad nates, parim ad os, parim etiam per venas, quæ ad podendum tendunt, secedit, quo cum peruenierit vrinam albam reddit, & veluti vrina si illudum afficitur. Verum aduerto id fieri non tantum à pituita in capite residente, ac inibi quoque liquata, sed etiam à pituita parim in vetriculi fundo existente, mox à capite iusto calidiori attrahente, veluti à cucurbitula ex caliditate attrahitur ad se, quæ denique à capite ad vesicam profuit. De secundo etiam modo Hipp. nobis posteris prodidit. Quibuscumque tenemus, & crudam longo tempore mingentibus vrinam, si cætera, vt in consuetudine induta fuerint, vs abscessum ad partes sepiò transversum infernos expellere oportet. Tunc enim pars vrinæ crassa vna cum vrina quidem non egeritur: immo ijs in partibus, in quibus expectandus abscessus manet. Eamque certè ob causam, vrina tunc tem potius talia excrementa haudquaquam indicat, qualia venis insunt. Tertijs verò modi Diuinus senex ita meminit. Ne te decipiat, si vesica agrotas aliquam talem reddiderit vrinam: non enim totius corporis morbum offendit, sed ipsius solius. Idem verò contingit reue Islo, seu ambobus obnoxys renibus. Hinc iure Galenus statuit vrinam non semper vtrem denotare, cum tantum vrina supra morbos febriculosos vniuersales totius generis venosi affluat, ut aqca iam satis offensam est, nullo tamen impedimento intercepto. Vrinę etenim biliosę interdum propter renes, & vesicam accidunt, ut ait Galenus: Quare aut quocumque vrinam supra venas, & supra renes, & supra vesicam significare,

Impedimenta
que ex accidenti
autem quo sui
non concoctio-
nem in venis
accidentem vrina
denotare possit.
Vrina à potu
depruari potest.

Vrina à melan-
cholia depraua-
tur & à bile fla-
ua.

A sanguine gru-
oso distans
causare potest.

A renū obstru-
ctionibus idem
fieri valet.

A pure perfe-
cto eorum ad ac-
cidens.

A capite valde
calido copiosa
vrina.
Cum in media
pituita liquet
seu, qualique-
stia ad venas,
& ad vesicam
cum vrina per-
git vnde à pitui-
ta à capite facta
vrina alba fit.
Ab abscessu sub
dignatione se-
pius idem fit.

A vesica obno-
xia idem fit.

Vrina supra ve-
nas, supra renes
& vesicam affluat.

B
7. Aph. 16.
3. de nat. facie.
11. & 2. de vep-
4.

11. Meth. 25.
& 1. ad Glau-
c.

C
A de vrinis ca-
p. 106.
Montanus libi-
d. 1. p. 104. in rego.
Vide Gal. 1. de
loc. affec. 3. & 6.
de loc. affect. & a
Montano ibi-
dem p. 109.

Lib. 4. in princ.
in Fecl. 150.

D
Hipp. 4. de morb.
104.
2. de vep. 14.

1. Prog. 17.

3. de vep. 4. in
p. 1. 4. 1.
Cum 2. p. 104. 16
Cum 1. p. 104. 17
Cum 4. p. 104. 77.
& Hipp. 4.

A

CAPVT XI.

Alij fontes à Galeno constituuntur, à quibus cruditatum secundæ, tertiæ & quartæ cruditatum regionis signa indicatiua, ac etiam præ-nunciatiua apprehenduntur.



Is autem statutus caput Galeni ex planabo: Galenus enim postquam sibi crudita-
tum venosi generis notas ex vrina declarandas proposuerit; Antequam eas no-
tas in specie explicet: illico alia signa, in genere desumpta, cruditatum signifi-
catia, vt cruditatum cause procacitatis ex alijs fontibus capienda, tum secundæ,
tum tertiæ, tumque simul quartæ regionis explanare pollicetur. Et ratio est, eò
quod hæc signa cognitioni significationum vrinæ conferunt. Ideoque cum à no-
tioribus, & à facilioribus cognoscendæ veritatis doctrina sit; hinc ante vrinæ significationes ist-

Contents.

Hæc poluit: & primò in genere, mox verò vt capite sequenti in specie. Attem itaque medicam.
illustrando, inquit. conijcere tamen ex his licet. Primùm existimabimus quoniam qui affligitur: vsus sit
villus secundo solutus ne sit malum succum natura sponte congerere, an non: Ad hæc ex naturalis ali-
qua. & consuetæ excretionis iam desierit, qua excretionis sup pressa, cruditatum copia exorta postea,
sub hoc tertio signorum genere etiam cadit, meo quidem iudicio, quando vult mutilata aliquo
membro, aut ubi quis in exercitatione educatus ad ocium se conuerterit, vt Galenus ait, ibi enim tam
cacochymia, quàm plethora colligi pòt, hic autem Gal. non posuit omnes excretionis solitas,
que dum retinentur, copiâ cruditatû colligant. Sed posuit 7. meth. c. 11. Quarto an excretionis, aut
purgationis, aut vomitus, aut gestationibus, aut vsu aquarû sponte nascentiû soliti supernacua expellere id
intermiserit. Quinto. Atq; in viliu quidem videndum an cruditatis, et erebrior, & maior, quam ex cõ-
suetudine præcesserit: an mali succi cibis copiose se impleuerint, an vinum pro antiquo mustum, pro tenui
crassum; an aqua marina mixtum liberint: an etiam profusus à vino se ad aqua potionem transulerint:
nec stmel, biuie in quolibet horum peccauerint: sed assidue, bonoq; tempore, nempe longo tempore.
Hæc enim quinque causarum procacitatarum cruditatum procedendarû genera conspiciuntur,
quorum quintum genus in suas species diuidit, que omnia, cum ex se elucescant, nulla explana-
tione egent. Omnia itaq; isthæc, cetera cruditatum cause, seu occasiones semper cogitandæ sunt, in
cruditatum rectè curandorum cognitione rectè præstanda, vt etiam lib. 1. c. 3. obiter partim iam
dictum est: At verò cum Gal. in eo capite signa quoq; statim et intendit, quibus in vicerosa lassi-
tudo, que vizio mordacium cruditatum exoritur dignoscere possimus: an acres succi crudi in
genere venoso etiam, an ne tantum in solidis partibus, seu specie carnosa in sint: cum antea exara-
rit. Quoniam igitur eiusmodi lassitudo vizio acrimie excrementorum oritur: ante omnia considerandi est
in solidis, ne tantum corporibus, an in vena venarum sinus malus succus contineatur. Idcirco prius signa
generica harum cruditatum ex parte secundæ regionis, postea tertiæ, & quartæ regionis, in quib-
us lassitudo et vicerosa sit, constituit eò, quia hæc cruditates prius in secunda regione resident,
mox in tertiâ, & quarta iacent regione: eò ad eam tertiâ, & quartam regionem accedant hæc
cruditates, à secunda promanantes regione. Aduerte autem hæc omnia ad cognitionem cruditat-
um primæ etiam regionis conferre.

Trahit de capite
notio.
Cruditates à di-
betur via, &
ab ocio.
A consuetudine
m.
Ab ex-rectione
causata recte-
ta.
A membro ali-
quo magno nati-
tibi multo
A purgatione
obscura omnia.
A viliu vici-
tudo adhibi
ta.

C Cruditatum rectè curandorum cognitione rectè præstanda, vt etiam lib. 1. c. 3. obiter partim iam
dictum est: At verò cum Gal. in eo capite signa quoq; statim et intendit, quibus in vicerosa lassi-
tudo, que vizio mordacium cruditatum exoritur dignoscere possimus: an acres succi crudi in
genere venoso etiam, an ne tantum in solidis partibus, seu specie carnosa in sint: cum antea exara-
rit. Quoniam igitur eiusmodi lassitudo vizio acrimie excrementorum oritur: ante omnia considerandi est
in solidis, ne tantum corporibus, an in vena venarum sinus malus succus contineatur. Idcirco prius signa
generica harum cruditatum ex parte secundæ regionis, postea tertiæ, & quartæ regionis, in quib-
us lassitudo et vicerosa sit, constituit eò, quia hæc cruditates prius in secunda regione resident,
mox in tertiâ, & quarta iacent regione: eò ad eam tertiâ, & quartam regionem accedant hæc
cruditates, à secunda promanantes regione. Aduerte autem hæc omnia ad cognitionem cruditat-
um primæ etiam regionis conferre.

Trahit.
Cruditates et
lassitudo vici-
tudo acris esse
dignoscitur.
Viciu in qua
ad ratione aut
an in duabus re-
gionibus repe-
titionis signan-
dum.

CAPVT XII.

Signa capite præced. à Gal. generica statuta, nunc in suas species ab eodem
Gal. fecantur. Notatq; mordacium cruditatum tertiæ, & quartæ
regionis nobis Galenus assignat.

D



Is autem genericis notis constitutis: modò duo facit Gal. primo namq; has no-
tas, hætenus in suas species non distinctas, distinguit, vna & cruditatum mor-
dacium, tum in solidis corporibus, simulq; genere carnoso, tum in cute reperit
eum, & ijs notarum speciebus nobis tradidit. Idè pergit, & inquit. Secundo si-
cut diximus assimilandum nunc ex eorum numero, qui facile malum succum cogerunt,
lassatus ipsi sit. Deprehendas id per eorum affusum aut scabie, aut lepra, aut vitiligine, aut
pruritu crebro, sit affusum, aut herpes, aut elephanciasis, aut opibasis, aut alopeciasis, aut pustula cre-
bra, aut epimyces, aut denique viliu symptoma, quod ex vicioso succo, & natum, & notum est,
illud male habuerit. Cum Galeni intentio prima sit in hoc textu propositio, has notas in
specie diuidendo, nos docendi quomodo tertiæ & quartæ simul regioni cruditatum mordacium
copiam inesse dignoscere valeamus: Ideo in executione, id, quod est secundum in intentione,
primò ponit, nempe catalogum affectionum cutaneorum, que efi curant sine attamen in
partibus quoq; solidis, ac in specie carnosa adfunt: Quo factò, deinde id quod primum erat in intè-

Contents.

Trahit de capite
notio.
Signa vt cruditat-
um mordaci-
tertia & quartæ
regionis in
cruentia affici
bus.

Tomus Tertius.

D 3 tione

A fuerit: Hinc lib. 2. de mag. sang. discrimen inter sanguinem acrem, & pituitosum assignauit, quoniam sanguine pituitosum Gal. *malum sanguinem* vocauit nondum coctum, & ante sanguinis generationem ortum, qui in primis maxime venit circa iecur, & quod mesenterium vocat colligitur, qui cum eo insit dulcedo mitis, nihil exhalata, adhuc in sanguinem populum conuerti valet: ideo ita euacuatio non eget, vt alius sanguis impurus, superuacaneus, ac excrementosus ultra sanguinis generationem productus, qui ex parte excrementi, seu crudi fucci, à quo iam pars dulcis nutritiua exhalata est: vt in cinere combusto apparet, qui non amplius ad benignum nutrimentale reduci valet: proindeque ratione ipsius einerulenti sanguinis, omnino euacuatio sui ipsius indiget. Tandem speculor copiam cruditatum acrium, in his regionibus residentem, posse dignosci ex notis huius vsque ex planatis, seu ex rectis, ac certis signis diagnosticis.

CAPVT XIV.

Primò curandi quartam, ac tertiam regionem, à copia cruditatum acrium laborantem, doctrinam, ac methodum cognoscendæ curationis agendæ, nos docet Galenus: mox secundam regionem: vt cap. præcedenti iam pollicitus est.



Primum verò Galenus suum incertum primum quidem attingit, hoc est, acrium cruditatum, iocute, aut circa cutem residentium curationem administrandam nos docet: posteritatem docendo, ita. *Sed si quis iam institutum, mihi ab initio repetens, &c. pergens vsque ad hæc verba qui copiam sic afficitur curat, ut excrementa, qua circa cutem sunt, educat: propterea quod afficitur in hac vna consiliis.* Hinc cognita copia cruditatum, his notis iam statutis, faciliè eam copiam educere erit. Subinde autem curationem constituat, si mordaces succi, ac dum circa cutem, & carnem fuerint copiosi: Verum etiam in toto vcnarum, renæ caue sinu adfuerint, hoc modo exarando. *Itaque rursus detur eundem inueniem præter alia, qua eadem sunt &c. Maiori autem educatione eget copia, in genere venoso iacens, vt iam dictum est, tum etiam quia prius ipsa & venæ sectione, & succi copiosi acris, & mordacis aluius, fortassisque vomitui euacuatioe purganda: ait enim ibidem. Nam si quoniam sanguinis copia, aut vena incidenda &c. Post hæc aliois eo medicamento descienda est, quod maxime accommodatum malo succo sit: Quod si vitiosi succi tantum, huius citra sanguinis copiam subsint, purgatio petenda est, qua infestanti excremento sit accommodata. Infestat verò alias biliosum, alias atra bilis, aliis pituitosum; sed quod vel saltem, vel acutum sit. Atque horum quodlibet aut crassius, aut sero propius, aut mediocriter consistentia; de quorum discernendis iam notis nunc agamus.*

CAPVT XV.

De cruditatum crassarum, aut serosarum, aut mediæ cuiuspiam consistentie notis rectis Galenus agere aggreditur.



Vm hætenus Galenus cruditatum notas prænuñtiationis seu cruditatum copiarum generationis causas, seu occasiones externas procatasticæ appellat constituerit: Postea verò connumerando ea excrementa, quæ nostrum corpus infestant, vt iam dudum vidisti, isthæ excrementa in crassiora, serosiora, atque medio modo in consistentia se quoque habentia diuidendo: de eorum agnoscendis notis indicantibus tractationem efficere velle; ipse adseuerat, iniquis de quorum discernendis notis nunc agamus, si cum postulis latitudinis affertur consistat, ex his faciliè inueniuntur excrementi species. Sin absque his in boni succi quidem corporibus tum ex istis, qua præferuntur cibis, tum reliquis, qua ipsis corporibus inciderunt. In istis verò, qui malos succos natura colligunt, hinc quoque nonnihil capiendum; sed de eiusmodi temperamenti vberius postea agatur.

Nunc de reliquis

agamus;
ex quibus licet de mali succi specie conie-
cturam accipere.

Tomus Tertius.

D 3

CAPVT

A quæcunque corporis pars suum alimentum attrahere valet. At verò ita per contrariam doctrinam biliosus, melancholicus, & atrabiles superfluitates dignoscuntur humores: cum per motum nimium non solum sanguis in eos humores vertatur: verum etiam calor naturalis hepatis, ac inflans calor igneus admodum euadat. Præterea quia humidi radicales, naturalique vni cum in flanti, & influenti caloris substantia à nimio motu per euaporationem exhalatur, simulque dissipatur, & extinguitur: hinc homo biliosior redditur. Hinc quoque motus maiores, longioresque sunt, eò quoque aduulsus excrementum emanat.

CAPVT XVII.

Ichorum humorum natura dilucidatur, vt facilius postea pateat, quomodo humores massæ sanguineæ in multo labore tenuati, ac in ichores conuersi, si per sudores egrediantur, crassiusque excrementum colligatur: sin per sudores non educantur, tenuius excrementum coaceruetur.



Attendum, vt Galeni textus pars postrema profus quoque manifesta sit, & etiam alie partes vberimè pateant, contemplan in vehementi motu laboris propoliti sanguinem quadantenus ita tenuari, vt partim in serosam humiditatem, ichoremque sanguis ipse transmigret. Quatuor autem massæ humoralis succi quidem sunt præter excrementum serosum, quod per vrinam non vacuatur, immo vna cum sanguine in toto venarum sinu commixtus residet, & quod per sudorem expellitur à natura, cui inutile nempe sanguis, seu pallida, pituita, & melancholia. Omnis autem humorum horum vtique suum serum, vel ichorem, vel sanie appellare Medici, continent, vt lib. 3. de morb. magni sang. cap. 16. etiam dictum est, quæ excrementa, determinata hercle sunt, à quibus nostrum corpus omnino liberari debet: serum nanque sanguinis pituita, bilis amara, & atra, nec non melancholia, simulque symptomata, quæ ab his ichoribus concitantur à Galenus adamussim dilucidantur. Qui sane ichores cum tenuissimi sint, facillimè vna cum seroso excremento, per corporis humani ambitum procul omni dubio à natura, vt deterrimi, ac motuosi, seu insaluberrimi expelli possunt: sicuti pituita, cum sit crassa, per sudorem educi nequit, vt Galenus testatur est: quoniam per sudorem tantum tenuia excrementa superficialia à toto habitu educuntur. Proinde ait Galenus in textu qui cum multo sudore obest, in crassius excrementum facit, cum ibi serosi omnino educantur succi, manente crassiori excremento: At verò qui sine sudore peraguntur magis tenue, veluti qui hyeme, & frigido aeris statu suscipiuntur. Cui ibi sanguis tenuatus maneat: quia morbo tem hyeme excrementum magis tenue per veris tempore colligitur, æstate verò crassius excrementum pro autumnino aggregatur. Ideoque verè morbi curantur plurimi sunt, autumno verò morbi interni concitantur. Quandoquidem sicuti excrementum tenue per curjam facillimè vacuatur: ita crassum in centro, & genere venoso manet. Ceterum in specie omnes isti ichores à notis suis dignoscendi sunt: quæ notæ ab effectu quidè productio ichoris, quoniam serum sit in sinu venosi generis sanguineam massam conquinans faciliè deprehendi possit: Si nanque sanguineus fuerit fetus, tunc vtique sanguinis pars tenuior, & crudior cum sit, vrinam rubeo colore tingit. Hinc vtina rubea morbi secutitatem ostendit, cum humor benignus sit: ætatem diffidile iudicium portendit, hoc est morbi longitudinem, quia à crudiori sanguine morbus emanat: sanguinis autem serum, vt ait Galenus omnium mistissimum est. De pituita sero Galenus ait: Timiditatem quidem pituita serum facit & par est, non tamen vigiliam, aut perturbationem, aut animi motum cum terrore: torpor enim ipsi, & frigus inest solum, non mordacitas atque malignitas, nisi forte, & ipsa plane vitata acida, aut falsa euaserit. Vnde et quo liquet, pituita falsa, & acida ichorem, animi quidem perturbationem, motumque cum terrore, & vigiliam, ac pavorem inferre posse, si ad cerebrum peruenierint, harum pituitarum ichores: Sed à vitæ pituitæ (crudus succus à Prætagora vocatæ) sero, pauorem, frigus, simulque torporem hoc est letiporem, somnolentiamque diuturnam produci posse, iustum est. Ceterum bilis flauæ ichor valde infestus, prauisque conficitur: Infestissimus verò atra bilis sanies, ichorut, cum ambo timorem, ac mælitiam inducant mordacitatis causa, enim Galenus de prompferit, vt etiam lib. 3. de mor. magn. sang. cap. 16. iam dictum fuit. Timores verò magnopere aeris, & densæ flaræ bilis symptomata sunt: cognata iam timoribus sunt mælitia: & alibi ait ex Hippocrate, astrictis. De sanguine ichoride, quod in pauidis talis, aut in vigilantibus, & sine malis, sine bonis inquit enim in commento Galenus. Non simpliciter tenuem, & aquæum sanguinem ab ipso Hippocrate ichoride vocari suspicandum est, sed enim, qui venosus aliqua, & maligna facultate præditus sit in secundo nâque epidem

Tenuis pars vna
na percutis ex-
plicatur.

Quilibet hu-
mor sui habet
ichorem.

Tenuis & exalta
bilis.

Hyeme excre-
menta crassa
mularum. Atta
re vera crassa
colliguntur ex-
crementa.

A quo ab ichore
in ipso die quo
sit saltem.

Ibi sanguinis
quid sit & quo-
modo dignoscatur.

Pituita in hoc na-
tura & dignoscitur
Pituita in hoc a-
cida & falsi ma-
lignitas.

Bilis inquit hoc
in sua natura &
mordacitatis dis-
citur.

Et ichor quæ bi-
lis.

Ichorides hi ex
Hippocrate, &
Gal. dicuntur
aut verum
omnino veno-
sum.

Hippocrates
Galenus.

1. De san. men.
6. 22.
2. Epid. com. 1.
3. 1. & 2. de mor.
3. 1. & 2. de
diff. feb. 1. 16. &
3. de mælitia. 9.
Ibidem nempe
3. de viciis. 1. 16.
4. Epid. com. 1.
5. 1. 16.

C
1. De viciis in
mor. 1. 16. com. 1.
2. de mælitia. 9.
3. de viciis. 1. 16.
4. Epid. com. 1.
5. 1. 16.

1. Epid. com. 1.
2. 1. 16. com. 1.
3. 1. 16. com. 1.
4. 1. 16. com. 1.
5. 1. 16. com. 1.

D
1. Epid. com. 1.
2. 1. 16. com. 1.
3. 1. 16. com. 1.

4. De san. men.
6. 22.
5. Epid. com. 1.
6. 1. 16. com. 1.

6. Epid. com. 1.
7. 1. 16. com. 1.

A etiam per uniuersum corpus semper praeuenientibus, quod tenuius est, et si inuisibilis est, per spirato sub-
gignum, seu fuidi, seu euaporosi excrementa. Quae per spirato, atque subinde per visibiles,
quoniam et naturalis calor languet, illaec enim solignota, seu fuida, aut vaporosa expellere
cum non possit, immo calore naturali deficiente haec excrementa aerea, ac inuisibilia crasce-
sunt, ac in aquam transiunt, modo naturam visibilia euadunt, vel nutrimento vitium amplius e-
stem insum sit, tunc etiam exco, moca ea aerea, in aquam vertitur, ipsa rationibus alta-
tis, grauato uti calore innato: vel motu quassum recrementum animalis coningit, quo tempore
calor naturalis coquere optime nequit, tunc ea excrementa aerea in aquam euadunt subliman-
tiam. Alterum nimirum tetrico coctiois crassum excrementum est fordes, quae in summa corpore
nostro colligitur. Quotum etiam excrementorum hoc modo Galenum maxime inuenio. Nam
si fordes est visum illud, ac res res, quod reliquum est eorum, quae per latentem transpirationem eu-
cantur. Si namque sanguis in secunda coctioe admodum excrementosus, ac lutosus, crassior
valde, et quae contingit: tunc etiam in secunda coctioe facillime excrementum crassius longe ma-
ior in copia quam par est oboritur: quod si sudori commiscetur, sudor utique non nisi fordidus,
simulque lutosus egredi valet: sicuti viscosus sudor colligatur, se habet enim in carnis colle-
quatione, ac omnino praeter naturaliter fiat: sepe autem sudor is viscosus, fordidus quoque
B simul contingere solet: cum lutosus etiam a calore viscosus fiat, et cum calore ipse viscosus sanguinem
eratiorum, fordidum, ac lutosum in sudorem eru conuertit, si frequentius etiam cibus exilient-
ibus crassioribus, fordidus, ac lutosus, ex quibus talis sudor facile emergit.

C A P V T X X.

Idem Galenus ex sudore feto odori iuncto ostendit.



Galenus autem suum institutum perpendo, exarat, aut virum plane olet is su-
dor etenim non nisi utique putredinem in venis extremis magnam, faten-
temque sanguinis, humoris indicat. Non enim si patra putredine in
extremis coactata venis sudor fetidus inchoit: neque a magna putre-
dine in intimis venis cordi propinquus oritur: Accutem interduum io corpi-
bus calidis, ac humidis, sanitate integra gaudentibus: quae ad putredine
nem valde parata apparent, sudores fetidos profluunt: hinc partes sub-
C axillares feto sudore ferere liquet, eumque partes carnes densae, non perspirabiles, & coctae sint:
Vnde in carne, carnisque poro litatur tunc eo, quia omne de terrie concoctionis excrementum ali-
latum taon tenue, quam crassum retinetur, inique sine perspiratione inclusum: non nisi putre-
fere potest hinc etiam consequenter necesse est, ut fetidus sudor efflorescat, qui etiam in cute
manet concutitur causa, quare vterius eum sudorem ferere quoque iustum est. Quocirca sudo-
res fetidi, cruditates in venis extremis, aut porositatibus facile putrescibiles adesse denotant.
Sed insuper, ut ait Galenus sudores male oles ab omnibus edules cibo assumptis, acidis, ac ab
alijs ijs similibus facile corruptibilibus oriri pro comperto habetur, cum humores putridi, feti-
dique, ex ijs alimentis oborti, sero sudorifico commiscerent: praeterquam quod etiam huiusmo-
res sanguine massae fecum excrementum sudorificum recto odore patere valent.

C A P V T X X I.

Sudorem vniuersi corporis omnium quatuor cruditarum regionum succo-
rum notam esse indicatiam. Quomodoque sudoris horum suc-
corum colorem, & saporem deprehendere nos pos-
se, Galenus docet.



Galenus quoque huius sudoris sermonem laconice perpendamus, ut ad illa signa
accedamus utiliora. Inquit Galenus pergens, licet autem hoc ex singulis deprehen-
dere cum laetatur. Sepe namque amarus, plant apparet, qualis viscosus morbo regio
laborantibus emittitur, quia cum sudore erit amara bilis aquola, cuius a mari su-
dor is etiam m: minie albi, eius vero dignatio etiam extra gustum facili est ex solo
colore, cum dixerit sudores odorem & colorem, & gulum excremento, quod
por sudores euacuatur similem habere, quod de sudoribus praeternaturalibus intellegas, succos
inocuos in vniuerso corpore in eis silentes indicantibus, sicuti sudores naturales habent odorem,
colorem, & gustum: tantum humiditatis, quae excrementum terrie coctionis est remue, im-
proprae iam enataeum. Quoniam igitur de cruditarum vniuersi corporis dignatione, ex gulum,
& odore,

Quae visibilia
de sub de caual
Prima.
Secunda.

Tertia causa.

Tertia causa
non excremento
causum est fode-
des.
Sed si sudor
causa.

Vnde est fudo-
ris causa.

Sudor spiritus &
eius causa.

Tertia, & quarta
causa.

Sudores qui per
venas mittuntur, &
qui ex arteriis.
Sudores in
venis vacantes
paulo ex sudore
& gulum ab co-
ctione de crassitie
sudoris agendi
not.

10 De sim. ordi-
fic. c. vii. & 1. de
sim. ordi. c. 1. de
sim. ordi. c. 1. de
sim. ordi. c. 1. de

1. De sympt.
caus. c. 1.

4. De uen. dis.
c. 4.

8. Meth. c. 7.

Gal. lib. dem.

De à consue-
rit. c. 1.

4. De uen. dis.
c. 4.

11. Meth. c. 1.
10 De sim. ordi.
c. 1. de sudore.
1. De sym. causis
c. 1.

Vena & con-
tentis.
Sudores biliosi
colore flavo.
Aut colore pal-
lido.
Vel colore rupo-
so ex fluxu &
pallido.
Vena & con-
tentis.

Vena & con-
tentis.

Vena & con-
tentis.

Vena & con-
tentis.

& odore, & crassitie, sudoris desumpta verba iam fecerit, proinde idem per sudoris colorem hat-
ritur, cum sudor eo excremento crudo suo colore tingatur, exarans quippe pallidus pro eiusmodi bi-
lis ratione apparet, sive tamen post validissimos labores, & vehementem alium plane fluxum conspici-
tur omnibus enim patet in maximis laboribus, ac in ingenti fluxu sanguinem venae causae igne-
re, ac sanguinis igniti partem reuoluerem bilis colore flavo fieri, quae vna cum seroso recremen-
to sudorifico per cutis poros facile exitum habet. Aliquando medius, atque ambobus mixtus cer-
nitur veluti quodammodo ex pallido flauus. Ad eundem modum & ipsius bilis humor se habet, quan-
do hunc quoque in vomitu, deiectioneque, aut pallidum, aut flauum, aut ex utroque compositum licet in-
ueneri. Hoc autem declarato exemplo vomitus, ac deiectionis, aut, quod quislibet horum trium
humorum sero sudorifico commixtus fuerit in sudore, semper cum suo colore deprehendere pos-
sumus. Quisvisque vero is in corpore habetur, tale necesse est appareat serum. Deinde epilogando,
ait sudores per gustum, odorem, substantiam, & colorem notam esse excrementorum eorum,
quae vniuerso corpori insunt, sicuti vrina tantum eorum, quae in genere venoso abundat, nota
est. Ac sudor quidem succorum, qui in vniuerso corpore abundat nota est: vrina eorum tantum, qui in
vasis continentur. Omnia ergo nihil amittendum, sed sudor quoque ipse, (ut modo diximus) inspicendus.
Et ait vt nobis liceat, quod patientes, ac sudore laborantes doceamus, vt suum degulcent sudo-
rem. Aliquando vero ipsum qui afficitur gustare sudorem suum quo certius intersusceat iudicium. Id
quod aliquando sua sponte accidere solet, dum ex fronte, & eius partibus in os sepe dilabitur.

A. De re. S. 2.
C. 1.

Idem.

Idem.

Idem.

B. Idem.

C A P V T XXII.

Cruditatum secundae regionis, hoc est, generis venosi notas ex vrinae con-
sistentia, colore, quantitate, odore, liquore, & contentis
desumptas Galenus colligit.

Cruditates.
Veni. nota per
vriam.
Cruditates
in vris subli-
tate consistentia,
colore, liquore
puri, liquore &
cruditatis appa-
rentia sunt.



Offea vero Galenus (vt promiserat) notas cruditatum per vrinam capiendas, suc-
corumque in venarum sinu existentium nobis tradit, inquit. Estimare praeter
vrinam tantum consistentiam, tum colorem oportebit: Sed nec qua in ea pendet, aut
siquis praetermittere conueniat, sed omnia perpendere. In vrinam praeter substantiae
consistentiam, & colorem, & quantitate etiam odor, liquor, & contenta, seu
hypocritae sunt, quae omnia expendenda sunt ait Galenus ad humores inconco-
ctos, seu coctos dignoscendos. (huiusmodi enim sanguis fit, qui in vasis continetur, ea plane ostendunt,
quando si is biliosus sit, serum quoque eius biliosum esse necesse est, idque pro vtriusque bilis ratione si-
milis modo pinxit Galenus si is sit pinxit Galenus.

Idem.

C

C A P V T XXIII.

Vrinam, cruditatem, seu concoctionem succorum venarum ex colore, vt
ex faciliiori, & notiori nobis significare ait Galenus, Vrinamque
colorem naturalem subrufum esse
demonstratur.

Cruditates.
Vrina quid sit.
Vrina colora-
tur. Subrufa.
F. 2. 2. 2. 2. 2. 2.
Mercurialis.



B vrinam colore exordium desumpsit Galenus, seu a faciliiori nota, ac vniuer-
saliori. Quandoquidem vrinae naturalis color, seu serosi recrementi, quae
vna superfluitas totius massae sanguinem est secundae concoctionis in ve-
nus contenta ex aquosa, & serosa humiditate prodita citrimis quidem cla-
rior, & pallidus clarior esse debet, vt medius color inter extremos colores
vrinae, vrad notauit Mercurialis ex Galeno primo de Cris. cap. 1. 2. ita exa-
rante. Quae quidem optimae colla in is, qua supremum sanitatis gradum con-
stare oportet: talis enim est subrufa, & subflaua, magisque subrufa, quam sub-
flaua, & etiam deinde ait optimam autem omnium vrinam subrufam, ac subflauam esse, quae admodum antea
diximus, & ait etiam. Post hanc est subpallida, pallida vero iam, & subrufa est. Montanus vero de
haec re ita exarat. Est enim color medius inter album, & flauum sicuti est cortex citri, & iste color,
color subrufus est, qui parum declinat a colore citrino magis versus pallidum, quomodo modum est palea
hordei, & erit color subrufus sed talis vrina optima habet talem colorem, quia ei non est admixta flaua
bilis, sed est ab ea separata. Sed vnde, & quare habeat huiusmodi colorem subrufum? Adquiri a con-
coctionis talem materiam, ubi semper reliquum aliqua pars sanguinis, & ei admiscetur. Verum,
quia bilis nihil aliud est nisi pars sanguinis sponiosa, feruens, & tenuis, inflammans in concoctione,
aqua est.

D. In 1. de morbis
vulg. cap. 1. 2. 3.
de re. v. 10.
C. 1. 2.
De re. v. 10. 2.
in re.
Mercurialis a de
concoctione C. 4.

Montanus de vri-
na C. 2.

Cui subrufi co-
loris vrinam vni-
tatem sit a m-
tine coctionis
pallida.

A aquositate, quæ ei admiscetur; ideo cum sit consorsio sanguinis semper bilis et admiscetur, & in ipso est, quæ est pars incoacta, licet enim separata sint omnia excrementa, tamen quia, v. diximus ibi est pars sanguinis valde subtilis, quæ est pars minima, ideo quod facit ibi partem est, & tamen ingit vrinam eo modo quo diximus, & ideo hoc vrinæ aquositas fit in colore similis paleæ hordei. Mibi autem videtur vrinam optimam sanguinem indicantem colore eo subrufo detortatam esse non modò, ut in sanguificatione facta in hepate à calido innato à bile eum acquirat colorem, verum etiam à bile flava, cum à pituita tingitur. & sicuti sanguis profectò sua forma in medio est biliosior atque horum, quorum trique genus vix ab uno appellare licet, vel crudum succum, vel pituitam, ita etiam congruum est, ut humiditas ea serosa, & aquosa, quæ sanguinis superfluitas est, medium acquirat colorem ab utrisque sanguinis extremis allaris. Vnde Gal. ait tu sum colorem de albedine, de flavitate, & tubedine participare, ut lib. 1. c. 2. iam dixi. Vnde is color æquè tum à sanguine, tum à melancholia naturalis, tum à bile flava, tum à pituita naturali necessariò in vrina acquiritur: etsi non videatur à melancholia eam tingi posse, ob melancholiæ densitatem coloris eius non relinquente. Quocirca naturaliter vrina est subrufo colore rimeta, seu color subrufus biliosior sit æquè participans, tam de albo pituita, quam de flavo bilis, ac de rubeo sanguinis colore.

Præter naturaliter verò vrinæ commiscetur vix quodque excrementum omnium humorum vnam; immo etiam per vrinam quandoque abcessus excurrunt, nec non spiritus flatuosus evacuatur. Neque obijcias si dixeris serum nudum esse album per se. Vnde à pituita non pedit, ut ab albo agente. Quia dico quod serum, ut frigidum, & humidum, ac album eiusdem generis est pituita vna cum pituita simul cum chylicatione in ventriculo genitum. Exinde vna cum chylo in hepate in sanguificatione substantiæ consistentiam medium inter crassum, ac tenuem æquè tum à pituita, tum à bile acquirat, ut vrina laudabilis fiat, hinc etiam coloratur ab utroque excremento. Verum cum Gal. de cruditatibus biliosis principaliter curandis agit; ideo prius bis si cruditates in venis biliosæ fuerint, serum quoque biliosum esse necesse est: posterius verò de cruditate propriè verba fecit, nempe de pituita, & sicuti flava, aut pallida vrina bilem crudam significat venis inesse, ac sanguinem supra illum modum esse percoctum: ita alba vrina pituita crudam enuntiat, ac sanguinem incoactum, ut ex ijs Gal. verbis licet colligere, illa namque ex sanguine sunt, ubi supra istum modum est percoctus; in verò ex eo nondum perfecto. Hinc vena alba, & ocrea in omnibus debilitatur, & corporis frigiditate significat, lib. Galenus spiritum cum dicat Hippocrates. Quibus vrinæ alba, & perspicua, mala præsertim si in phreneticis appareant.

Et Gal. in comm. ait. Aquosa autem vrinæ (tales enī sunt albæ, atque perspicuæ) magnam cruditatem ostendunt, & præterea flava bilis totum insipitum, sorsum in caput saltem fuisse. Aquosus enim humor frigidus, ac humidus, & albus ex pituitosis humoris genere est, per modum cruditatis genitus in ventriculo primo, deinde in hepate, ut antea asserui veluti ferè sit pituita pars tenuior, & crudior, sicuti vrinæ rubra sanguinem abundare serosiores, tenuiores, & crudiores in iecore venis, ac in profundo corporis hepatis contentum, nempe in genere venoso significat. Quam vrinam albam, tenuem, & aquosam in textu illico ponit hoc modo. Ergo ubi crudus planè is est, utique tenuis, aquosaque vrinæ erratur, nihil nec quod fidet, nec quod pendat in se habens. At ubi is consorsio est, hoc in vrina apparet, atque etiam nube cula quædam de super tendens superflam, veluti quod in summo lacte colligitur, & quod in summo refrigerant insculi concenit. Hic vrinam iam allatam, crudum sanguinem ostendentem ponit, nec non vrinam laudabilem seu bonam, sanguine concoctum significancem statuit opposita enim iuxta se posita magis elucet. Verum hic Gal. id facit non modò, per vrinæ colorem, sed etiam per concreta, quæ vrinæ in se habet; quæ sanè veluti vrinæ forma se habet, cum quia vltimum excrementum est cuiuslibet coctionis in veno etiam pituita coquitur, ac in sanguinem probum transmutatur. Quartus

D verò in venis extremis, tum etiam eo, quod signum est contentum in vrina ostendens bonam, aut malam sanguificationem factam, ut vltimum tale excrementum illius sanguificationis, cum sit vrinæ pars crassa, cuius separationem à parte liquidioris semper explorare tenemur, ut à nobis cruditatis, seu

coctionis nota principalis oblectatur. Cætera verò in vrina habentur tanquam materia tantum.

Propter ex-
traordinari-
am coctionem
naturalem
subrufo colore
a sanguine.

Vrinæ autem
est sanguinis
rubro colore, ac
à pituita albo
ore, & à bilis
pallido colore
tum etiam bilis
colorem habet
eum acquirat,
non autem a me-
lancholia.
Solus.

Vrinæ flavitas
est colore crudi
serum biliosum
dum in vena
adest deinde,
serum albe vrinæ
pituita vna
cum chylo
dem ostendit.
Vrinæ alba si-
gnificat.

Quoniam, vel
in albo aquosa
est cum bilis
ad cerebrum
ascendit.

Vrinæ, & con-
creta.
Hic ponit vrinam
Gal. per eandem
Gal. explicationem
ex verbis com.
perg. ad Gal.
dixit vrinam
quæ per se
percoctissima
in profundo.
Concreta in
vris quod sit
vrinæ forma.
Pituita probum
in sanguinem
transmutatur.
Nec quoniam.

4. De vrinæ, Gal.
c. 1.

3. De vrinæ, Gal.
c. 1.

1. De vrinæ, Gal.
c. 1.
2. De vrinæ, Gal.
c. 1.
3. De vrinæ, Gal.
c. 1.
4. De vrinæ, Gal.
c. 1.

4. De vrinæ, Gal.
c. 1.
De vrinæ, Gal.
c. 1.
De vrinæ, Gal.
c. 1.

Idem.

Gal. in 1. de m.
vulg. com. 1. de
de vrinæ, Gal.
c. 1. de vrinæ, Gal.
c. 1. de vrinæ, Gal.
c. 1. de vrinæ, Gal.
c. 1.

Mont. 1. de vrinæ
Gal. c. 1.

In prepa. com.
c. 1. de vrinæ, Gal.
c. 1. de vrinæ, Gal.
c. 1.

CAPUT XXIV.

Vrinæ contenta cruditates in genere venoso existentes ostendentia declarantur.



Cruditarum secundæ regionis ex vrinæ colore omnibus statutis significationibus. Ideo nunc idem explanare oportet ex vrinæ contentis, quæ significatiua sunt, vt vrinæ forma. Quorum natum primo indagabo; postea cur ea necessarium gignetur veram tradam causam. Denique eorum genericam, & specificam dilucidabo naturam. Proinde aduerto eocionem in venis ab Hippocrate veluti putis perfecti, ac optimi generationem desumi, vt Gal. etiam fecit per similitudinem generationis poris cocti, & optimi in phlegmonibus geniti, & ait ex Hippocratis sententia, dum humores crudi cocti facti sunt, pus appellari, quod etiam alibi magis declarat. Hinc Hippocrates ait pus alimentum esse venæ, & arteriæ, cum de parte cocta, & vrinæ contenta intellexit, hypostasitis enim vrinæ pus appellatur eocium, & optimum in venis, ac arterijs existens. Cum autem Hippocrates pus optimum definierit, inquit. *Pus autem optimum album esse debet, aquale, & leue, ac quam minimè sordidum; huic verò contrarium pessimum est*, & licet à Galeno alia definitio putis optimi posita fuerit, ab ista Hippocratis distincta, tamen est eadem, cum dixerit, superante igitur integrè ipsa natura, optimum fit pus conspectui album, crassum, & quaque versum sibi simile, leue autem tangenti, & minimè sordidum, crallum enim pus optimum est ad sanie differentiationem, quæ subalba, ac tenuis est, in præternaturalibus dispositionibus, vt in tumoribus, ac viceribus, quæ sanies pus imperfectum est, vt ex malo vlcere exit. Pleretque per quaque verum sibi simile intendit aquale, secundum quamlibet partem, tum in odore, & colore, tumque in substantiæ consistencia. Album autem pus gignitur duobus de causis, quarum alia philosophica, altera verò medica est; prior enim est, vt aer sua perspicuitate, dum humidum admiscetur, aut calore, aut motu agitante, humidum quidem à fecet terrea depuratur, commixtumque cum sit aeri diaphanum, spumofum, & album fiat, vt in vino nigro, & in mare viridi appareat. Hinc omne album est spumofum, & omne spumofum quoque album est. Quod Hippocrates, Platonis, Aristotelis, & Galeni auctoritate mihi assensurare facile erit. Hippoc. enim ait (vt etiam lib. de cert. medic. iam dixi) humidum in corpore calefit, ac diffunditur, & à motu conquassatur, ac spumescit, cum humidum in corpore diffusum, & calidum fuerit, & sine ex labore aliqua piam re spumetur, dum ab ipso fecerunt colitis imaginem representat. Vnde Hippocrates voluit ne dum in semine, fed etiam in quolibet re per spumofum corporis generationem albedinem fieri. Et etiam exarauit manifestioribus verbis. *Aer enim purus per tenues membranas pellucidus apparet, eamque sent ob causam spuma omnes alba conspiciuntur*. Placito quoque hanc veritatem confirmare voluit, inquit, sepe verò terrioris, recensitis que carnis portio quadam vna cum aere colligens se, deinde vento inflatur iactibus, humiditate propius circumfusa, suntque ex hoc ampulla, quæ sigillatim propter paruitatem videri non possunt, huic vero simul, & grandiores tumefacta molem conspiciuntur, coloreque propter spumæ generationem habet album. Aristoteles etiam idem manutenuendo, habet. *ampullam ex paruo erigit fastum, & spissum ex liquido, & album ex nigro causa est quod spiritus immiscetur, qui fastum efficit, & albedinem aperit, ut in spuma, & nunc, nam & mix spuma est*. Alio verò loco ait, *aer autem perlucens albedinem facit, quemadmodum spumam, albedinem verò omnibus aer vaporosus præbet inclusus*. Cui veritati se ascribit Gal. vt Philosophus hoc pacto, *coloremque ex spumæ generatione album habet*. Quæ quidem albedo ab aere prout manet, aut non manet, in corpore alio emergit quatuor modis, vt exactè alio loco exarauit: causa igitur albedinis poris est, quia pus spumofum à calore naturali suo spiritu aereo genitum, per ebullitionem ampullas generationem, hinc etiam crallum, & spissum ex tenui, & liquido humore factum, nec non leue tactum est, cum à spiritu aereo innato calido suauis obortum fit; hinc leue non autem asperum, vt pus pessimum à calore igneo emanans est, & cum in ebullitione totum pus sigillatim in ampullis æque commiserat secundum consistentiam, colorem, & odorem vt cæcio, & alteratio sit optima: Ideo quoque pus optimum, aut nullum saporem habet, aut quam minimè sordidum est eo, quia à calido innato temperatissimum conspiciat, cum omne agens in eius naturam passum conuertet: Vnde pus optimum non est toto genere præter naturam, immo hypostasitis vrinæ saniorum planè secundum naturam se habet, quæ pus dicitur tamen impropiè, ac per metaphoram tantum. Cæterum ea causa vniuersalis albedinis poris satis quidem non est, cum etiam sanguis à calore naturali aereo fiat, tamen rubens gignitur à parte rubea, hoc est ab hepatis substantia, & non autem à tunica venarum, vt ait Galenus quam ob causam à parte, colore albo, sibi simili conscribere esse, quæ etiam causa simul sit, vt aer puri commiscetur: hinc pus leue fiat, ac spumofum, & crallum, seu spissum, & licet, dicatur à Gal. cinerulentum suo colore, id tamen ratione caloris præter naturalis dicitur combustum, & putredinalis pus infestissimum efficiens, vt igitur;

Cochis in venis crudiorum humorum, sicuti generationis putis perfecti est.

Pus optimum tu Hipp. Et Galeno.

Compositum.

Pus cum album, prout ratio philosophica est. Calor naturalis motusque calidus Hippoc.

Hinc.

Aristoteles.

Galenus. Explicatio.

Quæ hæc non sufficit.

A partibus præter naturalibus colore pus albo do.

4. Med. medic. 6. & 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. p. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

2. De nat. hum. 41.

B

Com. 2. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

Gal. Aristoteles de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

2. De diff. feb. 6.

Com. 1. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

11. De gestu. 1. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

C

Li. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

Li. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

Li. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

Li. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

Li. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

Li. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

Li. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

Li. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

Li. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

Li. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

Li. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

Li. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

Li. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

Li. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

Li. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

Li. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

Li. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

Li. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

Li. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

Li. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

Li. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

Li. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

Li. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

Li. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

Li. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

Li. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

Li. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

Li. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

Li. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

Li. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

Li. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

Li. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

Li. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

Li. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

Li. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

Li. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

Li. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

Li. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

Li. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

Li. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

Li. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

Li. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

Li. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

Li. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

Li. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

Li. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

Li. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

Li. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

Li. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

Li. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

Li. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

Li. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

Li. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

Li. de v. v. m. 1. de diff. feb. & lib. de v. v. m. 1. & c. c. s. s. p. 47.

A lignis, spumofum vetō vocatur ab agente, à quo suam formam assumit. Gal. itaq; vt medicus albedinis puris optimi causam reddit, inquires. *Ad hæc colorem eius reddit similem semini par ei eā dīdum quidem, non tamen exquisita ratione, veluti mixtū eiū: femē, n. d. naturā dūcitur in solidiorū corporū colorem exquisita ratione: modicē pus si quidē femini nibil de causā præter naturā eū permittit, pus tverō non affusū quidē par, vt iam dictū est: permiscetur tamen aliqui d. cinnibō, cū sanguis de propriis opificijs exitus. Itaq; itaq; causa ei, ob quā candidū femē, ac pus fiat: & pus quodammodo solius est, imitatur corporibus, quæ quidem sunt conceptæ colorū tinnice, verniūq; & copulæ, ac membrana, atq; c. cartilagine, ossaq; Eadem ē causa ei, ob quā, quod subfides in vtrius candidum sit: etenim & id veluti pus obriuit generationē, quod proportionē rēfōidet inter id, & naturalēs humores intellū. Ex quibus habemus puris albū, cū in se habeat à calore præternaturā quādamtenus calorem cinniciū ob pueri dūm vñū nō omnino à fēce terræ deputatū exatē nō sit ab aëreo spūritu innato albū, vt mixtū ei, neq; à partibus solidis ita eāctū albū, vt femē nihil præternaturalis continens in se. Præterea ex Gal. dictis elicio eadē ratione contenta in vitiis candida fieri. Hinc hypostāsim in vitā cotūm, ac probum sanguinem in venis esse denotantem, albū quidē, leuē, æquale, & cūcūmā esse debere, ait Gal. Cuius natura inter sanguinē probū, ac inter pus perfectū ē habet.*

Causa patris ad-
be Medici et Ga-
lesio assignamus
adpe parum ad-
be spiritum
pug efficiens,
quibus.
Causa naturalis
jovis.
Pun non ica al-
bium et scimus
non et hoc.

Causa petiti.

C A P V T X X V.

Cur vrina contenta necessariò gignantur, simulq; concoctionem, seu cruditatem succi vaforum ostendant: Vrinamq; bonam mediocriter crassam, ac à liquore separatam esse debere, demonstratur.



Natura verò ob quam contenta ipsa gignitur, est eò, quia Natura semper humores affimilare, & si perua canea, quæ non potest affimilare, expellere intenta est. Verum cum secunde coctionis vicinum excrementum quale est contentum in vrina, vt Gal. ait, affimilationem, & confectionem refugiat: Ideò quo d' melius est naturæ facere aggreditur, eam pro corpore fanicare, & confectione attingenda, tum pro seipsa quoq; in corpore humano particulari, manuteneuda, cum aut spiritus prædicti calidi innati solidarū partū, seu permatizarum albarum ille sit, vt corporeum salubre, & insalubre facilius cōtrictis instrumētaliter, pro qua re ille, vñ cum ijs partibus solidis affimile in quantitate, & qualitate conferendus actus, non amplius affimilare valet, neque coquere: hinc pro ijs corporibus solidis alidis viribus, natura semper protensa tantum ijs partibus solidis corporis humerare nititur. Quam ob causam vrinarum contenta cocta, & optima naturaliter in spermaticis cōnaturis fiunt. Cōtenta verò hæc vel in fanis sunt soluta, & calore vel in agris primò & calore igneo putredinali cōruptæ, subinde & calore naturali sunt tollendæ aut coctione per eorum separationem à parte liquidiori vrine facti. Tenditur calor innati dimittit supra succos coquendos, cum denotetur, natura in coctionem aggressa esse; hinc et si superans, aut saltem superata præcognoſcitur, cum pars crassa nihil à parte liquidiori separabitur, naturā iam à cruditate succo- iam, aut vincendam fore portendit, cū nundum fanis sit, & vrina bona fit subu- enit & vt mediocriter crassitatem obineat, vt ait Gal. optime est coctū, & quia superius est gradum, considerare oportet, cum dixerit superius, eodum, aut in eo eodum nomine misceri et genere; plurimò verò in eo quod magis, aut minus differentiam habet. Ideo autem crassa etiam colorem, & circa confectionem i alius, n. est subruia, & subfana, &

Cells are in a
sine curve
position.

19. Math. med.
off. de cur. 2. de
mor. hum. 1. 2.
In o. de mor. vulg.
cur. 1. 2. 3.

Concreta hore
vel in fatis vel
in agria.
Concreta hore
rationis effra-
cta. E facile a
liquidiora par-
te vixit figu-
rentur.

Vitis optima habetur, & mediciorum causa est & cuius composita à liquida parte separatur. Tertia vitis acustibet crudita.

Ad totum ex-
emplum nota.
Cur non vol-
uit eruditionem
in se ve-
lire offendat.
Cur non vol-
uit eruditionem
offendat.
Cur non gra-
tia illi debeat
semita parata.

Tomus Tertius.

E calories

calore præternaturali cõcurbanes. Cui strassas et fuisse indicies, nec subsedisse urinas plant sunt illa ex conturbatis, ac turbidis ut solet hic appellare, quæ semper turbationem crudam annuntiant multo prædã spiritus flatuoso, ut multũ. De tenui aut alba, quæ talis mingitur, & talis permanet, quæ solum cruditatis obinet, ita Gal. ait. Quæ verò ad summũ in coctũ est has oēs tunc, est aut aquosa exquirat, neq. iam equi incipiens, qualis turbulenta, neq. in spe, ut coqui debeat, sicut quæ panis post turbatur, sed veluti desperata coctionis accedens, quæ talis est venosi generis passio existit, qualis est in ventriculo extrema ipsa cruditas, ac deinde ait, prava aut sufficiens est, quæ tenuis, & alba est sicuti aqua: nã simplex quod non est dispositio sed velut est imbecillitatis indicium, cum aut plures coctionis gradus sint per separationem partes crassæ sublimis, aut suspensæ, vel subdenses: Ideo de primo modo non dixit in textu: sunt. n. nebulae, vel sublimis, aut suspensæ, vel subdenses, quoties à parte liquidiore vi caloris innati separaret sint, tamẽ nebula alia cruditas collidit. Vetiũ per nubeculam intelligit sedimentum in primo gradu, cũ quatuor gradus sint perfecti sedimenti, ut infra patebit.

CAPVT XXVI.

Vrinæ contenta, seu hypostasies quid sint: & quæ hypostasies optimæ sint probam succi coctionem, aut cruditatem significantes.



Haecenus autem statutus, inuenio eam vrinæ partem crassam, quæ & hypostasies, & contenta appellantur, à parte alia vrinæ quidem liquidiori separatam esse Gal. verbis: Contenta namq. vocantur prout à parte liquidiori continente vrinæ cõtineantur. Hypostasies verò nuncupantur ea contenta quatenus illi atomi, seu corpora, nondum in nebula conuerfa in partem tenuiori vrinæ sũt. A vnde hoc modò hypostasies accepta communis quidem est, & vrinæ subiacali, & vrinæ moderatæ crassæ, tũ separat à parte liquidiori. Verum in plerisq. hypostasies pro sedimento, & pro suspensio, quod eneo rema vocatur, & pro nebula sublimis. Est hypostasies pro sedimento interdum appellatur, cũ in lib. Gal. ascripto de vrinis c. 40. habeatur, qualis est nubecula suspensũ & e. a. quæ in fundo est, hypostasies. Sedimentũ aut seu hypostasies nihil est, nisi vltimũ sanguificationis, seu coctionis sanguinis extremũ quod in sanguinis generatione, & partũ assimilatione naturæ cofectione relinquit, nõ ita alteratũ, ut sanguis est, ut antea ex Gal. id dixi, & quod in vrina subfides, in venis quidẽ genitum nõ extremis tãtum, neq. in vltima solũ coctione, vt voluit Auer. & Aëtius: sed in omnibus venis, ac in quacunq. coctione in venarum sinu veni causæ, & partib. gibb. hepatis celebrata, seu genita. Quæquidẽ hypostasies, vt facta sit, à calido innato omnino coequent, ac vt indicet optimam coctionem in illis humoralis iam iam facta fuisse: illa, levis, & æqualis, continuatq. esse debet, & ætenuum Hip. Vrina in febre albũ, & leue depositũ habens sedimentũ celerẽ liberationẽ denunciat. Et postea. In vrinis nubecula alba quidem, & quæ infimum locũ tenent vtilis sunt, rubra verò, nigra ac limida molestiam exhibent. Vnde quandoq. ab Hip. nubeculas aliquando depositum sedimentum vocat, vt etiam Gal. Tandem Hip. ait. Vrina aut optimã est, si sedimentũ candidũ fuerit, leuẽq. & aquale per anore tẽpũ, donec morbus indicatus fuerit: securitatem. n. ac morbum fore breuem significat: si verò intermittit, atq. interdum puram emittit vrinã, interdum subfides candidam, ac leue, morbus duratur, ac minis securus est. Gal. verò de quantitate etiam partem crassã à liquidiori separatẽ expellit respectu coctionis, quæ sit ad coctionem omnino factam considerat, exarans. Nam eũ ad huc coquitur sanguis, vrinã, quæ mingitur, leuẽ, & æqualem, & albam subfidentia ac multã facit, quod in lanis corporibus intelligit vt expressit, cum in quantitate mediocri esse debeat, & humidũ alimentĩ cocti proportionatũ sedimentum. Vnde postea addit, iam verò perfecta coctione color quidẽ vrinæ intenditur, minus autem subfides, Ratio est, quia à calore omnino coequent pars crassã quadantenus assumitur. Vnde massa humoralis magis calefit, hinc color rufus, qui subpallidus est, intensior fit, vnde pallidus euadit. Quocirca non satis est, vt vrinã mediocriter crassã, quæ separata sit à liquidiori parte, facili, seu repente, cum et alba esse debeat, levis, & qualisq. Hinc ait Gal. Non tam si et mediocriter crassa fuerit, & breue quicquid quod subfides, habuerit, iã coctũ erit: si. vel sursum borderi crassior, vel furfuribus similis subfidentibus habuerit, vel nigrũ, vel viridẽ, vel limidũ, vel sordidũ, ac prater id quod quæcunq. tales sunt cruditatis habent et alioquin sunt perniciofa, ergo coctũ vrinã sedimentũ album, & leue habet. Adde verò Gal. vt in optima coctione massæ sanguineæ sedimentum depositum etiam continuum esse debeat, inquit. Perfecta igitur coctio est, quando in vrinis subfiderit aliquid album, et leue, & æquale, & continuum, cum tale idem mentum optinũ non intermettens in agris esse debeat: namq. intermiserit, tunc humor in vna parte coctus, in alia vero parte crudus esset: Quando quidem per totum tempus vsq. ad morbi indicationem sedimentum continuum esse debet: si humores vitiosi vbiq. & penitus cocti fuerint, vt Hippocrates, & Galenus asserunt. Insuper sedimentum minime feridum esse tenetur, cum dicat Galenus, optimã verò vrinã, quæ ex præsens humor coctionem à contenti vase suspensio persequitur, est, quæ album, & leue, & æquale, & minime feridum si dimentum habet. Verum

A. Gal. eodem loco.

1. De vris. c. 2.

3. De vris. c. 2. & c. 4. de vris. c. 1. in m. 1. 2. 7.

B

1. De vris. c. 2. & c. 4. de vris. c. 1. in m. 1. 2. 7.

2. De vris. c. 2. & c. 4. de vris. c. 1. in m. 1. 2. 7.

C

1. De vris. c. 2. & c. 4. de vris. c. 1. in m. 1. 2. 7.

2. De vris. c. 2. & c. 4. de vris. c. 1. in m. 1. 2. 7.

3. De vris. c. 2. & c. 4. de vris. c. 1. in m. 1. 2. 7.

4. De vris. c. 2. & c. 4. de vris. c. 1. in m. 1. 2. 7.

5. De vris. c. 2. & c. 4. de vris. c. 1. in m. 1. 2. 7.

D

Loco citat.

1. De vris. c. 2. & c. 4. de vris. c. 1. in m. 1. 2. 7.

2. De vris. c. 2. & c. 4. de vris. c. 1. in m. 1. 2. 7.

3. De vris. c. 2. & c. 4. de vris. c. 1. in m. 1. 2. 7.

E

1. De vris. c. 2. & c. 4. de vris. c. 1. in m. 1. 2. 7.

2. De vris. c. 2. & c. 4. de vris. c. 1. in m. 1. 2. 7.

3. De vris. c. 2. & c. 4. de vris. c. 1. in m. 1. 2. 7.

Arum sedimentum etiam alio modo cõtinuū esse deinceps, nēpe vnitum, non aut diuisum. At vero hic dubium cõtinetur, an in sanis hoc sedimentum esse possit, vel tantum hypostasis sublimis, seu suspensum, quod etiam æneorema vocatur, cum nubes cal. in textu in sublimi parte vrinæ existens, ac super natans, bonam indicans cõditionem, quatum etiam cū ali bi meminerit, inquit Itaq; sapenunero (ui dixi) supernat in vrina desuper, quem ego nube. R. propriè solco nominare, quod ex Hip. sententia iam fecit. Cui dubitationi ex Gal. ipsius verbus satisfactum, asserentis in corpore sanis parte crassam copiosiorē esse in vrina, dū sit cõctio, quā perficiē facta cõctione, & signum est, quod plus copia humoris, qui crudus appellatur euacuetur, vt in pueris, & in alijs plurius cibo ventibus, & ociosis est videre: hinc et cruditatibus isti repleti sunt, & copiosiorē aningunt hypostasis, vrinaq; colore clariorē esse, vt Gal. eum locū est perlegere. Hinc ait Montanus corpus aut exaltissimè sanū non habet contenta, præsertim si rella vntur vi-
dus ratione. Et. Aut aut Gal. in text. non dixerit, quēto sedimentū neq. suspensum ited tantū nbe-
culā, & sublimamentū? Respondeo quod a Gal. nebula hypostasis appellata quidē nō desuma-
tur in vrine parte media supernatā, cū talis hypostasis sublimis a Gal. sublimamentum vocetur, &
potius deorsum tendit, quā secus. Contenta vero in superna vrine parte nubesculā nuncupare so-
lebat, cui scripserit. Sed si vis eris, si habeat sublimamentū. Intelligo sublimamentū id, quod corpulentius,
candidiusq. in vrina, neq. in summis cur, neq. in fundo vasis sed in media sede sublimis, vel exquirē me-
dij, vel deorsū potius, q. sursum existit. Et agitur solutus in nominare sublimē, sed ab Hip. ea quoq. (nube-
centia nominatur, eandē obtinentes proportionē circa vrinā, quæ vera nubescula sed aerē præferunt: ete-
nim he humore, qui circiter est, corpulentiores: cū illa aerea sunt. Itaq; sapenunero (ui dixi) superna-
tat in vrina desuper: quā ego nubesculā propriè solco nominare. Quod. nubesculæ sublimiores sunt, lo-
cum vasis supremum occupantes, eo quoq; magis de aerea vel ignea substantia continent, ac eo
minus de humore cõctio participant. Nā, vt ex antea iam ex Gal. doctrina didici est hypostasis
cõcocta talis est, vt a calore naturali in humoris cõcti superflui naturam iam conuersa est, cuius
humoris natura sua graue est ad deorsum, vt ad suum centrū, tendere. Hinc quo magis ad fundū
matellæ tendunt, eo et magis in humores cõctos conuersæ sunt. Sin aequē medium locum vrinæ
in vase possideant, æquē et cõpositæ ex substantia aerea, & ex humore iam cõcto erunt, & ve-
rificatur per id, quod Aristoteles inquit 3. & 4. cū nempe omne corpus graue, vel leue tantū de
loco habere, quantum de forma leue, aut graue habet: hinc sedimentum tantum de cõcto ha-
bet, quantum de humore graue cum aliquo leue comixto. Nubescula itaque in superiori parte
est, sublimamentum vero in medio loco, sedimentum autem in infimo residet loco.

Dubium 20 in
hominib. iur-
que quod nbe-
sculæ, id id
mibi in fardo
dipsum sit,
vel suspensum
Solutio.

Solutio 21 du-
bi medietate
a Montano
Dubium aliud.
Solutio.

Sublimamentū
quod a nebula
a Gal. vocat-
ur in media sa-
en tate q. po-
tius deorsū quā
sursum & cõco-
cto quoq. ap-
pellatur.
Cui cõiecta quo-
magis ad fon-
dem itatem, eo
magis et cõco-
cto humore
cõposita.
De cõcocta ve-
rina sedimentum
habet, deposti-
ta vrinā, vt de
suo possidet
grauē in fundo
residens.

C A P V T XXVII.

Vrinæ contenta in nebula, in suspensum, ac sedimentum secantur, pro vt
tres succorum in vasis omnibus cõctionis gradus indicant: hinc
de istorum natura agit.

IRes autem cõctionis humorum gradus ex iam positis inueniuntur, quatenus tres lo-
ci sunt vrinæ in quibus vniūtur particule partis crassæ a liquidiori separare; sicut tres
loci sunt in vrina, in quibus separatur pars vrinæ crassā a liquidiori parte, & in qui-
bus vnitur, veluti nebula in aere, aut propē terram, aut super terrā. Hypostasis enim
alta, quæ sublimis pars seu sublimata, & nebula quoq; appellatur, quæ potius cruditate ostendit,
& quæ a materia sit pituitosa, dum ipsa pituita sursum fertur, & a calore igneo putrefacit,
& simul a calore naturali aereo coquente, ac etiam ipsam penetrante pituitam, hinc cum pi-
tuita ipsa permiscetur, & ex patua sit ampla, ex graue leuis: vnde constat, intumesce, ac eleua-
tur a calido eo valido, eleuante, iam cõcoctionem aggresso: Sin hypostasis ea sublimis non
alba fuerit, quippe veluti fumea, seu fuliginosa, aut rubea, vel lutea, tunc humor viscosus est, qui
vel adultus, aut bitiosus ad calorem igneo inordinato alia nihilominus sit etiam a calore naturali,
cum eo igneo commixto, aereo, tumefaciente, & eleuante, vt ex Gal. 1. prog. 26. a quo etiam ea
separatio fit. Quam obtem talis nebula alta, nigra, aut rubea, aut lutea in morbis, & morbi quidē
dem acutum, longitudo nemq; ac difficultatem morbi denuntiat. Verum multo deteriorē in nu-
ciat, quoties circa vrinæ superficiem hypostasis fuerint diuisæ, vt granula diuisa nigricatiā
spiritu luteo plena: tunc enim ab ingente calore igneo humor aduritur, & solida liquefunt
corpora, cuius rei cum meminerit Hip. lib. prognos. p. 49. ex Foel. ait, in vrinis autem, quæ nubesculas
habent, considerandum venit, an supernæ, an infernæ ferantur, & quosnam habeant colores, & quæ quidē
deorsum ferantur cum dilis coloribus bona censenda, & commendanda, quæ sursum ferantur
mala, & vituperanda. De secundo verò loco, in quo suspensum, aut sublimamentum, seu æneorema
apparet, eadem sanè est assignanda causa, & non nisi gradu, ac secundū magis, & minus a nebula
differat alia; Pariter i tertio loco laudabile residet sedimentū, quā ibi spiritus calidi innat, & igneus
calor humores non eleuat putreficētes, vt suspensū, quatenus calor igneus minus est, & naturalis

Nebula subli-
mis in parte su-
periori crudita-
tem parit, ete-
ra. Et quo san-
nula est ea ne-
bula alba est a
pituita cruda
fit.
Si vero fumida
vel fuliginosa
seu rubea sur-
sum ex nebula
a quo humore,
crudo, putrefa-
cit. Et quid in au-
tu morbi deorsū
ferat.

Quid obtem
ipia nebula di-
uisa, vt granu-
la deposti-
ta vrinā, vt de
suo possidet
grauē in fundo
residens.

Tomus Tertius.

E 2 maior:

4. De san. iur.
p. 4.
Com. 1. prog. 16.
3. De sublimi.

3. De vrinæ 1.
ad finem.

Com. 1. prog. 16.
3. De sublimi.
p. 4. de vr. 22.
in med. 7.

Lib. de vrina
Gal. alioq. p. 39.
3. De vrinæ 1.
p. 4. de san. iur.
p. 4.

De forma in-
ter inflectionem
medii loci, &
inter inflectionem
superioris loci
inter inflectionem
inferioris loci
inter inflectionem
inferioris loci
inter inflectionem
inferioris loci

De forma in-
ter inflectionem
medii loci, &
inter inflectionem
superioris loci
inter inflectionem
inferioris loci
inter inflectionem
inferioris loci
inter inflectionem
inferioris loci
inter inflectionem
inferioris loci

De forma in-
ter inflectionem
medii loci, &
inter inflectionem
superioris loci
inter inflectionem
inferioris loci
inter inflectionem
inferioris loci
inter inflectionem
inferioris loci
inter inflectionem
inferioris loci

De forma in-
ter inflectionem
medii loci, &
inter inflectionem
superioris loci
inter inflectionem
inferioris loci
inter inflectionem
inferioris loci
inter inflectionem
inferioris loci
inter inflectionem
inferioris loci

De forma in-
ter inflectionem
medii loci, &
inter inflectionem
superioris loci
inter inflectionem
inferioris loci
inter inflectionem
inferioris loci
inter inflectionem
inferioris loci
inter inflectionem
inferioris loci

maior: vel quia humor coquendus minor in quantitate est in nebula, aut quatenus minus opposita, repugnantiaque: minus ascensum habet, ut elementis coctus magis ascendit nebula. Ideo et differt suspensus à nebula alia in eo, quod magis de humore cocto participat, quod nebula, ut ex Gal. colligitur quod crit, quando alias conditiones cocti sedimenti habebit: & sicut de co spicem naturalis, ita et de calore igneo eleuante, corruptumque intelligas. Ica. n. de sedimento repente in tertio loco assidentum est, tum fit in fundo matellæ, tum prope fundum, ubi magis de humore partici pat cocto, quam in secundo loco, & ita secundus locus habet maiorem humorem coctum, quod primus, cum vrinæ contenta sua natura quidem tertia sit: hinc in fundo residet. Vnde nihilat- nus per se eleuatur nisi à calore, & à spiritu. Verum inter ceteros locus non est solus in fundo, at à fundo usque ad quartam partem matellæ inferioris, qui totus occupatur à sedimento cocto: va- rum tantum in hoc tertio loco hypostasit coctionem in venis factam esse significat, quæ hypo- stasit à quocumque humore, iam cocto, & in humorem conuerso fit, assimilationem, & sanguinis perfectam generationem refugiente, ut Gal. 1. prog. 2. 42. & 2. de cris. 12. partem verò esse debet ac- rea talis hypostasit, ut Gal. 2. prog. 2. 26. hinc sursum eleuata ob substantiam aeream calidi innati- ti, coquens. Ea propter quartus locus in vrinæ cyathodator in fundi superficie nimum vasit, in quo contenta vrinæ sunt sine eleuatione vlla, & absque vlla nebula: si autem nullo modo neque coqui possint, neque sublimari, sine subleuari à calore naturali aere constant, tum faciente pene- trando, ac eleuante, à calore præternaturali, vel à matellæ malitia, seu à matellæ peccantis crude quantitate comprimente, ac suffocante victo, ac superato, tunc aliquo alio modo resolutio, ac imbecillitas, qui concoctionem aggredi minime potest, hinc et non separat terrea excrementa, ponderis causa à liquidiori parte separata. & contenta talia solum in ægris inueniuntur, ac in pu- tredine graui: cum tria putredinis genera sint, quia & excrementum vel coctum, aut semiputridum, vel prius putridum est. coctum aut excrementum fit à naturali calore omnino vincente calore putredinali, ac tunc contenta in tertio conspiciuntur loco, à liquidiori separata parte, & in- quandā sunt conuersa nubeculam, quæ hinc octo habet conditiones, nempe alba est, leuis, lenis, non aut grauis, nec aspera, præterea continua, & vnitā, non aut intermittes, nec diuisa. Insuper de- bet esse æqualis, & non stygia continua nempe semper eodem modo, non aut per intervalla, nec intermittes, sed semper tali, & quantitati humiditatis assumptæ, ac in sanguine coctum quæriti pro- portionata: Vnde multa esse non debet. Ac denique figure pyramidalis apparet conetur. At vero putridum, & omnino crudum contingit dum calor naturalis debilis à putredinali calore aliquo mo- do superato, ac victus sit, ac tunc in quarto narrato contenta sunt loco. Mediū vero putridum si- mulque semicrudum fit quoties semicoctum vna & semiputridum oritur, & dignoscitur dū contenta eque tam bonæ hypostasit, & coloris mali vrinæ conditiones habuerint. & si vix verò flatuos pen- tende conditione leuis esse separata à conditione lenis hypostasit, cum nubecula esse debeat parum leuis, non autem penitus grauis, ut residentia combulla binitio putrida, seu colligata sunt in maxima incendio.

A

Com. a. p. 2. 26.

B

Gal. prog. 2. 42. 2. de cris. 12. Gal. stig. 2. 40. Gal. & Hipp. 2. prog. 2. 46.

C

C A P V T XXVIII.

Contenta alios duos habent gradus. Vnde de corona, ac de circumagenti- bus vrinæ agitur, ac magis vrinæ nubecula explanatur.



De corona.

Coronæ natura fit cunctis vrinis.

Vperiunt autem due res in vrinæ massa, & cruda declarande, vltra sublingale vrinam: nempe coronam, & circumagentia, ad integram, & exactam cognitionem hypostasit coctæ vrinæ explicandam. In media enim regione vrinæ, & matellæ præter ætateam vel sublimamentum à grecis vocatum, seu suspensum à Latinis, etiam coronā conspiciunt interdum, quæ est circulus quidam per simplicitatem illius oculis metibrem, quæ, ut ait Galienus, nonnulli verò coronam no- minant, quasi regiam capitis coronam, vndeque circuli figura non precul à loco vasit continetur, quæ veluti ctenus partem vrinæ liquidioris in circumambiens se habet, qui vltius est, ac diutius- scilicet quandoque: ita verò coronā à calore quide igneo colligatur, seu colligante humidā, vel nutritoriale, vel etiam sublimaticum in solidis corporibus, vel etiam in specie camola- tussens & content. Vnde ex quo ipsa coronā quidem substantia est quadantenus crassa, & vincto- sissima, hinc etiam partim aerea, partimque humoralis: Humidum enim, quod à calore co igneo liquefit, cor potam certe solidum, speciemque catosæ pars humidior, finior, ac dul- cior est, hinc etiam crassa, viscidā, & vinctuosa necessitudo est: quæ pro corporis nutritione parati- tiam cras, ut in febribus colligatur apparet, ac in febribus hæticis, in quibus humiliter sub- stantia consumitur, in terra specie hæticæ præsertim, ac in secunda specie tertiam speciem: Vtrum enim vero aduerte partem vinctuosi in ea coronā hanc manere, sicut in vcinis pingui- bus manet, immo à calore igneo ingratissimo separatur pinguis: hinc ad sublimem partem, ut oleositas in vrinā minime ascendit; verum tantum ad mediā ascendit regionem ea pars cras- sa, &

Lib. de vrinis 2. 40. 2. de vrinis 2. 40. 2. de vrinis 2. 40.

D

Asa, & viscida, & ista corona omnino præter naturam est, rationibus iam allatis. Contenta autem, circumagente in proflus quoque præter naturam sunt, nullumque certum occupantia locum in matella vtriusque ubique sunt abique: vnde separatione partis crassæ, a parte liquidioris vtriusque, quæ habet inter mediores crassam & claram, ac inter valde crassam, ac turbidam; ac ista quidè ex secundo ac tertio genere composita semper inuenitur putredinis, aduersionis, & colliquationis, ubi æqualis pugna, adest inter calorem naturalem æreum, ac inter calorem igneum præternaturalem, & ubique est agitatio materiæ a calore igneo facta, ac similiter ubi tentat natura coctionem illius materiæ agredi, verum nequit impediri a suo æquali contrario: vnde eam partem crassam ab alia liquida tri segregare nequit; hinc agitata sunt ea contenta, & agunt, & reagent, sicuti actio, & reactio quoque calidi innati, & caloris præter naturalis æqualis est, vnde mouentur talia contenta circumagendo circa latera matellæ ob spiritum flatuosum in ijs contentis in ea agitatione introclusum, ac propter plurimum igneum calorem violententer eam materiam peragitantem, ac inæqualiter mouentem etiam multiformiter producit ea contenta, multique in locis inæqualiter: hinc inæqualiter etiam contenta ista agitantur, sensimque sicuti perfrigerantur, ita a spiritu flatuoso, vt euaporoso, ex quo constructa sunt etiam conuelluntur, ac euanescent respectu partis leuiss: Pars verò grauis combusta, aut putrida; aut colliquata horum contentorum, ex tertio genere **B**re dum vrina perfrigerit, ad fundi superficiem vt ad quartum locum descendunt. Vnde talia contenta omnia non multo temporis spacio in media regione vrine permanent. At ista contenta non dum penitus vita, semicrudam materiam indicant esse, ac inter spem, & metum euentus rem se habere denotant, ac talis vrina praua est, cuius cum meminerit lib. Gal. scripto de vrinis cap. 39. ait. *Vrina verò, in quibus nihil residet sunt omnino praua ibi per se sedet, nihil separatim intelligit: Cæterum hæc me dixisse volui ad integram sedimenti, nebulae quoque improprie dixi, vrina à Galeno posita in textu, in tertio matellæ loco residentis doctrinam acquirendam.* Quod sedimentum tantò magis participat de forma perfectâ, quanto magis in parte inferiori illius loci erit, tunc enim magis de concoctione perfectâ humoris habet bit, quo grauior fuerit, dum tamen ea grauitas sit vna cum leuitate in ea nebula semper sursum tendente, & in qua leuitate etiam figuram pyramidalem faciens sit virtus in ea nubecula, seu sedimentum perfectum tres, aut quatuor gradus perfectionis habeat, & ait Gal. quod satis est, quod habear primum gradum ad coctionem perfectam ostendendam saltem venturam, ac imminente m.

De vltimis circumagendis.

Circumagente ista quod dicitur esse circa crustam introclusam.

C A P V T XXIX.

Cruditarum notæ, ex vrina subiugali à Galeno ex haustæ, explanantur.



Aterum iam tempus est, vt ad reliqua accedamus à Gal. posita in tex. de notis cruditarum dilucidandis, & per vring significationes capiedis. Ideo pergit Gal. inquires. *Quid si turbida sit, qualis veteriorum nistur crudis refertas venas indicat, non tamen cessare naturam, sed eos valenter concoquere.* Hanc vrinam etiam alibi posuit, ex arans. Nam, quæ hæc ipsa et affior est concoctionem imperfectam significat. Cum dixerit deinde. *Adhuc contrubata est, cuius meminit Hipp. & idem Gal. crassas & fuisse indicet, nec subsidisse vrinas planè sunt illæ ex contrubatis &c.* Cum duo crudarum vrinarum genera seorsum contraria sint, alterum quorum in vrina substantiæ consistentia, in renuitate consistat, quæ vt nihil à calido innato alterata, neque cocta: hinc etiam nihil in humore reddita se habet. Alterum verò ex Hipp. quoque sententia in nimia crassitie reperitur, vt vrina contrubata, seu turbida ab Hipp. appellata: hinc ait Gal. cum crassas etiam fuisse indicet, nec subsidisse vrinas planè sunt illæ ex contrubatis, ac turbidis, vt solet hic appellare, quæ semper vtationem crudam, amittant multo præditam spiritum flatuoso, vt multum, vt antea iam posui. Horum autem duorum generum crudarum vrinarum meminit, inquires. Nam quæ hæc ipsa et affior, aut tenuior concoctionem imperfectam significat, si quidem altera non dum in humorem contrubata est, altera verò adhuc contrubata est, vt antea dictum est, dum inculpatæ vrinæ, seu perfectæ, & coctæ crassitie mediores subsidentem, seu separantem posuimus. Nam per nec subsidisse vrinas. Hipp. & Gal. intelligunt, vt vrina illæ partem crassam à liquidiori parte segregatam ita, vt crassa ista subsideat, vt infra magis patebit: Vnde tales vrinæ crude sunt prout concoctionem in perfectionem in venis indicet, ob crudam vtationem plurimo flatuoso spiritu plenam, factamque à calore igneo præternaturali violentem humores in venis peragitantem, mouentem, & conuassantem: et si natura adhuc aggressio, coctionem inisset efficaciter conquiret, quia natura humoribus prædominatur. Postea ait Gal. si verò celeris separatio crassi à liquido in ea cernitur, siquid quod subsidit album leue, & æquale iam iam superatam eos omnes naturam indicat, cum vt inarum turbidarum, subiugali nunc tres differentie sint, cum dixerit Gal. cum triplex sit vrinarum turbidarum differentia, quia vel, cum tales mellæ fuerint, paulo post resident, vel paræ quidem permanent: vel paræ quidem minguntur, postea verò contrubantur. Præterea quidem ex dictis tertia: minus aut prima: media verò inter vtatque, secunda. Quoniam, quæ

Concreta.

Tenues & contrubata.

Turbida vrina Hipp. in agro 3. lib. 3. de mor. sect. 3. & in agro 6. lib. 1. de mor. sect. 3. & in agro 7. lib. 1. de mor. sect. 3.

Vrina subiugali quomodo cruditas detemner.

Tenues & contrubata: Subiacet illi vrinarum triplex differentia: quia vel, cum tales mellæ fuerint, paulo post resident, vel paræ quidem permanent: vel paræ quidem minguntur, postea verò contrubantur.

4. De iura. lib. 4.

3. De iura. lib. 3.

3. De mor. vel. 3. lib. 3. de mor. 3. 4.

1. Gal. de crass.

3. Hipp. locis an. 3. mor. 3. 4.

3. De mor. vel. 3. lib. 3. de mor. 3. 4.

3. De mor. vel. 3. lib. 3. de mor. 3. 4.

3. De mor. vel. 3. lib. 3. de mor. 3. 4.

3. De mor. vel. 3. lib. 3. de mor. 3. 4.

3. De mor. vel. 3. lib. 3. de mor. 3. 4.

3. De mor. vel. 3. lib. 3. de mor. 3. 4.

3. De mor. vel. 3. lib. 3. de mor. 3. 4.

3. De mor. vel. 3. lib. 3. de mor. 3. 4.

3. De mor. vel. 3. lib. 3. de mor. 3. 4.

3. De mor. vel. 3. lib. 3. de mor. 3. 4.

3. De mor. vel. 3. lib. 3. de mor. 3. 4.

3. De mor. vel. 3. lib. 3. de mor. 3. 4.

3. De mor. vel. 3. lib. 3. de mor. 3. 4.

3. De mor. vel. 3. lib. 3. de mor. 3. 4.

3. De mor. vel. 3. lib. 3. de mor. 3. 4.

3. De mor. vel. 3. lib. 3. de mor. 3. 4.

3. De mor. vel. 3. lib. 3. de mor. 3. 4.

3. De mor. vel. 3. lib. 3. de mor. 3. 4.

3. De mor. vel. 3. lib. 3. de mor. 3. 4.

3. De mor. vel. 3. lib. 3. de mor. 3. 4.

3. De mor. vel. 3. lib. 3. de mor. 3. 4.

3. De mor. vel. 3. lib. 3. de mor. 3. 4.

3. De mor. vel. 3. lib. 3. de mor. 3. 4.

3. De mor. vel. 3. lib. 3. de mor. 3. 4.

3. De mor. vel. 3. lib. 3. de mor. 3. 4.

3. De mor. vel. 3. lib. 3. de mor. 3. 4.

3. De mor. vel. 3. lib. 3. de mor. 3. 4.

3. De mor. vel. 3. lib. 3. de mor. 3. 4.

3. De mor. vel. 3. lib. 3. de mor. 3. 4.

A flatus causam materiale[m] esse, frigiditatem vero, & efficiem causam esse perduratiōis fluxus, & interdum eam materiale[m] causam, & efficiem iuvare. Cui dubio respondeo fluxum oriri

24. Mch. 27. 1
25. Mch. 27. 1
Ann. lib. 2. f. 2
doft 1. 2 p
26. Dec. 27. 1
de m. 3. de m. 2
ed. 2. 2. 2. 2. 2. 2
Hip. 1. 2. de m. 2
p. 274. ex. 2. 2. 2. 2
de p. 275.

Ibidem p. 346.

3 De Din noch
a. e de a. de Din
taren c e de p de
1-2. off. c e de 1
de Symp. caud
E 4-

2. De Symptomen
kap. 4.

3. De firma caud
e.a. & progn
8. 43.

9. De Groot, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2

1. Deceitless

Lib. de pten. c.
12. § 1. meth.
1844. 8.

Melancholia pl.
nunc fructu
r. *Elaeagnus* L.
Olea generatio-
nata *Silene* *mar-*
ne *vales*. Ideo in
fructu est flava
et in fructu me-
lancholia fr. &
acriditas fructus.

Vinla cruda me-
lissa à malva
fiava ou spina
fiavola di per-
messo emaglie,
no calce de dila-
tationem peragi-
tata em cruce o-
ra & vinla &
quatenus con-
comitacione.

Turbatio va-
leatone natura
Inconueniens va-
lido non fuit
tamen etiam
in facibus co-
pis pectus.
Ait dicendum
vix talis vali-
tus Gomeris
non sit validus
per facibus co-
pis cordis
equidit inuen-
tione.

Horum humorum concitatio fit in nequitiis, cum prius ea vitia turbatio periculis sit, ut horum concitatio patitur propterea ut subito accitiora superueniant, si sepe animus indurgetur.

[illegible][illegible]

vbi urina elara mingitur mox turbescit: Hinc urina turbida emicla, quæ similis etiam manet, prava quidem est: At uero tertia utique pessima se habet: terti quandoque etiam eum tali-urina aliquos ægros sanitate restitutos fuisse explorarum habuerim: existit tamen uirtute pulsus, calidi innati, cordi implantati ualida, ac ratione uehe nentia symptomatum in augmento morbi est: cum dicat Gal. Nam & longiori tempore, & uirtute forti indiget ad concoctionem: Idco si hec urina in morbi principio contingerit adhuc longiori tempore indigeret respectu copiosioris matæ: & uide, coquenda, cum ipsa urina tertia tantum in ægris fiat. Concludit autem Galenus in tex. de prima differentia inquiriens. Ergo si proximus separatio fiat: & quod sui sedis sit album, leue, & aquale, superiorem longe naturam succi quæ concoquit ostendit: Si uero bonum sit, quod subsidit, sed quod post longius interpositum tempus colligatur etiam naturam temporis spacio separaturam succos nutriat. Et propter semper tenemur nos eam separationem partis crassæ à liquidiori parte factam, & eam sedimenti collectionem explorare in urina turbida, quod etiam in alijs urinis verum denotat: Cum non satis sit bonum sedimentum in urina crudorum succorum in sanguinem iam conuersum confectionem in venis factam ostendens, quia requiritur etiam celeritas temporis, quæ sedimentum bonum nutriat, quæ naturæ superant succi crudis, & coquentis prædominium significat. Quamobrem sedimentum bonum celeriter collectum superiorem valde naturam cruditate humorum, quos concoquit esse, nos docet: & iam iam superaturam prorsus eos omnes humores crudos naturam indicat, ut antea in tex. exarauit Gal. Sin sedimentum bonum fiat longo temporis spatio naturam quoque temporis decursu tantum superiorem fore, & concoctionem aggressuram insinuat. Ideo subinde ait, si uero vel omnino nulla separatio, vel id, quod subsidit malum sit, imbecillitas naturæ significatur, & et quæ ope aliqua ad succos percoquendos. Nam si in ægris nulla separatio sit, tuos enim spiritus calidi innati vna cum parte solida cordis simulque spiritus calidi influentis venarum, & articularum consequenter quæ totius corporis, qui in sua qualitate rum prima, tum secunda originali a erea beoarticit, ac refrigerantibus, tum epichematibus refrigerantibus, & cardiacis conseruandus: similiter etiam in quantitate: Igneus namque factus calor is, corpus nostrum corruptit, & liquat, ut ignis ligna, & adipem urit, & liquat. Sin quod subsidet malum sit in sanitatis tuitionis methodo, aut si aquosa vena, & alba cū tenuitate, & copia cruditatum magna fuerit, vna cum viarum stipatione, & parte affecta suo calore naturali proprio præcordiorum priuata, ac imbecillius reddita, quæ neque coquere, neque expellere potest, moderatè calfacientibus, laxantibus, digerentibus, ac resoluentibus sine attritione eam partem fouere tenemur, ut particularius loco proprio dicam. Hæc itaque executioni mandare tenemur, ad iuuandam debilem concoctionem, si vel omnino nulla separatio, vel id quod subsidet, malum sit: Tuos enim imbecillitas naturæ significatur. Quocirca eget ope aliqua ad succos percoquendos, cuius signi meminit etiam alibi, dum posuit notas perfectæ coctionis, debilis coctionis, ac mediæ coctionis per urinas acquirendas, hoc modo. Debilis uero coctio est, quando ex aqua mediocriter subpallida facta fuerit, & quidem si turbida apparuerit, & talis permanferit, & rufa etiam, ac tenuis ex eodem genere est, ut etiam posui antea: vbi etiam perfectæ coctionis, & mediæ coctionis notas à Gal. statutas innemias.

CAPVT XXX.

Concludit Galenus ita veras esse cruditatum, & concoctionum notas generis venosi, sicuti veræ sunt cruditatum vniuersi corporis notæ sudoris, ab eo antea constitutæ.

Hinc vbi non
te notæ ostendit
cruditatem
& concoctionem
notarum vniuersi
corporis
notas corporis.

Pergit autem Galenus in textu: Sicuti uero urina succorum, qui in vasis sunt, qualitate prouidus: ita sudor, aliaque, quæ per vniuersum animalis habitum apparet eos, qui illi sunt affectus demonstrant. Sciatutis enim notis cruditatum in secunda regione existentium. Concludit eas urinae notas esse veras, sicuti notæ ab eo iam posite cruditatum vniuersi corporis à sudore desumptæ veræ sunt.

A

C A P V T X X X I.

Cruditatum primæ, secundæ, tertiæ, & quartæ regionis simul notas ex caloris, & frigoris sensu, & ex colore totius habitus corporis Galenus declarat.



His autem secundæ regionis cruditatum statutus: Proponit, se possumus esse notas cruditatam non modo in ea primæ, & secundæ cruditatum regione repetitum, verum in singulis, ac tertiæ, nec non quartæ regionis, per affectus universi corporis humani affluendas. Atque id prius per primas qualitates actiones efficit cum dixerit. Quippe superantibus in eo calidis succis insolito coloris sensu vergens: frigoris verò quum frigidis domuantur. Subinde autem idem per colorem in universi habitus corporis explanat, cum exaraverit. Tam albiore pituita superante sicuti qui pallidiores sive bilis abundante cernuntur. Quod si meracior bilis sit etiam plane flaviores, & ratio ab eo redditur, si quidem color à succo provenit non ex solidis animalis partibus, utique quum se succi in altum naturaliter non receperunt. Sicuti etiam de sudore antea dixerat ex solo colore pallidus pro bilis ratione apparet, &c. Meracior autem bilis nempe sincerior absque putre mixtione, quæ in pallida continetur, flaviozem efficit habitum. Pro alio vero cutem intelligit, partes solidas, & speciem carnosam circa cutem existentes, sicuti per contrarium pro profundum genus venosum intendit.

Carnalis.

Ternus & com-
mentus.Ternus & com-
mentus. A
Carnalis pro
venosus a
finito venosus
non à putredine
bilis nec à spu-
ritu carnis.In 1. de m. vul.
com. 1. 1.

C A P V T X X X I I.

Cruditates mordaces, & calidas ab accidentibus, à calore exortis dignosci posse sicuti cruditates pituitosas, & frigidas ab accidentibus à frigore productis notescere posse Galenus demonstrat.

C



Ceterum cruditas in partibus solidis, & in specie carnosæ, ac in venulis exterminis harum partium existeret, si fuerat in cerebro, ut in parte organica, animi quidè affectus seu imaginatio depravata fieri, si per partes subiculosas transmutaretur pituita vitrea, aut alia frigida, rigores per totum corpus hunc: cum dicat. Accidit verò id illis propter frigora, rigores vel animi affectus: veluti timores, vel ingenium tristitiam, vel insipientem verecundiam quorum nullum si adsit, nunquam se in altum recipient succi, æque neque in cutem violentius irruentes hanc adurunt: tanquam, nisi animus aliquo modo affectus sit, aut alia immodico animal extrinsecus oblesum. Ergo vehementer commotis, aut iratis, aut in pudore veluti reciprocatibus se humoribus inspicere colorem non oportet. At si nec ambientis violentia calidi, frigidiq; nec vilis animi affectus, emendatam iam distulit ubi subsistit sicuti succi animalis cognitio ex colore datur. Quod pituita frigidissima nempe vitrea sicutum timiditatem quidem seu pavorem efficit, si in cerebro fuerit iam antea dixi cap. 17. ubi de ichoribus egit ex Hippoc. & Gal. mentio non tamen vigiliam, nec animi perturbationem, nec motum cum terrore, quia in eo terrore est, & frigus tantum, non autem mordacitas, nec malignitas: Acidæ verò, & salte pituitæ, sanem animi perturbationem, ac motum cum terrore, vigiliam, & pavorem efficiere par est: Bilis verò flava, ac eius ichor, atque bilis serum timorem ingentissimum, ac maxilliam faciunt, ob adustionem fuliginosam obcuram, & acridinem horum succorum, & vigiliam, delirium, phrenesidem, furor, animi perturbationes, & motum cum terrore producunt. Verù bilis flava, & atra, ac eorum ichor, per se, timorem gignunt, maxilliam vero per accidens, & consequenter timorem ut Gal. in sermone de morb. vulg. c. 2. 38. Melancholia verò utranque æque per se gignit 3. de loc. aff. 6. item vigilias, & motum, ac perturbationem animi eum terrore, & insipientiam, verecundiam, ac insipientem demenciam facit, ut Hippoc. in Ephro. ad Dem. Regem. Quocirca quilibet eorum crudorum succorum, qui in cerebro fuerit, eius officium, cerebrum legendo, producens in inest habitus, ab actione lesa animali depravata, aut diminuta, aut abolita, & oportet, ut illi affectus sint præter rationem, non autem cum ratione, ut in iratis &c. neque ut sit passio non perdurans, immo passibilis qualitas perdurans sit accidentalis, dicit autem Gal. propter frigora, rigorem quia 2. de diff. feb. c. 6. ait. Acidæ verò, ac vitrea pituita, si in perscitate corporis partes deseratur sine febre rigores generat, salta verò non rigorem, sed horrorem cum febre efficit de quatuor: antem horum humorum plenitudine improprie vocata ait Gal. Si verò etiam, admodum creverit talis plenitudo, tum & coris illis gravitas inest, atque ad motus pigritiam tum mentis tarditas, & sensus debetudo.

Carnalis.

Ternus & com-
mentus. Bilem vel an-
imi affectus pro
partem rigoris à
frigiditate. In cerebro pi-
tuitæ vitreæ
horum exortus
quod facit.4. De mor. fin.
c. 4.In 6. de mor. vul.
c. 1. 1.6. De mor. fin.
c. 1. 1. de m. vul.
c. 1. 1. de m. vul.
c. 1. 1.4. De mor. fin.
c. 4.De em. m. per
frig. m. l. 1. in
fin.Bilis flava &
sua ichor, & a-
tra bilis ichor
est dicitur quod
gignit de melius
cholæ.Ternus & com-
mentus.

CAPVT XXXIII.

Cruditatum vniuersi corporis notas antea partim à Gal. explanatas, adhuc ex colore habitus totius corporis, Galenus manifestat.

Conuenit.
Notæ crudi-
tationis im-
positæ ex coloribus
Totius & co-
mpositæ.
Quæ notæ à co-
lore. ex his autem
coloribus sunt
inter eos quos
pater naturam
à cruditate ca-
lidi emittit.



Enique Gal. proponit, notas cruditatum in vniuerso corporis habitu residentiū, per colores capiendas omnino esse; quas ante promulgare cæperat: ait ergo cognitionem per colores acquisitam certissimam esse: Ideo pergit inquirere. *Tamquam igitur corpus sicuti albus solus est effectum pituitas abundare succum indicat: sicuti pallidus, aut flauus biliosum: ita sicuti ad rubicundum quam pro natura, est mutatum sanguinis abundantiam subesse significat: sicuti ad nigriū nigrum superesse bilem ostendit.* Videas præterea exemplū colore aliquando nōnullos habere: nōnullos aliquando ceteramixturam esse albi, luidique: aliquando liuorem solum sine albo consistere: Ex quo eiusmodi colores crudos dominari: succos indicant. Hic finem posuit notas cruditatum laturandi: & cum hæc pars ex se ipsa clara sit, nullam explanationem ingreditur: Tria autem multi notatu dignissima sese offerunt, quorum primum est quod sicuti in toto corporis habitu color denotat crudelitatis speciem piosā, ita in cute capitis, in alopecia cognoscitur cruditas, quæ in causa est alopeciz, vbi ait Gal. *Qui in alys confectim albidior est, in alys pallidior, & alys vero nigrior. In quibus igitur entis in capite color apparet albidior à corruptis pituita in cute ea capitis, non autem in cerebro, tunc enim lethargus foret vitium esse indicat, in quibus autem color apparet pallidior utendum medicamentis, quæ pallidam bilem vacuant: sicuti in, quæ nigram vbi color apparuerit nigrior.* Secundum est, vt habitum, ponat magis æquo rubicundorem, tanquam signum notificans sanguinem crudum copia prædominari: Vnde sanguinem crudum abundantem, vel tenuiorem esse patet, cuius meminit Gal. vel sanguinem consistentia moderata, cuius intelligit hic Gal. meminitse, sicuti etiam de eo intōdidi Hip. alloqui, dum habitum rubrum, immo magis iusto rubicundorem statuit: & etiam Gal. alibi posuit, vt signum etiam plethoriz: Sanguis vero crudus is quidem est in prima differentia cruditatum tum pituitosarum, tum mordacium, in qua audacter sanguis detrahendus, cū valde à natura confecti sanguinis minimè distet, vt ait idem Gal. Tandem interdum habitus albidior à pituita falsā quidem prodit: & corpora squalida sunt ista, & calida valde, & sicca non autem frigida, & humida, & hoc admodum valet, ne decipiamur.

A color digno-
ficat: à quo em-
it color alopec-
ia hæc.

Sanguis crudus
qui non intol-
ligendus sit.

Cruditates ob-
structionis effi-
cetes à crudis
dignoscuntur.

Hypochondria
turgida & in-
flata à fluxu veni-
æ crudis ostenduntur.
De loc. aff. c. 6.
& c. 7.

CAPVT XXXIV.

Cruditatum obstructions, tensiones de gignentium in partibus solidis, in specieque carnosa, in extremisque venulis secundæ cruditatum regionis notæ explorantur.



Atterum superest, vt cruditatum obstructions, seu tensiones in corporibus solidis, specieque carnosa, ac in eorum venulis extremis producentium indicatua exploremur signa. Cum hæc cruditates eas facere possint obstructions; vel sua copia peccantes, seu crassitie, aut viscositate, seu glutinositate, ac lentore; copia autem peccantes sunt vel eruentes, quæ à rubea urina dignoscuntur, vt ait Gal. binc venæ sectioni inter præsidia præfertur ad obstructions eas attingas, etiam si nullius plenitudinis signa sint, vt ait Gal. vt principale remedium hinc fortassis plethoriz signa quousque: Aut copia non eruento colore peccant, immo albe sunt, huc flauæ, aut nigre, et si præsertim albæ, in quam curatione venæ sectioni principaliter minimè conueniat: rem autem ceu præsidia, sine quo obstructions ab ijs cruditatibus prodire, tolli non possunt: Cruditates enim istæ copiosè plene venæ sectioni cedunt, quam pharmaci purgantibus, antequam præparantibus vtantur, vt ex Gal. & Hip. colligo, quod etiam in morborum inflammationibus verissimum est, vt iam lib. 3. de mor. mag. sang. iam dixi. At cruditates istæ dignoscuntur à tensione partis spongiosius sua natura, patet, vacuæ, raræ, & mollis, iam plena, densæ, duræ, & magnæ sætietis nec non à spirituosiss, seu leuissimis distentionibus in extremis valorum parietibus angustis, cretis, cum grauitatis sensu, vt patiens cogitur ea parte graui decumbere. *Quod si habueris quos spiritus, em non patet ex his ibi concludatur non solum grauitas, sed tensionis etiam sensus sequitur.* Ideoq; Gal. 4. de tuen. san. c. 4. et alia hypochondria à fluxu turgida, & inflata appellauit vt lib. 6. c. 12. de iac. & lib. 4. c. 18. In talibus itaq; hypochondrijs, ne dum grauius dolor, verum etiam dolor extensus sit; & hæc id de hepatis obstructionibus statueret intendat Gal. nihilominus etiam idem de liene, menterero, & pancreo, vtero, ac de alijs partibus intelligendum venit. Pigeret à ista actione partis influmtalis cognoscuntur, & ab extremis ex euntibus mutatis, & ab accidentibus, quæ sequuntur, ex ista

4. De tuen. san. c. 4.

B

De remedijs quæ
sunt facilia c. 6.

Gal. 4. de tuen. san. c. 4. de tuen. san. c. 4. de tuen. san. c. 4. de tuen. san. c. 4.

In 3. de tuen. san. c. 4. de tuen. san. c. 4. de tuen. san. c. 4.

3. de tuen. san. c. 4.

4. De tuen. san. c. 4.

4. De tuen. san. c. 4.

3. de tuen. san. c. 4. de tuen. san. c. 4. de tuen. san. c. 4.

In 3. de tuen. san. c. 4. de tuen. san. c. 4. de tuen. san. c. 4.

D

3. de tuen. san. c. 4. de tuen. san. c. 4. de tuen. san. c. 4.

3. de tuen. san. c. 4. de tuen. san. c. 4. de tuen. san. c. 4.

Gal. 4. de tuen. san. c. 4. de tuen. san. c. 4. de tuen. san. c. 4.

In 3. de tuen. san. c. 4. de tuen. san. c. 4. de tuen. san. c. 4.

3. de tuen. san. c. 4. de tuen. san. c. 4. de tuen. san. c. 4.

3. de tuen. san. c. 4. de tuen. san. c. 4. de tuen. san. c. 4.

3. de tuen. san. c. 4. de tuen. san. c. 4. de tuen. san. c. 4.

3. de tuen. san. c. 4. de tuen. san. c. 4. de tuen. san. c. 4.

3. de tuen. san. c. 4. de tuen. san. c. 4. de tuen. san. c. 4.

3. de tuen. san. c. 4. de tuen. san. c. 4. de tuen. san. c. 4.

3. de tuen. san. c. 4. de tuen. san. c. 4. de tuen. san. c. 4.

A lafa parte ea instrumentali, ex copiosis cruditatibus albis, aut nigris, vel flauis. Cruditates verò crassae, viscidæ, ac lentæ obstructions efficiunt, vt tales, abiq; copia obstruunt, vt partibus angustis, ac ductis, & densis contingit, vt venis tenuibus, æq; etiam in partibus mollibus hæc gigni possint obstructions, vbi vena angustissima sua natura fuerit, veluti in Iecinone, & liene, &c. Vtero. Constat enim Gal. pulmonis carnem spaciofioribus plenam esse, hinc etiam spongiosa: conera verò renem carnem densissimam: splenis verò carnem etiam spongiformem, minus verò longè pulmonis carne, sicuti hepatis caro inter renem, & splenis carnem se habet, vt antea dixi. Quoniam quanto spongiosior est pars, tanto magis obstructionibus a copia genitis, laborare potest, ætiam minus obstructionibus a crassitie, visciditate, & lentore productis affici valet; per oppositum verò quo densior, ac ductior est pars, eò magis etiam obstructionibus a crassitie, viscositate, ac lentore ortis laedi potest, eòque minus a copia. Verum inter splenis, ac pulmonis carnis formationem, mesenterion, ac pancreon conspicitur. Tales cruditates dico dignoscuntur, vt ait Gal. exatans obstructions a crassitie, & viscosis humoribus spirituosas, seu flatulentas distensiones, idq; in extremis vasis, seu partibus, quæ ex vena ipsius poris exoriuntur. Mai quidem obstructions sequitur gravitatis sensus, quæ dextro hypochondrio, aut sinistro inest. Quod si balitusus quoq; spiritus, cui non patet exitus, ibi concludatur, non solum gravitas, sed etiam sensus sequitur. In poris enim, ait Gal. crassos, & viscosos humores, seu porositate, seu spacijs cernis, tam solidorum, tum speciei carnosæ obstructions efficere; tum pituitosos, tum melancholicos, partesque imbecillas, ita eos crudos reddere posse humores vt non modò coquere, tenuare, ac resoluere eos non valeant; verum neque etiam expellere, neque attrahere, neq; transire in chyli ventericulo ad hepatis permittere, vt mesenterion est. Nam hepatis imbecillum attrahere chylum nequit, quandoq; nec lien melancholicum ita in animo a deficienti calore partis ita laefa plus longè cruditates in balitusum spirituum statuosum debilitate resoluuntur, si aerea substantia humido vaporis, a calore debili genito coniungatur, quàm coquantur; quippe interdum nihil coquantur, dum consistantur a frigore, vel obstruuntur exilibus meatus, vel coniunguntur, vel corpore etiam ipso immoderatus densato. Præterea etiam non coquantur cruditates si ducte iam facili fucine partes, ac lapiductus, veluti trophi a calore igneo, aut a frigidityte violenter partem resoluente tenuiorem partemque crassam exsiccant: cum pars mollis quatuor de causis dutescat, vel enim extensione a spiritu statuosos, aut repletionem humoris, seu coagulatione, aut exsiccatione: Ac illarum quælibet cruditas a causis præcessis alidus, aut frigidis facili dignoscuntur, & a tactu, & a renitentia, & ab alijs antea passatis notis, vt a ymnocis, ab excrementis, &c.

Differentia la-
ter partes que
sunt obstru-
tionibus a co-
pia ortis Icho-
licis, & que fa-
ciunt obstru-
tionibus a crassitie
genitis afficia-
tur.
A quibus hæc ob-
structiones di-
gnoscuntur.

De deo Hippo-
crati.

Pars mollis qua
non resoluta
induratur.

Finis Libri Tertij.





DE CRVDITATIBVS RECTE DIGNOSCENDIS,

RECTEQUE CVRANDIS.

LIBER QVARTVS.

In quo

Cruditatum indicationes eliciuntur vnde,

Cruditatum recte curandarum in genere, specie, & regione spectantium indicationes vel preparatiuas, aut eductiuas siue renulsiuas, aut deriuatiuas, seu roboratiuas, simulque vitales esse, demonstratur.

Præparatiuasque denuo ad corpus, ad cruditates, ad vias, atque ad calorem partibus infirum, ad concoctionem molientdam, excitandum, referri ostenditur.

Eductiuam verò tum sensibiliter, tum insensibiliter Diaphoreticam administrandam esse, probatur.

Quæ omnia Hippocratis, & Galeni Decretis, Autoritatibus, rationibus, experimentis, ac exemplis explanantur.



CAPVT PRIMVM.

Ad cruditates auferendas duas tantum indicationes satis esse, præseruatiuam, ac vitalem: Aliam verò curatiuam non requiri ostenditur: & cur.



Ruditates autem omnes rectè curandas ex hæcenus fundamentis constitutis tum sua essentia, tum genere, differentijs, ac speciebus, nec non simul harum cruditarum regionibus iam iam suis notis rectis, scientificisque, æquabiliter tam præcedentibus prænuntiatiuis, quàm præsentibus indicatiuis, cuiuslibet hoc opus perlegenti, simulque pericruti, prorsus quidem certas elucescere, patenter notum esse reor. Ea propter deest solum, vt indicationes ad eas cruditates tollendas idoneas constituamus; vt denique ijs indicationibus adhibitis, harum cruditarum curacionem, & ingredi, & perficere valeamus: cum nulla curatio nisi his scopis perfici possit: Qui tres sunt, curatiuus scilicet, præseruatiuus, æque vitalis.

Curatio scopis perficitur. scopi tres sunt in methodo curatiuus.

11. Meth. med. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

A vitalis: Curatius enim scopus à morbi essentia, præseruatiuus à morbi causa, vitalis verò à naturæ substantiæ viribus, simulque à solidis partibus vâcerum desumuntur. Verùm id in methodo medendi curatiua requiritur. In methodo namque tuendæ sanitatis conseruatiua, quæ principaliter similibus progreditur, ad ea, quæ secundum naturam sunt, manu tenenda. Secundario verò conseruatijs præ se fert, ea, quæ præter naturam habentur auferendo; vt ea, quæ sunt in suo esse naturali primario à morbis præseruentur, ac ne morbi fiant: Eamque sanè ob causam Gal. in libris tuendæ sanitatis de omnibus quidem cruditatibus rectè curandis agit, ad lassitudines tantum relictis, prout cruditates copiosæ causæ sint, à quibus hæ lassitudines producuntur, vt primæ affectiones præter naturales, ac etiam vt accidentia, seu symptomatica non propriè vocata sint morbum venturum imminuentem denuntiaria; Quæ cum per se nihil indicent immo per accidens, quatenus causæ sunt morbi imminuentis rationem continent, indicant, Ideo ad eas etpiendas cruditates, satis est morbi imminuentis causalis indicatio: quam illius morbi imminuentis præseruatiuam Galenus appellauit, vt clarè patet. Curatiua autem morbi indicatione hic opus non est; cum hic morbus præsens curandus minimè sit: Quocirca non in methodo medendi curatiua, cruditatum curatio inuenitur: sed in methodo tuendæ sanitatis à morbo venturo præseruatiua. Perpende autem symptomatica morbum venturum denuntiaria, symptomatica improprie esse; cum symptomatica propria tantum à morbo præsentem pendane vt libro 1. de magn. lang. iam demonstratum est. Vnde hæc propriè accidentia sunt, vt signa venturi morbi indicatiua.

C A P V T I I.

Cruditatum primæ regionis indicationem quidem primam esse reuulsivam, seu deriuatiuam, aut vacuatiuam; ne cruditates in venosum genus ingrediendo, ad aliquam partem nobilem, ac principalem lædendo, accedant.



C Vamuis primæ cruditatum loci nostri corporis plures partes sint, vt antea iam dictum est: Nihilominus Galenum tantum meminisse patet cruditatum pituitosarum, quæ in vena porta resident; hinc in mētereo, & in hepatis cauo, & pancreo quoque habentur: siue veoulis, siue porositatibus, aut meatibus, spatijque carnis insint; & quarum cruditatum curandarum indicationes elicere intendit Galenus. Cæterum cruditatum harum indicationes potissimum à causis istarum cruditatum colligi debent; Causis namque ijs abatis; cruditates etiam eas auferri necesse est: Causæ autem hæc, cum variæ sint, etiam diuersum, multipliciternque flagrant scopum. Fluxione etenim pituitæ, vel à ventriculo, seu à capite obortam, maxime causam esse pituitosorum inuenio: cum Gal. dixerit. *Si frigida à capite quidem fluxio ariditatem concoctionis, & cruditatem, & acidis rursus creet.* Quod duobus modis id excitat, nempe vt sua præsentia frigida, & homida; & hunc subinde ventriculum suo calore naturali valido priuando, causa vtique est nouæ generationis cruditatum pituitosarum: ego verò vt doctrina meo proposito inseruiat, fluxionem pituitæ primo modo considero, per præsentiam pituitæ in aliquem locum primæ cruditatum regionis iam fluxæ, copiam cruditatum pituitosarum coarctare: cui fluxioni vtique reuulsio, seu deriuatio euacuatione, vomitione molenda materiæ fluentis; simulque materiæ fluxus interceptio opponitur. Nunquam etenim cruditates iam fluxæ commode curari valent, quin prius fluxio, quæ ad huc profuit reuelletur, seu deriuetur. Vnde ad sanguinem sistendum à pulmone profuens ob catarrhi diffillationem in ea Matriona Romana interceptiendi, deriuandique gratia cathartici fluxui, capitis syncipite derasio, sinapismum admoouere coactus fuit Galenus; quo remedium,

à morte euidenti, ac propinqua cum mulierem Galenus vindicauit.

✱

A oximeli, & apomeli, & piper, & zingiber &c. Hinc et inquit Hip. *Perum quia ventri expurgando exhibiturus sis, ea cum multa aquosa, multa propinabis.* Gal. verò exatit. *Paratur fluxilitas hys quidem, quæ per sedem externi debent, multa, & cibis hys, qui ventrem molliunt pharmacis, quæ modicè proritare possunt, quæ enim acriora sunt vitare oportet.* Quod ex Hippocrate Galenus habuit. Hæc omnia itaque ventrem subducuntia parùm acria sunt, quia acridine, mordacitateque ex pulcriterrè facultate irritare, seu proritare valent, ad mirè vntrem subducendum, vt multa cruda se habet, vt ait Galenus, vt lib. 2. de magn. morbi cacochyma iam demonstratum fuit, & vt alibi etiam Galenus affirmando ait Minus si quidem acris aqua multa, quæ cocta est, non solum quod coctura peragatur, conficiaturque: *Per enim quod & spumofum ipsum ea ne tollatur, nempe quod acre, & flatuosum exsistit in mellis est substantia: cocta autem tum morfu caret, tum flatu vacat, distribuiturque melius, quam per intestina descendat, quo fit, ut eam ad causam magis aliat quam cruda, sitimq. magis arceat, urinasq. magis ciet cocta quam ea, quæ cruda est.* Quod autem etiam oximeli optimum sit, vt mitè ventrem subducatur: profectò quatenus parum acre est ex Hippocratis mente patet, sic etiam de apomeli, pipere, ac zingibere asserit Gal. cum piper, ac zingiber admodum valët ad flatus ex cruditatibus hys exortos ad intestina ducendos, vt Gal. ipse declarat, sed de hoc, loco proprio, vbi de his præfidijs agam, videbis. Hæc autem remedia, ad eas declarandas indicationes tantum posuit.

Medicamenta hæc modicè irritant, facilitat exsultationem. Acritudo sine pa- nom sub acia, vel fabrorum, ciaret solida vel fibrinosa. 3. De sim. modo. facit casj.

C A P V T V I I I.

Cruditates crassas præparatione, tenues verò eductione indigere: crassosq. succos à frigore concretos à moderatè calidis liquefieri debere; humores autem à calore crassefactos à frigidis liquefcere debere, Aristot. doctrina ostenditur.

Sed vt istius rei vniuersum complectar doctrinam, speculor Galenum nobis præcepisse crudorum pituitosorum copiam prius præparandam esse, simulq. coquendam: sicuti etiam copiam tum biliosorum adultorum: Quæ amara excrementa crassefacta præparare tenemur; & multitudinem tum bilis atra acidit, tum denique melancholice, antequam ipsa euacuetur, prius præparandam, & coquendam esse. Præparatio enim à natura facienda, simulq. adæquatio à medico administranda perpetuò in his humoribus crassis, acque tenacibus, antequam copia educatur, expectanda est; cum hi succi stabiles, æ firmi, & lenti, partibusq. angustis inherescentes sint, motuq. proterius rebelles; Biliofi verò pallidi, seu flauo, qui naturales, ac tenues inspicitur, & serosi, aquoside, superuacui, ac tenues, nulla ex pectata adæquatione, neque concoctioe vt lib. 3. de magn. morb. cacochy. iam etiam diuiliico educendi sunt; cum Gal. iam statuerit. *Quoniam ergo duo pri ma sunt, quibus primus intentus sit oportet, qui eiusmodi affectibus medicatur crudorum, sine etiam semicrudorum, qui ante sanguinis perfectionem fuerunt, per coctio. Et acrum, ac mordacium, qui secundi sunt, & sanguine postiores, eductio.* Neque dicas eos mordaces educendos tertie regionis esse; hæc etià mordaces in extremis venis, & corporis habitu prius concoquendi sunt, vt ex h. Gal. verbis elicere poteris, vbi ait. *Si enim vbi in primis utnis crudi succi copia est, discendum nobis eum esse, cò coquendumq. diximus, cauentibus semper ne in habitum corporis tradatur.* Vbi verò in extremis venis, & corporis habitu residit, & concoquendum pariter, & per balnum resoluendum. Verum quonià rerum arcanarum veritatis indagator Arist. statuit, à calore, & à frigore aquosa, vel terrea, simulque aquosa commixta omnia aequè crassefcere posse, similiterque liquefcere, & ea, quæ à frigido concrefcunt, à calido suo contrario liquefcant: sicuti pariter ea, quæ à calido crassantur, à frigore quidem soluantur, ac liquantur, vt ex h. Aristotelis verbis, est colligere. *Quæcumque crassefcunt, aut aqua existunt, aut terra, & aqua: Et hæc aut frigidò, aut calido siccò, quæ proper, & soluantur contrarijs: Quæcumque soluantur concretorum à calido, aut à frigido: quæ enim à siccò calido concreuerunt ab aqua soluantur, qui calidus est: & postea ait. Aqua autem humidior non incrassatur solaz: incrasa tio enim humido quidem abeunte fit siccò autem consistente; Quæcumque autem communia terra, & aqua, & ab igne concrefcunt, & à frigido incrassantur, aut ab amobus. Proinde pituita cruda crassa, tenuantibus quidem remedijs temperatè calidis, tenuari, fluxilliq. reddi debet: cum à frigido ventriculi ipsa pituita emanez: è contra verò succos crassos acres, & mordaces ab hepatis calido siccò obortos, præfidijs remissè frigidis tenuantibus dissoluere, fluxileque effecere cogimur.*

In crassa sunt exsultatio crudi & incoquatio.

Tenues sunt qui illis educendi per phlegma solutus de- no assumpit.

Mordaces in ve- pulis carnosus & corporis habitu in cruditates re soluentur: quoniam de prius loci se trahit: perita diaphanitas resoluenda pre- corum.

Quæ à calore concrefcunt à frigiditate liquantur, & quæ à frigore glutinosi à calore soluantur. Aristoteles. Pituita quæ calida, græu est à frigiditate, ideo à temperatè calidis remedijs de- bet.

Pituita vero quæ crassa est ob calorem, priuile à moderate refrigerantibus re- mouet debet.

Heldmann

Osmotic acids
furnish a frigid
viscous taste
lib. d. c. t.

Afferam *filisile*. Quocirca humida omnia crassantur: Mollija vero concrefcunt: crassataque omnia liquefcunt. At vero concreta non liquefcunt: *sed mollescantur*, quia *molle*, non autem *humida*, erant: Quam ob causam atra bilis, & melancholica, quæ ex humore humido, non autem ex molli succo crassatae fuerunt: Ideo liquefcere possunt: Verum quia hæc ambæ veluti omnino deesse sunt, ac in cineris, simulque terræ subtilitate naturam conuerfa frigidæ, & sicci temperamenti: humido aqueo iam euaporato ob calidum siccum monens acidum concreti melancholica, & atra bilis generationem: quam deinde perficit frigidum siccum vincens. Hinc hæc acidæ succi tanquã à frigido concreti, non à contrario eius causæ efficientis mouentis amplius liquefcere possunt, immo tantum finitiles à moderato calido molliente, humectante, simulque teneant tanquam à contrario eius causæ efficientis vincens, ac perficiens reddi possunt. Bilibi vero amaræ omnes species, crassatae à calido sicco vincente proculomni dubio à frigido humido liquefcere valent ceu à suo contrario, cum igne naturæ hæc omnes bilis sunt, non autem penitus combustæ, nec in cinerem, nec in terræ naturam transierant, vt atra bilis, & melancholica sunt.

[illegible]

C A P V T X.

^B Hippocratis cautio in cruditates alterandas gradatim interquiete seruata:
An quoque de cruditatibus primæ regionis intelligenda sit, cum
ibi alterantia pro nutrimento præbenda sint, nec non vñ
cum his alterantibus etiam ventrem subducentia
commisceri debeant, vel potiùs de alijs tri-
bus cruditarum regionibus tantum
explananda sit.

6 *Epidemiology* 1991;
● 16,
In press, 16.



Vriola autem plani hic inquisitioni mihi cadit cum Hippocrates decreuerit ex Victorio Trincuello interprete. Nihil de pleure, nihil temere gradatim con-
aria adhibere, & interquiescere: & ait Gal. de pleure conuulsu in febribus ad contra-
ria permittendum intelligi debere, quandoque dum neque ipsas negligere, neque
flam trahere conuenit, sed paulatim, & ipsos interquiescere permittendo. *Dis-
tiam* autem verbum interquiescere intelligere possumus: Vno quidem modo, ut non
iam conuulsu dum paulatim aliquos transferamus, sed antequam tunc una mutatio
tandem quiescamus: ut quando ex ore ad exercitationes conuertimus, primum quies-
cimus, atque paulatim hac ad augebimus, deinde nonnumquam tunc, vel etiam dum
ponemus. Altero modo hac vox (interquiescere intelligenda est, tanquam illi verbo
sita sit, ut in quos, quia prius baud inerat ad conuulsu inducere volumus: ipsam pau-
latim quibus verbum prius statim ad augebimus, paulatim rursus & istos quiescere hoc est,
hic ergo etiam de quacunque mutatione curamus in contrarium conuerti: ut
cum idem Hippocrates statuerit semel multum, & repens trahere, vel replere,
& refrigerare periculosum: omne si quidem naturae inimicum. Paulatim vero, quod fit,
tunc maxime ab uno ad alius facienda est mutatio. Quam vniuersalem regulam
constat Hippoc. vix Galeni verbis patet. Proinde finierat de praebendis

**Pauline et Berna-
rda adhuc, de
l'esquisse d'un
opéra, vi. 184
p. 185.**

Ad credendum adque odium est
magis alacritas
quam per dolum
pinguedine dehe-
mus, et inveni-
quid sit, et non
ita iudicemus.

Et per vires plu-
res gignit per m-
plicitatem conan-
do hoc crudelis-
simus fons.
Vires quoniam
per vires aliter cru-
deltatem aliter
dignitas.
Quoniam, de de
sperem dicitur
prosumere in
directissima
nam valde ali-
quid dicitur,
in crudelibus
per arguenda
in crudelibus.

9. Mithi.e. 31. 80.
4. De vā. rā. j. n.
mōt. 4. 19.
4. De vā. rā. j. n.
mōt. 4. 19. 3.
76.
9. Mithi.e. 31. 80.
4. De vā. rā. j. n.
mōt. 4. 19. 3.
76.
9. Mithi.e. 31. 80.
4. De vā. rā. j. n.
mōt. 4. 19. 3.
76.
9. Mithi.e. 31. 80.
4. De vā. rā. j. n.
mōt. 4. 19. 3.
76.

A laxantibus vti debemus abique adstringentibus, ne inter humor reprimatur. Potissimum autem hepatis, & ventriculo adstringentia competunt, cum hæc duæ partes concoctionum, sacorum officina sint: postea vero liem: Sicuti autem propriè abstinentium pro iecore, ita capparix cortex pro liene adstringendo, seu corroborando valet, vt ait Gal. Item pro hepate, & ventriculo corroborando vini fer, cydonæ, & alia ijs similia adstringentia, laxantium præfidiorum à Gal. correctura proponuntur: Quæ medicamenta pro explananda indicatione relaxatiua potius obiter: nam exactè de his loco proprio, vbi de remedium materijs verba faciam, dicam.

Quibus vici-
bus adstringen-
tis competunt
pro laxantibus
congestis.

C A P V T XII.

Cum ad vias aperiendis tantum post corporis totius purgationem, nec non partis tensæ quâdamtenus vacationem, partimque concoctione reliqui humoris iam facta; partem tensam relaxare rectè possumus: donec laxantibus vti nequimus, tunc detergere nos debere meatus extrinsecò medicamento deterfitorio demonstratur.



Voniam iam vidimus tantum vias partis obstructæ, ac tensæ relaxantibus, simulque emollientibus remedijs relaxatas, aptasque reddere nos posse, his quatuor conditionibus seruatis, hæc est quod solum toto corpore iam expurgato, atque etiam parte affecta partim à materia peccante vacuata, tum sanguinis missione, tum cacoehymæ educatione, partimque concoctâ: Præterea vti aliquantulum adstringentis relaxantibus commisceamus: Magna febre noui existens, neque phlegmonis principio, nec incremento, nec viopore præsentè, immo tantum in declinatione, & vbi materia frigida manserit. Sæpius contingit, his de causis, vt nos vias eas partium tensarum, his emollientibus aperire non possimus: proinde ne hoc interim sine apertione viarum vacuandum moremur, Gal. vt vitæ, saluti, & ægrotantium amatori, simulque post Hippocratem Artis medice diligētissimus Princeps, statuit interea eas vias non modò intrinsecò, ac vti quoque extrinsecò nos deterfitoris aperire pharmacia debere: cum dixerit. *At si uisum quidem obstructiones, quæ deterfitoris facultatem obtinent, seu foris cuti admodum, seu intro in corpus accedunt.*

C Verum istius deterfitoria extrinsecò tenuantia, simulque digerentia, sicut laxantia esse nihil debent, ne laxando, humores præui in penitiores partes ingruant; hinc obstructions tum ad venas, angustiores, ramificataque, tumque ad carnis spacia, seu marcus si accesserint, tunc hæc generantur obstructions, quæ saltem valde auferuntur: sic pariter alia præstidia sine vlla vi attractoria subesse debent, cum hæc omnia superuenirent incommoda vt ex Galeni verbis illico possit, hoc unodo allatis elicere potius: Periculum verò est etiam ne quæ foras trahunt, tunc cum ipsæ obstructum etiam aliud quippiam attrahant, & quæ ob interno sursum feruntur aliquid secum ex his, quæ in vasis continentur rapiant. Errorum vero, ac damnum, quod ex hoc consequetur, subinde promulgat iniquiens: Quod ipsum si tenax sit, & crassum excrementum ad intimiorem, angustioris remque partem, simulque, sursum, ac alium attractum, obstructionem planè geminabit si aliter multitudine certe sua non parum omnino nocebit. Cernimus enim aliquando etiam quod multum est, cum totum confluat obstruendo herere, iungique non minus, quàm ea, quæ glutinosa sunt, & crassa, quod si per meatus angustos est transitu multo profectò magis retineri, quo igitur ex his uter liberem, & quæ foris admoventur attractio tuta sit, utilissimum est corpus inani. Postea verò paucis interceptis verbis, ea, quæ deterfitoria vim cuti admoventia continent, tum quæ cuti applicari possunt, abique vlla attractione tum cum attractione conueniat, hoc modo, detergentium sunt materiam expostâ habes in commentarijs 95, qui de nudis, inuenti sunt conscripti, Deligenda verò semper sunt, quæ ad rem propositam sunt accommodata: quippe idem in his sunt, tum quæ magis sunt, quæ minus deterget, quia detergentia leuia, & sine molli potius de conip. med. per genera et. in fine: detergentia verò valde, ac vehemētia potius a de comp. med. pte gen. et. p. Sed nunc exemplis prætaxa pauca dicemus moderatissime detergentia sunt erui farina, tum border, tum sabarum. Præterea melle, quæ sit aquosa magis verò, quam hæc vis, & panacis radix, & ariloloc. hia, & melle, quæ mediocri est mixtura: veluti etiam hæc magis, quæ melleiussa est, hæc vbi mixta mellei extinguitur aqua: sic vt liquidum mel exiguum cuti potius facile ingredi possit. Possunt autem vel hæc magis detergere, tum sponta ueri, tum nutritum ipsam, tum oporuit rum. Sit autem nitrum oportet, quod ex tenuibus partibus consistet, cuiusmodi Beryllus est, si vero lapidum sit vbi id, leuius atque diligenter debebit, ut laui purissimum, ac erimur, cuiusmodi est Uinctum. Est autem & sapa ex his, quæ maxime detergere valeant. Atque hæc satis multa detergentium materij exempla sunt, quæ etiam ad cutem abstergenda in balneis poluere: attamen

Detergere debe-
mus cutem, e
quando relaxa-
te non valent.

Deterfitoria hæc
pariter neque
emollientibus
neque, cum acci-
dentibus, admo-
uentibus, hæc
obstructions
geminantur.

Detergentia re-
stifica etiam
potere quod relaxa-
tum sit acqui-
rit admoventia
de hinc.

Deterfitoria præ-
taxa quæ sunt
nitrum, vbi ac-
torem hæc
beryllus à Gal
nitrum, vbi
pauca detergentia
detergentia agna
de hinc.

isthac

87. Aph. c. 17.
2. Meth. 17.

Idem. 41.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem. vbi
med. et. d. c.

isthac de gentia cruditarum in aliquo hypochondrio, seu alia parte concentrantur, ubi tenuis, seu A
tumor etiam phlegmonosus, ac puridus facit, ac in puro corpore cunctis alibi constituit, et
ea phlegmata extrinseca detergentia sine ulla laxatione, sineque ulla attractione admoventia, in
his quatuor conditionibus nunc allatis seruandis, cum de promptis observandum verum diligenter
est non in licet modis, et vix in omnibus partibus, in quibus humor detretent, quod symptoma
maxime si teneant, quod secundo loco, aut tertio quo videlicet affectu ex ipsi plume inuenit idem ei
curatorem adhibeat. Aliis namque in membro affecto calor superat. Aliis tumor, qui propter abundan-
tiam humoris, vel propter crassitudinem fit durus. Si igitur calor preponderat id agendum, vel sensum
per ea, quae repensent calorem obviare; digeratur, quod genus est tum lini semen, tum chamamelon,
quibus adici, vel hordei, vel fabarum farina debet, quippe quoniam nequam ex a facit. Sape autem
vix non ignoras, quod medici artemetum vocant pro cataplasmate et usum phlegmonis preparamus, at-
que aqua aliquando misceamus: Ad breuem vero etiam aceti aliquando aliquid. Si vero laborantis phlegmo
ne partis calor non multum a natura excesserit: Sed magnitudine notabilis fuerit digerere haud timi-
de sine aqua debetis, etiam si quid aliud superaddis immiscens. Si vero veluti febrilis phlegmo
ne sit propter humorem, quos continet, vel crassitudinem, vel lentorem tum aceti aliquid, tum amara
medicamenta ut Matibum et R. de simp. med. fac. claf. 5. §. 6. 2. A simal immiscenda curabis potissi-
mum in ille. Etenim visum hoc propterea quod a iecore crassum humorem trahit eiusmodi humoris
occasione plenius laborat. Quia magis cataplasmaque ex oximelle, et absinthio, et capari sunt, illi
sunt idonea. Hanc igitur cum iecurum vulgus, fignoret, omnes alio perfundant, & cataplasmatibus re-
sistentibus curari, prius quam corpus vacuetur, ut cap. p. 2. etiam possumus fuisse. Unde illa gravia,
sequuntur in eo omnia. Quoniam dum aliquod prohibens relaxantia praedia inhihens inierit,
pro abstergendis cruditatibus, vel copiosis, aut crassis, simulque glauciosis, vel utroque modo, in
tensionem, seu tumorem elatis prius tamen venia scita, ut Galenos docuit, si copia in obstructio-
ne fuerit, ut liba, & quae magnam mollem sanguinem offensam a me fuit aliquod detergentium re-
medium emplastrum modo, cui admoventur possumus ex hordei, & fabarum farina cum pulvere,
absinthii, corticis nique radicum caprarum, & oximelle, & aqua mista compositum in quibus
etiam portorum specierum diarrhodonis abatis, aromaticeque castri, sermoneque lini faring, &
chamamelis. Si vero adhuc validius requiratur, addi possit, & radix indis, & absinthio, & inas-
sum, & alia huiusmodi. Nota autem quod ego hic detergentium exempla, ad indicationem alla-
tam diluendam posui, ne confundatur tractatio de indicationibus cum tractatione de cura-
tionem praedictis molenda.

Demerita pro-
ficia, quae cur-
sive admodum
possunt, ac la-
tente phlegma-
ta, ob tenuem
quo laxantia ap-
plicant non de-
bet ad vitia
etiam adhiberi
virescentia, videretur
ne quidam in de-
sentia.

st. Hic. med.
c. 16.

Pro hinc con-
plena, et op-
melio, & abin-
thio se capari
concepit in ad
indicatorem de
crustum em-
laurum exap-
mandum.

Demerita pro-
ficia, quae cur-
sive admodum
possunt, ac la-
tente phlegma-
ta, ob tenuem
quo laxantia ap-
plicant non de-
bet ad vitia
etiam adhiberi
virescentia, videretur
ne quidam in de-
sentia.

Exemplum P. 1. m. 1.
exemplum P. 1. m. 1.
exemplum P. 1. m. 1.

C A P V T X I I I

Caloris naturalis a crudorum copia grauante, simulque a crassitie, ac tena-
citate compressi, vna & suffocati, vel totius corporis, aut partis
alicuius offensa ad eam cruditatem coquendam
inuatua, & excitatiua indicatio ex-
planatur.

Calor naturalis
membris obli-
vis, dum fa-
cile reddi ad-
modum est
dit, ut fere so-
letur.

Vix fere modis,
quibus huius-
modi calor in-
uenit debili et
fieri possit.



Est autem, quomodo calor innatus cruditati coquens imbecillitudo
fiat, ut ille cruditatem coquere nequeat, nisi cum prius foueamus, ad con-
coctionemque peragendam excitamus, declaratur. Id enim de calore natu-
rali alienius partem, cum vniuersi corporis intelligendo. Natura namq;
sua facultate coctrici, alteratrique appellata, quod optimum est a simila-
re conatur, sanguinemque cofigit. Ea verò, quae aliena sunt, & quae sangui-
ficationis confectionem retigunt coquere, posteaque expellere: ea prius
matorando huiusmodi reddi. Natura oppressa, ac imbecilla fuerit, hoc sub officio fungi
nequit. Tribus autem modis calorem, istius parti infertur inuenit, ita dicitur reddi posse, ut in
nisi foueat, ac & excite, & concoctionem quidem ingredi nequeat: vel namque suffocatione a com-
pressionem ponderis copia crudorum grauante producta, aut oppressionem, seu interceptionem spi-
rituum, cui substantiae calidi illi parti complantati consilere nequeant, oborta, vel a crudo-
rum crassitudine, simulque tenacitate obstruente, aut a crudorum copia obstruente: vel denique
calor inceptus ad concoctionem agenda effici valet consilipatione crudorum, partiumque soli-
dorum, concoctioni faciendo assignatarum, quia ob frigus partis afficit. De primo enim mo-
do iam lib. 3. de magn. morb. sang. c. 13. dicimus, pariter de secundo quoque modo. Et licet ibi
de copia sanguinis calore naturalis comprimentis, & grauante vna & suffocante, ac denique obstru-
ente, & interceptante intelligatur. Praeterea et de sanguinis crassitudine, & glutinositate obstru-
ente, simulque interceptante id refertur: in cuius sanguinis emissionem mollitudo nos docet Hippo-
& Galenus, sanguinem prius liquidum nos, & calidius fontis, & quam plurimis, affundis: tri-
stion.

De vitiis, in m. 1. c. 1. de vitiis, in m. 1. c. 1.

De vitiis, in m. 1. c. 1. de vitiis, in m. 1. c. 1.

D

A Alioq̃bus reddere debet, tamen si isthæc à sanguinis copia, crassitie, & ac tenacitate promanent hæc eadem à crudorum vitioque copia, crassitie, & glutinositate progigni valent: hinc isthæc inhibere possunt, quominus calor innatus eos crudos succos aliqua in parte collectos, in tumoremq; elatos concoquere possint: nisi cum calorem innatum partis humorum crudorum collectione hæc prius adhibitis fomentis, vt ait Hippoc. foueamus, & ad concoctionem molliendam quoq; excitemus. Quæ fomenta moderate calida, concoctiua, seu maturatiua esse debent. Quæ quodidem crudorum concoctio ex calfacientibus hercle sit; concoctioni etenim eorum frigis aduersatur, sicuti per petuū calidum opitulatur. Quocirca partium imbecillarum natura, vt ait Gal. Hippoc. decreto auxilio externo indiget, si aliquando imbecillius reddita fuerit, cum Hippocrates ibidem ex araricis, corpus quieti permittere, ungere, & equaliter contegere, & in comen. Gal. vicerius ait, aduersus tam febris humiditatem eam, qua inuaditombus comparatur remedium esse putant præter quam quod neque valenter calfaciat, ne in altum cruditates attrahat: neque refrigret: sed lenitas, mulceatque: quibus maxime indigent, quæ à Natura coquuntur, & maturantur: simulque fluxilia concoctione, seu maturatione fiunt: vt luti succi crudi sunt. De tertio autem modo apud Galeni patet, cum interdu crudum humorum copiosius vehementer consilipati sint, in parte frigefacta, hinc etiam imbecilla, seu in mesenterio, siue pancreo, aut in parte circa hepar, & circa lienem resident te. Eamque sanè ob causam tunc iure merito calidis moderate prædijis rarefacere oportet: sicuti densatio, seu stipatio à frigido quidam exoritur: Si autem in venarum sinu summa, & ingens cruditas sit, ab vrina cruda omnino permota: vt lib. 3. c. 9. ad finem istius operis est iam demon- stratum, tunc etiam certe imbecillitas à natura significatur, & eget quæ aliqua ad succos percoquendos, vt ait Gal. & vt etiam diximus lib. 3. c. 29. cum extrinsecus remedijs, tū intus in ore assumptis prædijis: Quam ob causam Gal. ad eandem intentionem respiciendo, inquit, Quies, & calidior circa hypochondria inuas concoctionem molliendam crudorum succorum, de cura tertianæ nocte alloquendo. Postea verò exarauit: quando verò adhuc humores in ipsis continentur non dum ad stringere, sed tantum ad calcere, quod quidem de cruditatibus in ventriculo contentis, in Roma cuius angore asflectere intendit. Immo dum coctio facta non est, in ventriculo iubet. P. obis autem Regibus, quibus transfusa remedia medici admovent consueverunt, lane manifestum est, met. medic. 4. ap. sum vocatum nardum pigmentum à calido intus, ostio ventriculi imponere: cum ille alias quoque subuxit solutus sum purpuream lanam, & nardinum pigmentum à calidum Romæ ab eo supermittere. Verum si mesenterio, & pancreo lala ex consilipatione fuerint; isthæc vitio; emollientibus emolliere tenemus: quæ leni, vtero, & hepaticæ admouere solemus, istdem quatuor conditionibus etiam relaxantium applicandam in fetuatis, antea explanatis: Quippe quod ad digerendam materiam crudam, & frigidam densatam, ad excitandamque naturam tum ad coquendam eam, tumque ad expellendam eam iam concoctam insensibiliter, cucurbitula magna vehementer ignita, & calfacta, sicca plurimum valet; & vtero & leni, & iecinori, & pulmone, & capiti pluries admoda.

B Hippocrates enim ait, cum verò repleti vteri in tumorem sublati fuerint nihil effluit, & pleni euadunt postea verò inquit, Hic morbus primū huiusmodi fomento curandus: summissi in vterum sic nobis immatris ipsum calfacto, cucurbita ad os vestis, in quo calefit, ad hunc modum apposita, cucurbita media directè repurgata, summaque eius parte parum rescisa, veluti in vtriusque fieri asfolet ipsum veluti cooperculo circumtegit, quo odor per angulum immixtus ad vterum peringat, & calida perfundito, medicamentis que calidis subditissis vntur. Ad hanc etiam intentionem valet cucurbita magna vtero apposita sicca, quia Gal. ait. Mac ratione, & cucurbitula (strenuum valet auxilium est inuentum), tum vt foras euocentur, quæ sunt in alto, tum vt eximantur, atque eruantur, quæ in scirrhum iam abeunt. Verum cucurbita in ipsa parte, quæ phlegmone vtgetur inter iuncta non est, immo postea quando totum corpus vacuauerit, ac necessarium sit, eorum, quæ in inflammata parte continentur aliquid educas, atque eruas, aut etiam foras vtero attrahas, & quemadmodum rursus & sanguinem (si iam est opus) attrahimus; si quidem cum menses euacare in animo est in pube, & inguine cucurbitam figuram vt lib. 3. de magn. sang. iam quoque dixi. Pro eadem quoque intentione in Pulmone. ita phlegmone affecto ait, dum rempimentia damna, attrahentia verò extollit quæ foras trahere potius quàm repimere in eo debemus. Itaque etiam cucurbitula vtriusque, quæ sic laborant, si prius sunt vacuata applicabunt, & alibi depromit sic & hepati, & ipsam cucurbitulas applicamus. Alio verò in loco in cerebri & eius membranas phlegmone cum cucurbitulis. Galenus vtiat. Verum ubi nec influit adhuc quicquam, & totum corpus prius est vacuatum. In lethargia verò, & phrenitide in eorum declinatione ait Gal. mucus exyrbodum insperdendo nunc radendo tum sissidulum, aut serpillum, aut id genus aliquid admonendo: immo verò, si malum traheret etiam easilorem, aut cerie etiam cucurbitas. Cucurbitula enim sicca materiam tenuat, digerit, inualque ipsam siue vtero foras extahit, inquit enim. Ac de doloribus quidam, qui ex crassis, glutinosissimæ, aut frigidis succis, vel etiam stansioso spiritu excitantur huiusmodi abunde. Similis namque est eorum omnium curatio, & quæ per comprehensas iam materias perficiatur: nisi quod is, qui spiritum stansiosum comitatur propriam quandam curationem est sortitus ex cucurbita cum flamma copiosa si binde admoda: videbiturque tui præsidium hoc in huiusmodi affectibus incantamentis consurgens simile quod efficere, siue in intestinis, siue in quavis corporis partibus si sunt excitati: & postea exarat. Aliquando verò, & cucurbita magna bit, ite sine incisione.

Calor in natura
est vniuersalis
in corpore, &
in quocumque
corpore possit
esse.

In calore non
nulli debili
venarum
flooda.

Pro mesenterio
& pancreo, & iu
reque hepate.
Ad extrahendam
calidam naturam
magis siue ma
gis ignis flamma
admoda
& eam sustin
e ignem vtero
quod est.

Pro accendenda
terro, siue iel
nore, pulmone,
& capite cucur
bitula sicca
magis valet.

Cucurbitula se
a phlegmone
admoda in
declinatione ill
sum, pro indicia
tunc tunc
copiose vt ex
a nunc calorem
naturalem co
quendum, eorum
bita sicca vtero
admoda ad ad
mentis euocan
do.

Ad pulmone
ad hepate ad
nem de cerebri
admoda in
sine phlegmone
admoda in
sine naturam
est ad ad
nem calidam.

Quæ cucurbita
in vtriusque
nem est ait Ga
lenus.

Medio

4. De vici vici
in Gal. 1.
De vici vici
med. 11.
Com. 1. de vici
11. in Gal. 1.
4. De vici vici
in Gal. 1.

9. Meth. 1.

11. Meth. 4. &
c. 1.
9. Meth. 4. &
c. 1.
4. De vici vici
in Gal. 1.

1. Ad Gal. 1.
10.

9. Ad Gal. 1.
10.
De vici vici
in Gal. 1.
4. De vici vici
in Gal. 1.

1. De vici vici
in Gal. 1.
10.

11. Meth. 1.
4. 9.

11. Meth. 4. &
c. 1.
1. Ad Gal. 1.
10.

11. Meth. 4. &
c. 1.

11. Meth. 4. &
c. 1.

11. Meth. 4. &
c. 1.

Admenda in
tutis, vultu-
is, & ceteris
partibus.
Quarta.
Solida.

Curabitur si-
cuta emendi
calfactione soli-
tate efficit.
Caleo in natura
de debili-
tate infusa, nec
affluente nutri-
tis foveatur.

Vinum etiam
quod vitiatur
ut, & fomentum
emendat.

Vinum quod de
fomentum ad feni-
crudo coquens
dus fomentum
fuit. Nā ad om-
nia coquenda
vini coquenda
dandum.

Pipereum salu-
tis hic crudita-
tis Genom.

Vinum vitiatur
per zingibere, &
quoniam pipere-
um, & diapho-
reticum ad co-
quenda crudita-
tis opus est.

medio ventri affixa. Tanta verò ac taliter applicata etiam totum vmbilicum comprehendet. Neque mihi obijcias, si dixeris, hic locus tantum est indicationum dilucidationis, non autem materię præsidiorum: Quandoquidem modò cucurbitas declarauit tantam ad indicationem iuuatiuam calidi innati, coquentis, simulque excitatiuam, & vehementer attractiuan ex planandam citra calfactionem euidentem cum Galenus asseruerit duplicem indicationem haberi, nempe eius quod dolore creatur, vacuationem, atque alterationem. Vacuam id nam calfacientia omnia, tum quæ citra calfactionem vehementer trahunt, veluti, & cucurbitula, & eana eorum quædam, quibus nonnulli cucurbitularum vice vtiuntur. Ceterum quando vtina cruda summam offendit cruditatem, vbi imbecillitas natura significatur, exetique ope aliqua ad succos percoquendos, vt iam dudum quoque posui: Nam non extrinsecè modò, natura tunc auxilio eget: Verum etiam in trusco aliquo fomite, indiget: quod modicè calfaciat, ac ad viam intestinorum accedat; neque mihi ceu superfluum, ascribatur, si pro hac indicatione dilucidanda, exempla materię præsidij huic indicationi deferuentia statuerò, inter quæ exemplum vini primum locum tenet. Ait enim Galibidem. Nec tamen a vino cum abstinemus, concoquit enim id semicrudos humores, quantum aliud quodvis non fudorem, vtriusque promouet, ac somnum conciliat, &c. Id autem optime quiete, & somno conficit. Si ergo vinum quies, & somnus ad semicrudos humores coquendos potissimum valet, ergo eò magis ad summæ crudis succos coquendos iuuabit. Vnde alibi inquit, Quippe somnus concoquit, vigilia digerunt, quorum vtroque est opus, quia ex multitudine crudorum succorum egrotant: Ergo inuicem mediocriter adhibiti inuare se mutuo vtiliter poterunt, atque si pulsus his paruis admodum, infirmusque, aut etiam supra hac vehementer inæqualis, seire licet extremum periculum esse, facienda tamen vobis, quæ reuili, nec aliud quicquam molendum, &c. Aliquando enim subito ad imbecillitatem, vel inæqualitatem, vel paritatem pulsus mutantur. Quo tempore pacem ex vino diluto exhibere conuenit: vtiq; si nec ventriculi, nec iecur phlegmone laboret: quando si hac infelleueriam corpore crudis succis repleto, plane desperata solus egro est, pulsusque sic mutantur. Et alibi de Rege, succis crudis copiosis laborante, depromit. Postquam verò, & vnguentum ventriculo impositum est, & pedes calidis manibus attriti incaleuer, vinum sabinum poposcit: atque pipere iussit bibi Piper, & Zingiber, ac diatrium pipereum, diaphoreticumque proponit ad eandem intentionem, vt loco proprio dicam, pariet, & aliam compositionem ex succo malorum cytronorum ac melle, aceto, zingibere, & pipere albo medicamenti etiam constituit, quam etiam tunc promulgabo. Hæc autem dicta sint quo ad succorum crudorum primæ regionis, tum præparationem, tum simulque concoctionem, vt hi succi educi valeant per aluum, tamen si quoque per ventrem superiorem eos ita præparatos, concoctosque educere oporteat deriuationis gratia, tum pituitosos, tuncque biliosos.

CAPVT XIV.

Indicationis crudorum copię vacuatiuæ, Aliam eradicatiuam, aliam sub-
cucacuatiuam, seu minoratiuam per epicrasin peragendam esse:

Aliam insuper sensibilem à cavitatibus, & à vasis & à car-
ne molendam, Aliam denique insensibilem
diaphoreticam græcè nuncupatam
haberi, ostenditur.



Rudritas autem rectè curandarum peimæ regionis indicationum primo gene-
re luteusque suse est positio: Ad secundum genus, quæro, accedamus: Quod
equidem fuit eam cruditatem copiam, iam à Medico præparatam, & à natura
concoctam enacuare nos debere, seu saltem deriuare, sine reuellere; nam, vt
ait Hippoc. Vbi verò vitiatur debilitatem, aut animi deflectionem indicare oportet;
quandiu hoc feceris alio vertendum, aut succundum, aut reuellendum: interdum

Lib. de magis-
fing. c. 1. & de
cacochoyma
cap.

namque id fit, aut in summis cruditatibus, aut medijs cruditatibus, ideo tunc prius reuellere, po-
tius verò deriuare tenetur, vt Gal. & Paulus confirmant: Reuulso verò per longi adinam, deriuatio
autem ad latera fieri ait Hippoc, quam deriuationem triplicem esse alias dixi ex Hipocodem
loco, & ex Galeni confirmatione, vel enim secundum latitudinem destitutum, ac finitrosum,
aut per altitudinem antrosum, & retrorsum, aut secundum profunditatem exortrosum, ac interos-
sum, & cum hæ tres differentie, vt genera in sex bipartiantur, ergo octo sunt species, dux reuulso-
nis sursum, ac deorsum, sex verò deriuationis allata. Enacuatio autem vel ampla, confestimque
peragenda, eradicatioque appellata etiam, ad animi vtiq; deliquium molenda, vel imbecilli-
tatis vitium permittentem parcaissimam vacuationem administrandam fore ratione, ratione
educio panca, paulatim, ac per vias facienda, hoc est, per epicrasin. Quæ vacutio vtiq; ab
Hippoc. subpurgatio vocata fuit, ab alijs minoratio, de quibus eò quia tum lib. 3. de mag. sang.

11. Meth. med.
c. 6.

4. de sin. men.
c. 6.

B
11. Meth. med.

De pingu. ad
pallidum. 11.
lib. 1. ad Glan.
c. 14.
6. De viti. sin.
c. 11.
4. De viti. sin.
c. 6. lib. 1. ad Glan.
c. 14. lib. 1. ad
Glau. c. 14. lib. 1.
c. 14.

C
Hipp. 4. de viti.
11. in n. viti. c.
110. & Gal. 1. ad
Glau. c. 14. lib. 1.
de sin. viti. fac.
c. 11. & c. 14.

D

Lib. de humis-
bus p. Coca. 1.
c. 1.
11. Meth. med. c. 1.
ad Glan. c. 14.
11. lib. 1. c. 14.
Lib. de humis-
bus p. 1.
1. Aph. 66.

- A** tum 1. de coacchyma vberimè iam dixi: idèdè nunc superuacaneum effecit de his alia verba scriptis mandare. Verùm vterius euacuatio, vel sensibiliter fit, vt etiam lib. 6. cap. 28 dicam, aut per alium, aut per vomitum, seu per spuatamenta, seu per nares, aut per vrinam, siue per menses, vt hemorrhoidas, seu per sudorem fiat, aut à cavitare, aut à venis, ac etiam ex carne sit; ait enim Hipp. Vena enim in vnz sectione quicquid in ea inest pituita, & bilis, & sanguinis morbofi vnd eum, bis magna ex parte foras emittit. Pars verò ex carne per medicamenta, & positiones diffunditur, et per calidioria extrinsecus admoda adeo, vt morbus per totum corpus spargatur. Nam et si ibi Hip. de tumore duro lateris in pleuritide per spuatamenta tollenda verba fecerit: idem tamè concludit et pro nostro instituto, vt li. 6. ca. 2. dicit: Alia ergo euacuatio insensibiliter fit succorum, qui neq; vnz sectione, neq; phar-macis purgantibus educi possunt sensibiliter: immo eum in spatijs, meatibusque speciei carnosæ, seu partis solidæ infixi, ac stabiles ita contineantur, vt sensibiliter intus inficere vacuari nullatenus possunt: idcirco per insensibile halitum, seu distatione extrinsecus extrahendi sunt: hinc ait Gal. qui in extremis venis, & corporis habitus sunt per halitum resoluendum: Cum alio modo educi non possint: Illa aut vacuatio diaphoretica quæ grecè appellatur, quæ à virtute præsidiij fit diaphoretica tres concoctionis modos simul rancos possident, nempe humores eos crudos, & crassos ita maturandi, simulq; tenuandi, vt in acrem naturam eos succos transmigraret: nec non cutem, & carnem adeo rarefaciendi, ac aperiendi, vt vix omnino aptæ sint, atq; deniq; eos succos ita attenuatos foras attrahendi, vt loco opportuniori, vbi de horum remediõrum diaphoreticorum materia, & natura agam.

Quot à nobis
corpora, & a quibus partibus
excoles fiat.

De extrusione
insensibili, per
cutem & habitus
nibus, exhalationibus
modis non
frenda.

Excoles hæc
diaphoretica
vacant, per diaphoretica præst
de extrusione
menda.

Excoles enim
in, tres concoctionis
modos possident.

C A P V T X V.

Partis læsæ tum cruditates gignentis, tum transmittentis, tum recipientis duplicem roboratiuam indicationem esse, vel enim integram prius tota materia cruda vacuata, vel mediã non tota materia cruda vacuata, sed maior ex parte, demonstratur.



Ruditarum primæ regionis secundam indicationem vtique membris offensi pituitæ fluxionem gignentis, seu transmittentis emendatiuam, simulq; roboratiuam esse, iam c. 3. demonstrauimus; quam indicationem genere desumptam modò in suas facere debeo differentias: neque mihi dicas, quòd antea c. 4. eas differentias statuere ego tenebat. Nā ibi quo ad infectionem eam indicatione posui, modò verò quo ad executionem eam in suas differentias diuido. Quandoquidem in Arte medica, sicuti etiam alijs artibus contingit, id quod in inuentione, seu intentione, methodo resolutiuæ, seu in resolutione extrinsecus habetur, in executione verò, seu generatione primum est Arist. & Gal. sententia. Vnde Gal. ait, ergo quod vltimum in ipsa resolutione methodo est inuentum, id primum omnium inuratione est per agendum. Sicuti è contra vicissim primum in inuentione, vltimum in executione se habet: partis itaq; cruditatem fluens producentis, seu mādantis, corroboratio quidem, vel omnimoda, vt integra adstringentibus, alterantibusq; post omnes cruditates coctas, & penitus vacuatas, ac et toto corpore proterus expurgato dūtaxat mori-henda: vel media tantū sountibus solum administanda, non omnibus cruditatibus vaenatis, ac solū maiori ex parte, q̄ roborationem sæpe venterculo pituitæ & creatæ, & et alijs partibus transmittenti adhibere cogimur: alioquin pituitæ generatio, simulq; fluxio ad primas inguens venas nunq̄ adimeretur, nec et consequenter prima cruditarum regio ab earum cruditatū copia infestante, corrateretur. Hinc Gal. in quotidiana febre curanda statuit circa statum verò de venterculo esse habenda sollicitudo, ac de eius ore præsertim de eius roboratione intelligendo: tametsi et nō minus in tertia spuria, vbi copia pituitæ præteratur meo quidem iudicio propè vigorem vniuersalē agendum sit. De venterculi verò corroboratiue loquens Gal. ait. Quod si ex istis facilius fiat etiam absinthij eorum in meliciorum decoquens ad potandum exhibebas, atque deinceps vinum: ac omnibus modis membra oportet corroborare partim ut, qua extrinsecus apponuntur, partim absinthij positionibus; non tamen id in principiis faciendum suadeo, sed postea quando partes, que absinthij sunt, fuerint expurgate: Quando verò adhuc humores in ipsis continentur nondum adstringere, sed tantum calfacere conuenit, quia adstringentia in tunica venterculi, & in alias partes venterculo adiacentes penitiores cruditates infingerent: Vnde penitius hæ cruditates ac tenaciū inhaerescerent, hinc difficilius tunc detergerentur: Vnde Galeni consilium, in venterculo roborando est, vt prius cruditates detergamus, ac educamus; subindeq; venterculum adstringentibus roboramus. Vbi verò multa pituita frigida in ore venterculi fuerit acernata source quidem plurimum oleo, in quo absinthium ebullit, &c. Quoties ergo euacuatz cruditates nequaquam finit, nec etiam venterculum omnino roborare debemus, ac vero conuallacere sine additione ac ita

Obfessionem
opponere.

De media
roborati-
one, maior dū
um ex parte,
expurgatū non
reliquo corpore
purgo, adhibendo.

In febre
quidam & in
tertio spiritus
pituita generati-
onem venterculi
vbi in venterculo
ad cruditates
adstringere, venter-
culum roborare
non debemus.
Tamen non ex
insensibilium
um source ven-
terculum oleo
debetur.

Tomus Tertius.

G venti-

Pan. et pimi-
ti à ventriculo
recipiens robor-
anda ut est me-
dicamentum de he-
pate canum.

De cerebri mu-
cum, seu deflu-
tum p. ventricu-
li, roboratio-
nis.

Primum melle
transfusa, prius roboran-
dum, postea
mellea subor-
nandum mem-
brum.

ventriculū fouere deuincimur, ne denuò ita pituitam gignet; neq; ad primas venas transmi-
tar, Quo ad partem verò istam recipientem, quæ est meientereon, aut pancreon aut hepatis cauū
A roboranda venit, causam imbecillitatis adimendo, vel sub genere attractionis, seu receptionis
comprehensam; de qua re dixi tum lib. 3. de magn. morb. sang. cum li. 2. de mag. morbi acocch.
c. 6. Per penis repellentibus, in principio fluxionis adhibendis. Nec non repellentibus, sinuūque
digerentibus vnā committis, in fluxionis incremento, & vigore ad mouendis; atq; deniq; resolu-
uentibus in materiæ fluxu declinatione molientis. Quantum aut ad cerebrum mucum, seu distil-
lationem, tum gignens, tum transmittens, et roborandum est: prius tamen corpore toto, ac etiam
capite expurgatū, factūq; distinctione, an cerebrū per protoparythum, vel per mag. parthā ab ali-
qua alia parte afficiatur, seu à toto, semper nanq; primum membrum, transmittens corrigendū
est, postea secundum, quod partim mandat, partimq; recipit roborandū venit: tertio deniq; par-
tem solum recipientem roborare deuincimur. Si ita exempli causa cerebrū à ventriculi consensu
laboraret, primò ad ventriculū incumbendum solū transmittent. m. Postea verò ad cerebrum, qd
à ventriculo fluxionem recipit, & etiam ad pulmonem mandat: Tertio aut ad pulmonem à cere-
bro recipientem, vt in distillatione ad pulmonem descendente contingere solet. Si aut et v-
tricularis à cerebri distillatione afficiatur: de inde si ventriculus ad primas venas cruditatem à cere-
bro recepram transmittet, tunc primò ad cerebrum incumbimus, subinde ad ventriculū, tertio
ad primarum venarum pectus incumbere tenemur.

CAPVT XVI.

Cruditatum primæ regionis indicatio vitalis proponitur.



Eterum vitæ indicatio ad cruditates primæ regionis recte curandas, vel vni-
uersi corporis, vel alicuius visceris habetur: Vniuersi corporis aut vitalis indi-
catio triplex est, quatenus tria membra principalia sunt totum corpus regens:
Cordis enim calor naturalis, vt primum agens corporeum, seu primus motor
corporeus salubris & insalubris totū corpus vitali, pulsati, & irascibili vi, nec
non alore influente, regit, vt li. de med. sect. iam dixi, similiter spiritus animæ
nisi alimentalis officina, totum corpus regit. Proinde indicatio à natura totius corporis manan-
s indica-
re dicitur, tanquam prima indicatio, quæ ceterarum omnium indicationum maxime regi-
na est, perpetuo primo similibus, similibusq; formæ substantiæ totius corporis humani nutri-
bilis, nutriendiq; executioni mandanda est. Nanq; si virtus hæc non conseruaretur, nec vtriq; in-
dicatio præseruatiua, nec etiam curatiua, vbi morbi iam facti sunt adimpleretur. Vnde hæc in-
dicatio vitalis à virtute nature exhaustitur.

CAPVT XVII.

Indicatio ista vitalis tum à tota vniuersa totius corporis virtute nature sub-
stantiali, tum à virtute substantiali particulari viscerum desumitur.

Triplexque virtutis nature substantia, vnā cum suo origi-
nali temperamento conseruanda reperitur, hoc
est, spiritus calidi naturalis, & corpora
solida, & species carnosæ.



In subtilis qui
cum calidi co-
poris, & cum sub-
stantiæ corporis
solida, & cum
vires eorum
essent. corpus
reum h. de
mor. vult. c. 1.
3. de c. 1. vult. 17.
de c. 1. de conser-
uati. p. 1. de m. 1.
c. 1. de m. 1. de
lib. 1. de m. 1.

Tota itaque natura communis, tum cordi, tum cerebro, tum hepati insita, pluri-
busq; vniuersis cunctis partibus reliquiq; corpori toti, suis actionibus, fun-
ctionibus omnino accomodata, est potissimum à natura vniuersali cordi
complanata indicatio vitalis vniuersalis accipitur. Quemadmodū à partibus
peculiariter viscerum, tum nobilis, tum minimæ offensis, per quas omnes nostri
corporis nature operationes singulares fiunt, indicatio vitalis particularis ex-
haustitur. Hinc vires vniuersales totius corporis, alimentis euchymis, hoc est, probi succi, faci-
litque coctionis, ac minimi exercementi mantenedæ sunt: Partes verò solidæ, ac istam spiritus
tus, & calor naturalis conseruandus, & proprium temperamentum originale earum omni inge-
nio custodiendum, cum dixerit Gal. Spiritus substantia vnā cum solidis corporibus, sic nobis custodi-
da, vt tum qualitate, tum quantitate, & alibi ait. Virtus ergo omnis in prima custodienda hominibus
est: seruabunt autem si nec eius substantia inaniatur, nec tanta alteratione alteretur, vt ea cor-
rupta sit propinqua, atque huius custodienda pars est, vbi vel temperiem ipsam præsentem serua-
mus, vel absentem originalem, ac naturalem deperdatam adicituram, iterum inducimus.

Vires eorum lib.
3. c. 1.

11. Meth. 2.
9. Meth. 1. 11

11. Meth. 2.

quippe

A summi incolta est hac oes vincit; est aut aquosa exquisita; neq; iam eogni incipiens qualis tui bullita, neq; in fape, vt equi debebat, facit: que paulo post perturbatur: sed veluti desperata concoctionis accedit, que talis est venosi generis paffio exillita, qualis est in ventriculo extrema ipsa cruiditas: a pefia à Gal- vocata: tamen fca, quod Teior est e a transfufio, que in peregrinam qualitatem iuxta cruiditatem fit per corruptionis modum genita: qudm si cibis non mutetur a pefia vocata. Hinc in prima regione bilis prafina, et zinacia deteriores longe funt, quàm aliud crudum pituitofum, immo iam didum est zinariam adeo venenicam effe, vt antequam putrefcat, patientem interficiat. Vnde ex ea quidem putrida quidem minime fit febris.

Leithale Signū
quod est ubi ca-
tentes cruditi-
tes adfunt ex
vitis penitus
aqueo ac tenui
cognate seu li-
gumū dispersis
concoctis, nec
vitis est vana
clausa cunctis, &
paulo post ru-
bescit.

C A P V T XX.

Cruditatum tam pituitosarum, quàm mordacium secundæ regionis indicationes absoluuntur.

Cum cruditas secundā regio, quæ venarum sinus, seu venosum genus est, hæcque cruditas copia coinquinata esse possit, quæ certè multitudine tum pietuiferi tum aut sanguinis generationem, per cruditiæ modum generat, vel mordacius post sanguinis generationem, ac per adulationis modum orta esse valet: sub mordaciorum copia comprehensa quidem tum bilioforum flauis bilis, tum atræ, nec non melancholiz. Pro quarum autem omnium harum cruditatum hæc viæ; alitarum copia eripienda tria sunt perpetuo pendenda veniunt, per patiaris nèpe, eductio, & via per quam educi possit ac copiam atque Gal præparations inter: mordacium haud meminerit, atramen, me quidem iudice, de cruditatum mordacium tertiz, & quartæ regionis copia, allicutus est Gal non autem secundam, dum exaruit. Quoniam ergo duo prima sunt, quibus primum incensus sit oportet, qui cuiusmodi affectibus mordebatur crudiorum, sunt etiam: semies floram, qui ante sanguinis perfectionem sunt tum petro olivæ, ac mormæ, qui secundis sunt, & sanguine postioribus eductio. Nam ibi intendit in venoso vasorum genere apparere subesse illi copiam semieruditorum succorum pietuiferorum in reliquo vero corpore toto multitudine inter boram mormæ, &c. Secundæ itaque regionis cruditiæ, nisi turgente mordaciæ, & acres crasse adequande sunt: Ambæ autem hæc cruditates extremæ quidem, & seorsum oppofitæ sunt, inter sanguinem probum, ut ait Gal. si quidem sanguis in medio est bilioforum, atque hyppuræ, autum tria: semis ton ton xibulo appellare. Ibi

Sanguis in me-
dis actum con-
ditarum, de pu-
trefactum cru-
ditatum sua na-
tura est.

[illegible]

Conti feci adq
quanti sperden
proprietate pra
sideru. Simulq
paria l'ingà no
a faldia per
profic remedio
adhibeo.

tunc ad quatuordecim copias preparabitur: ac expurgabitur, cuiusmodi hic Praeterea dicitur: in secunda purgata est regio, quoniam prius erat prima et crudicius inanis: fit regio, scias aut quod sudore, & per huiusmodi cutis leuata regio expurgatur, quoties extremis venenis venofis copia cruditate laborante, quae extremae venulae est tertie & quartae regioni inesse dici potest: prout in specie carnosae, & in partibus solidis nutriendis ea copia fit, quae cum citra cutem sit: per nonnullam partem expurgari potest, nisi per cutem. Ceterum aduertere, quod per topica purganda nedum alterare, meatibus aperire, & naturae coquerentem robore, verum & per inconspicuam dissolutionem digerendo, tuendo, ac resoluendo, cuius cura possumus, feruat in nihilominus cautionibus iam statutis. Quo ad vitalem indicationem eadem erit, quae in putrefactis cruditatibus requiritur: primae regionis, siquidem putrefactio fiat, quae in morbacibus alijs petitur cruditatibus. Prognosticum vero idem est, quod iam est: si primum retuli, est valde periculosos finis Galienus in secunda regione existentes, quae illae in prima regione repetuntur. Quandoquidem, ut ait *Gal. de Junc. praefat.* ut circa *uenae*, et *primas* uenae adnatae *ipsis subsistant*, coquantur enim sanguine, etiam spiritus sanguinis affici quidē necessarium debet, hinc etiam calor, influens ledeatur, quo laeso, & calor primogenitus, & cordi impletur afficeretur: cui sane primogeni corporeus est naturalis salubris, per in salubre est agens in Art.

Prima regio fac-
cilit per alium
se per uocare
cuiuslibet à cna
distribuit.
Secunda autem
regio crudeliam
committit per
alium, per vi-
tiam, se per fla-
dorem purga-
tur.
Et ordo seruandus
proponimus.

Conditiões infe-
cunda regione
militares magis
periculosa quā
in prima regi-
ne.
Iactura exen-
dituribus in se-
cunda regione
existit alius fu-
mum.

te Medica nostrorum omnium actionum, ut Hip. & Galenus affuerant, ut iam lib. de med. et titud. v. berrime demonstrauimus: immo Gal. de promit, quod *crudis humoribus liquatis* in primis venis existentibus, in venarumque sinu transcurrentibus, ac per omnes corporis partes fluentibus ita, ut metumendum sit, ne ad pulmones, & cor ferantur aliquando etiam ne ad cerebrum subeant. Quam ob causam facillime morbi renu, & vteri, & paralyxia, & apoplexia, & orthopnea, & syncopes, & mors tandem subsequi possit; praterquam ut alimentum totius corporis coinquinato, omnes corporis partes non nisi mala, & vitata nutritione alii possint: Vnde cauti esse debemus in prognosticando.

CAPUT XXI,

Cruditatum mordacium tertia, & quarta regionis indicationes à Galeno sparsum posita colliguntur, & aliquibus exemplis materiae praefidiorum dilucidantur.

Billiose crudi-
tatis natura co-
stituta punita
cruditati h. sunt
ita etiam crudi-
tatis habent in-
dicationes.
Cruditatum bi-
liosorum addita
tiones exhiben-
tiamus.
Asteriscus.



X cruditatum pituitosarum indicationibus haecenus statutis, aliarum cruditatum mordacium biliosarum quidè indicationes, ijs partibus enucleatis, praeparatione, & eductione contrarias esse manifestum est. Nam istae amaræ, biliosae cruditates à combustione calidae facit calore, à frigido liquefaciendi sunt. Ideo cum qualitate prima, tum secunda contraria existunt, contrariaque possunt indicaciones. Istae enim cruditates calidae, siccae, asperae, acres, & mordaces sunt, vlcerosam producentes lassitudinem, nec vomitum, & vigiliam concitantes. Pituitosae vero cruditates frigidae humidæ, viscosae, glutinosae, ac lenes sunt, quietem, & somnum excitantes. Quocirca illas refrigerare, humectare, & epierasticisque contrariis temperate, lenireque tenemus: sicuti è contra istas calfacere siccare incidere, tenuare, friabilesque reddere cogimus: ita namque haec cruditates ambe aequantur fluxileque sunt; Cause quoque has cruditates efficientes, ut contrariæ, contrarias etiam petunt indicationes; Ea propter in illis hepatis refrigerare, in istis verò ventriculum calfacere deum cimus: sic aer et si temperatus in vtriusque esse debeat, tamen vergerè ad contraria debet: Concoctio etiam humoris, quæ à natura fieri debet extrinseca contraria esse tenetur: ac indicatio vitalis etiam contraria, quoad specificas indicationes, et si genericas indicationes ambe possulent, nempe virtus conservanda alimentis optimi succi, facili digestibilis, & minimi excrementi: Quamobrem victus ratio in cruditatibus illis humectans, ac refrigerans se habere debet. Vltius harum cruditatum eductionis via, per quas euacuantur, contrariæ habentur, pituitosae namque primæ regionis cruditates iam praeparatæ copiosae per vomitum, ac per secessum educuntur: Mordacium verò cruditatum copia corporum solidorum speciei catiosae, & venularum harum partium extem itum per cutem educitur, vel per sensibilem sudoris transpirationem, aut per insensibilem fuliginem, ac vaporum halitusosorum distillationem, ut Gal. ait, & si à toto vniuerso corpore materia turgens, ad cutem accedens educenda quoque sit: Cinis enim ut humor putrefactus per sudorem egreditur, Quocirca coctionis mordacium duo sunt modi. Alter etenim modus digestio horum humorum est, quæ causa est, ut euacuentur vel per sudores, vel per distillationem vaporum inconspiciam: Alius verò modus ratione viæ habetur, quia raritas est corporis per quam viam per halitum totius corporis euacuantur, vel humores, vel vapores, aut fuligines. Cruditates itaque mordaces interdum quoque in cinerem conuersæ per sudorem egrediuntur, vel cinis sit sanguinis adusti, in aramque bilem conuersi, ut Gal. afferit in partibus solidis, aut in genere carnoso exsistentibus: aut cinis aliorum humorum sit, ac talis veluti pus est cinerulentum humorum, iam iam putrefactorum, ut Gal. ait: vlt, veluti in partibus inflammatis coningit, quod per vinum egrediens, vrinæ sedimentum reperitur esse. Ceterum cinis illa pauca sanè manet, quod per sudorem expurgatur, cum maiori ex parte per halitum insensibiliter diffusetur. Quandoquidem in crassius succis putrefactus pauca superest cinis: in setosis verò nulla setatur cinis. Aduerte tamen quandoque, ut sudor ex tertia, & quarta regione cruditarum nasci, non ex succis quidem mordacibus, veluti in cinerem elapsis, verum ex tenuiori tertii concoctionis excremento, quod per se vbiq; & semper per halitum inconspicuè per cutem resoluitur, tamen per accedens fit sudor, & sit visibilis quoties vel naturalis calor languet, vel nutrimento ampliori, vel motus quissimam vehementer animalis coniungit: ut ait Gal. ut iam etiam lib. 3. c. 19. dixi. Ad mordacium cruditarum itaque copiam educendam tertii, & quartæ regionis cruditarum etiam in febribus putridis balneo, & relaxantibus utebatur Gal. prius tamen facta omnimoda primæ, & secundæ cruditarum regionis purgatione etiam in febre putrida, cum dixerit. *Hic enacatis non solum audacter lauem, sed et cataplasma ibus utar, in alijs quidem membris,isque relaxens; in icterice vero, ac ventriculo additis etiam, quæ medicrater adstringunt.* Ante omnimodam vero corporis expurgationem, facta ramè ali-

Coflin à natura
agitur.

Victus ratio.
Purgaciones.

Cruditatum
vel per sudorem
vel per distillationem
vel per secessum
educuntur.

6. Epid. c. 1. 10
10. de epid. c. 1. 10
11. de epid. c. 1. 10
12. de epid. c. 1. 10
13. de epid. c. 1. 10
14. de epid. c. 1. 10
15. de epid. c. 1. 10
16. de epid. c. 1. 10
17. de epid. c. 1. 10
18. de epid. c. 1. 10
19. de epid. c. 1. 10
20. de epid. c. 1. 10
21. de epid. c. 1. 10
22. de epid. c. 1. 10
23. de epid. c. 1. 10
24. de epid. c. 1. 10
25. de epid. c. 1. 10
26. de epid. c. 1. 10
27. de epid. c. 1. 10
28. de epid. c. 1. 10
29. de epid. c. 1. 10
30. de epid. c. 1. 10
31. de epid. c. 1. 10
32. de epid. c. 1. 10
33. de epid. c. 1. 10
34. de epid. c. 1. 10
35. de epid. c. 1. 10
36. de epid. c. 1. 10
37. de epid. c. 1. 10
38. de epid. c. 1. 10
39. de epid. c. 1. 10
40. de epid. c. 1. 10
41. de epid. c. 1. 10
42. de epid. c. 1. 10
43. de epid. c. 1. 10
44. de epid. c. 1. 10
45. de epid. c. 1. 10
46. de epid. c. 1. 10
47. de epid. c. 1. 10
48. de epid. c. 1. 10
49. de epid. c. 1. 10
50. de epid. c. 1. 10
51. de epid. c. 1. 10
52. de epid. c. 1. 10
53. de epid. c. 1. 10
54. de epid. c. 1. 10
55. de epid. c. 1. 10
56. de epid. c. 1. 10
57. de epid. c. 1. 10
58. de epid. c. 1. 10
59. de epid. c. 1. 10
60. de epid. c. 1. 10
61. de epid. c. 1. 10
62. de epid. c. 1. 10
63. de epid. c. 1. 10
64. de epid. c. 1. 10
65. de epid. c. 1. 10
66. de epid. c. 1. 10
67. de epid. c. 1. 10
68. de epid. c. 1. 10
69. de epid. c. 1. 10
70. de epid. c. 1. 10
71. de epid. c. 1. 10
72. de epid. c. 1. 10
73. de epid. c. 1. 10
74. de epid. c. 1. 10
75. de epid. c. 1. 10
76. de epid. c. 1. 10
77. de epid. c. 1. 10
78. de epid. c. 1. 10
79. de epid. c. 1. 10
80. de epid. c. 1. 10
81. de epid. c. 1. 10
82. de epid. c. 1. 10
83. de epid. c. 1. 10
84. de epid. c. 1. 10
85. de epid. c. 1. 10
86. de epid. c. 1. 10
87. de epid. c. 1. 10
88. de epid. c. 1. 10
89. de epid. c. 1. 10
90. de epid. c. 1. 10
91. de epid. c. 1. 10
92. de epid. c. 1. 10
93. de epid. c. 1. 10
94. de epid. c. 1. 10
95. de epid. c. 1. 10
96. de epid. c. 1. 10
97. de epid. c. 1. 10
98. de epid. c. 1. 10
99. de epid. c. 1. 10
100. de epid. c. 1. 10

Cinns quippe
17.
2. De diff. feb.
31.
D

2. De precep-
tulis c. 7.
2. De diff. feb.
31.

11. Meth. med.
43.

11. Meth. med.
416.

A aliqua expurgatione venę sectionis, & humorum expurgatione, deteriora laudat pharmaca & aptissima, quę ex oximelte, & abſinthio, & capari ſunt, illi nempe lieni craſſis, & viſcoſis laborantibus ſunt idonea, ut hoc lib. c. 12. iam dixi. Pręterea, expurgato toto corpore, in febre ardenti legiti-
 ma, & bile prodita ſimiliter Gal. balneo utebatur, inquit, ſciens iſſi, in uniuerſum de balneo viridis, quod ſi non antea vacuato corpore exhibeatur membris affectu fluxionem parit: vacuato autem ſi exhibeatur coctionem iuuat, nempe corpore toto antea vacuo adhibitu ad uacuatorum obtinet facultatem. Quoſit ut ex febre ardente laborantibus, tantũ opuletur, qui ſine tumore, vel phlegmone, vel eryſipelato laborant, ſemente in iſſis per totum corpus bile. Quod ſi coctionis ſigna habuerint, his nullo modo conferre. Verumſi ardens febris ab ſuſceptione putreſcentem oriatur aduerſiſſimum illis eſſe balneum ſi iudicari oportet. Neque enim pituiſus humor, ut bilioſus per cutim euacuatur, propterea quod tum craſſus, tum viſcoſus ſit, neque extinguitur longa egens concoctione. Quod autem ita mor-
 daces cruditates per ludores, & per cutim euacuatur tertis, & quartę cruditarum regionis ſicu-
 ti per vrinam acres cruditates ſecundę regionis educuntur collige ex antea à Gal. ſic cutis; con-
 cludendo enim Gal. inquit. Tantum eius meminiffe conueniet huc omne conſilium dirigere, qui copia ſic affecta curas, ut excrementa, quę circa eum ſunt, educat, propterea quod affectus in hac vna con-
 ſiſtit: nempe in euacuatione ſola per cutim facta; Vnde poſtea añ. Vbi verũ extremis venis, & cor-
 poris habitum reſedis nempe partium ſolidarum, ſpecieiſque carnoſis, & cutis, tunc & concoquendum
 pariter, & per balneum reſoluendum. Ex alibi etiam idem conſirmando, vomitum damnat in crudi-
 tatibus tertię regionis, inquit, etiam lauare tum hominem debetis, & mergere; ac molliter fricare, ut
 verò in vrina primam ſubſidentia viſuntur, ſum frictions augere, ſũ ad conſuetas exercitationes paula-
 tim reducere. Hoc tempore & inguentis iſis vtendum, quę per balneum euocent, band quaquam tamen in
 cuiſmodi affectibus vomitu vtendum ſuaſerim, ſicut nonnullis viſum eſt. Cruditates verò primę re-
 gionis per oppoſitum tantum per centrum educende, ut ſup loco iam ſatis dictum eſt. Nota autem
 mordacium cruditatum calidarum, amararum, biliolarum indicationes, hic tunc declaraffe,
 non aut indicationes mordacium frigidarum cruditarum acidarum, rum atrabilium, tum me-
 lancholicarum: cum frequentius laſtitudo vlceroſa à bilioſis iſis amaris humoribus premanet:
 Nam iſtarum cruditarum frigidarum, acidarum, mordacium alterantia, ſimulque præparantia
 calida moderatè eſſe debent, & calida magis moderata ad atram bilem adæquandam, quàm ad
 melancholiam fluxilem reddendam. Pręterea aduerte tria nos ſemper in cruditatibus rectè cu-
 randis ex acie perpendenda eſſe, ſcilicet cruditarum genus, ſpeciem, ac regionem his copioſis of-
 fenſam cruditatibus, vltia cruditarum copiam educendam, quę ventilanda etiam eſt. Proinde
 primo generum, ſecundo ſpecierum, tertio regionum hatur cruditarum exquisitam ponderare
 tenemur compositionem: Inſuper in vtraque compositione cruditarum concoquendum, & præpa-
 randarum, ſimulque poſſica per viam conuenientiore educendarum copia ſemper introſpi-
 cienda venit.

Finis Libri Quarti.





DE CRVDITATIBVS

RECTE DIGNOSCENDIS,

RECTEQUE CVRANDIS.

LIBER QVINTVS.

In quo

*Regionum, cruditarum, compositionum indicationes omnes Galeni
sententia absoluuntur.*



CAPVT PRIMVM.

Quot regionum cruditarum compositiones, indicationes obtinentes apud
Galenum fuerunt, de quarum compositionum indicationibus
hic sermo habendus, proponitur.



Ametsi cruditarum compositiones duplici modo esse conspiciantur, vt **A**
lib. 2. illius operis est videre. Nihilominus reliquis generum, ac specierū,
differentiarumq; cruditarum compositionibus recte curandis, ceu notis-
simis vnicuique, arti medicae operam danti; solummodo locorum, seu
regionum cruditarum compositiones recte curandas potissimum diluci
dabo, ob quas Gal. in lib. de ruenda san. maximè plurimum defatigatus
est, cum in his cruditarum regionum compositionibus curandis plura,
errata à Medicis etiam peritis committi soleant: Hinc Gal. agrotantium
utilitatis amore, ac studio ductus, ad isthac errata euitanda, nos docuit quomodo has compo-
sitiones sine vilo errore recte curare valeamus. Quae compositiones est numero nouem sint, vt
lib. 3. cap. 4. illius operis iam dictum est. Cum tamen à Galeno quatuor peculiariter tantum ex-
planentur suis indicationibus, & curationibus reliquarum quinque non principalium indica-
tiones, simulque curationes facile elicere possumus. Earumq; sanè ob causam harum quatuor re-
gionum compositionum cruditarum principalium tantum Galeni mente indicationes prius, ac
postea curationes examinare nitar: quae hae sequentes erunt. Neque obijcias inquam, has compo-
sitiones sex esse, non autem quatuor; quia in hoc libro tertiam, & quartam sine distinctione,
specifica posui, ac solum distinctione graduali. Verum lib. 1. quartam à quinta regione secui. Nā
ibi eam ab alia tertia seiuixi, vt apparetur quatuor regiones hae sunt reuera seorsum distinctae,
ita etiam in doctrina hae pateant. Verum quia quo ad indicationem, simulque curationem quae-
tae à tertia non segregatur, nisi secundum magis, & minus. Proinde Gal. vbi de earum regionum
indicatione, & simul curatione constituit, semper de utroque simul agit: Ideo ex Galeni more,
hanc tractationem ingreditur. **B**

Obstus illi-
ne.

A

CAPUT II

Cruditatum compositarum primæ regionis cum secunda cruditatum regione indicationes absoluuntur.



Tatuetis cruditatum omnium simplicium indicationibus, modo verò cruditati compositarum indicationes efficiendæ veniunt; sæpe namque vel prima cum secunda regione componitur, aut prima cum tertia, & quarta; tertiam enim à quarta non distinguo, cum hæc non nisi gradu differant quo ad curationem ex Galienecia, ut antea loco proprio iam iam, & etiam dudum dictum est, vel secunda cum tertia, & quarta, vel tandem omnes quatuor simul componuntur, cum vniuersum corpus cruditatibus afficiatur. Vnde quatuor ijs modis cruditates simul componuntur. Primi itaque modi nunc meminerò, nimirum cum prima, & secunda simul regio cruditatum copia lædatur; Cuius compositionis intentiones facillimè colligi possunt, ex antea rebus allatis in indicationibus primæ, & secundæ regionis simplicium rectè curandarum. Quocirca,

- B** tantum dicam, si istæ cruditates simul fuerint iunctæ perpetuò quidem æquæ cruditates, & præparare, & euacuare teneamur, tam primæ regionis, quam secundæ, & præparare, & euacuare præstetue cruditates primæ regionis ad secundam fluere regionem; quippe in oppositum cruditates secundæ regionis ad primam regionem attrahi semper debent. Hinc assidue alterantibus, & cibis ea vitique, quæ mitè alium subducere valent commiscenda erunt, ut ad profundum ij succi crudi accedant; nullatenus verò ad altum, nisi omnino euacuatis cruditatibus tum primæ, cum secundæ regionis etiam per vrinam; tunc enim si succi crudi in e extremit venulus sinus venarum supet sint propè cutim, qui per aliam nullam partem educi possint, nisi per ipsam cutim, tunc per eam partem eos extrahere succos par est; semper explorata via, per quam natura vergat eos expellere humores, & per commodiorem viam, facta verò prius disunctione, an hæc cruditates morbo magno anne hæ fuerint, vel laxitudini, si namque morbo magno, tunc sanè absq; præparatione succos turgentis extrahere deinceps, ut lib. 2. de morb. mag. cacochyma. latius exploratum habui. Sin laxitudini iuncti hi crudi succi fuerint compositi, tunc optime disquirendum de regione, de genere, & de differentia horum succorum venit. Quandoquidem in prima regione generis pituitosorum copia præparanda est magis, & minus tripliciter, sicuti generis istius tres differentie sunt. Nam hi humores ante sanguinis generationem per cruditatis modum orti, vel parum à sanguinis natura dilant, vel medio modo, cum semicrudi sint, seu semicotti, aut plurius, & omnino à sanguine massæ speciei recedunt; si enim primo modo pauca alteratione egent hi humores, ac audacter sanguis detrahi potest copia peteas: si secundo verò modo hi dimidia alteratione indigent, & consideratius sanguis educendus venit, si tertio autem modo hi maximam possulant alterationem, ac tunc de sanguinis missione reuulsua, seu deobstructione cogitandum erit. Quocirca maxime confert ad indicationes ipsa distinctio. Sic de alteratione etiam, & de vacatione alterius generis cruditatum mordacium, & acrium, quæ post sanguinis generationem prodite sunt, asseuerandum venit; quod similiter à Galeno in tres alias secatur differentias ijs enarratis differentijs appositas, & proportionatas, pro quibus etiam vel pauca, vel dimidia, vel maxima alteratio, & simul sanguinis missionis contemplatio requiritur. Et quæso exempli causa ad hanc rem dilucidandam, ut etiam lib. 2. feci assignamus A, primæ, B, secundæ C, & D, simul iuncta tertia, & quartæ cruditatum regioni. Similiter E, F, G, tribus differentiis cruditatum pituitosarum, & H, I, K, alijs tribus differentiis cruditatum acrium, & mordacium: quibus positis, dicamus in A, esse E, & in B, esse E, vel in A, esse E, & in B, esse F, vel in A, esse E, & in B, esse F, & in A, esse E, & in B, esse G, & in A, esse E, & in B, esse G, & in A, esse F, & in B, esse F, & in A, esse F, & in B, esse F, & in A, esse F, & in B, esse G, & in A, esse G, & in B, esse E, & in A, esse G, & in B, esse F, & in A, esse G, & in B, esse G.

Si prima regio cruditatibus, cum secunda, ambobus simul afficiat ut quid agendum sit.

In A sit E, & in B sit E
In A sit E, & in B sit F
In A sit E, & in B sit G
In A sit F, & in B sit E
In A sit F, & in B sit F
In A sit F, & in B sit G
In A sit G, & in B sit E
In A sit G, & in B sit F
In A sit G, & in B sit G. compositiones sunt: in prima etiam

et enim compositio æqualis quidem alteratio, ac æqualis sanguinis missionis contemplatio requiritur: In secunda verò compositione, in prima regione pauca alteratio, paucaque sanguinis educationis speculatio peritur, cum ibi audacter sanguis mittendus: in secunda aurem regione dimidia alteratio, & bona sanguinis mittendi consideratio desideratur: In tertia autem compositione prima regio similiter parvam præparationem, parvamque sanguinis missionis discussionem peritur: secunda verò maximam præparationem, maximamque sanguinis educationis contemplationem flagitat. In quarta, in quinta, ac in sexta compositione primæ regionis utique cruditatibus dimidia præparatio, dimidiaque sanguinis missionis animaduersio competit: secundæ regionis autem cruditatibus in quarta compositione pauca alteratio, parvaque sanguinis educationis circumspectio, in quinta autem compositione dimidia præparatio, dimidiaque sanguinis missionis pertractatio: in sexta verò compositione maximā alteratio, gradatim tamen facta, maximaque sanguinis missionis pertractatio congrua est. In septimo præterea octauo, & nono modo compositionis primæ regionis cruditates maximam præparationem, maximamque sanguinis detractionis circumspectionem optant. Secundæ verò regionis cruditates in se prima compositione parvam alterationem, parvamque sanguinis missionis speculationem respiciunt. In octaua verò compositione dimidiam, In nona verò compositione maximam rem enarratam postulant. Quocirca in prima, in quinta, & in nona compositione æqualem præparationem, & æqualemque sanguinis educationis contemplationem desiderat tum prima, tum secunda cruditatum regio. In quarta verò, in septima, & in octaua maiorem præparationem, maioremque sanguinis missionis circumspectionem prima regio petit, quā secunda: Cum in prima cruditates crudiores sint, quam in secunda, ac tunc magis longè incumbendum est ad cruditates primæ regionis, quam ad eas cruditates secundæ regionis, & maximè in septima compositione, in qua tertia differentia cruditaris pituitosæ omninò distantis à sanguinis natura prima regione adest: prima verò differentia in secunda regione, in quarta verò compositione secunda differentia cruditatis in prima regione, prima verò differentia cruditatum in secunda regione: In octaua autem compositione tertia differentia cruditatum in prima regione: secunda verò differentia cruditatum, in secunda regione inest. E contra autem in secunda, tertia, & sexta compositione secundæ regionis cruditates maiorem præparationem, maioremque sanguinis educationis contemplationem, & animaduersionem respiciunt, quā cruditatum regio, eo quia in secunda regione succi crudiores sunt, longèque crudiores existunt in tertia compositione, vt est videre: At tamen aduerte ne cruditates primæ regionis in secundam regionem fluant: immo in oppositum facies: ideo alterantibus semper ea, quæ alium mirè subducunt commiscere deuineamus, vt ad centrum cruditates accedant. Totidem autem nouem modi sunt, quibus cruditates primæ regionis, cum cruditatibus secundæ regionis componuntur, nempe ex cruditatibus pituitosis cum cruditatibus mor-
daciis, vt est hic introspicere.

| | | | | | | | | |
|----|---|-----|---|---|----|---|-----|---|
| In | A | sit | E | & | in | B | sit | H |
| In | A | sit | E | & | in | B | sit | I |
| In | A | sit | E | & | in | B | sit | K |
| In | A | sit | F | & | in | B | sit | H |
| In | A | sit | F | & | in | B | sit | I |
| In | A | sit | F | & | in | B | sit | K |
| In | A | sit | G | & | in | B | sit | H |
| In | A | sit | G | & | in | B | sit | I |
| In | A | sit | G | & | in | B | sit | K |

Omnes autem illi modi, & si differant, & conueniant inter se, sicuti etiam alij nonem modi supra alij compositionum cruditatum, attamen vterius discrepant in eo, quòd alterationem contrariam pectunt, sicuti per modum contrarij generis fuerunt hi succi præternaturales. Nam illi per modum cruditatis à causa frigida, illi verò per modum adustionis à causa calida causati prodiri fuerunt. In curatione verò istorum cautè nns agere debemus absque quòd ne illos, qui sunt in centro, ac profundo ad circumferentiam, ac ad altum trahamus, nec istos, qui sunt in medio ad profundum ducamus, præsertim si ægri picrocholi fuerint, & quando ea fluxione ad os ventriculi facta ægri afflicterentur. Attamen aduerto Hippocratem, ad curandas mordaces, & acres cruditates, in sinu venarum inexistentes, eas cruditates & per vomitum, & per sedè educere, quando scilicet ad eas vias natura vergere nitebatur, etiam si picrocholi ægri fuerint, vt in cholera fecit lib. de affect. sect. 5. pag. 337. inquit. Ad choleram autem confert, si quidem dolor detinet ea dare, quæ in medicamentorum trahaculo dolorem sedare scripta sunt. Venter autem totum superior, tum inferior, potionibus madescentibus curandus, corpusque excepto capite balneis calidis emollientibus, & dum sic facilius vomitus contingit, & si quid humidum subierit, quæ molestia sursum remouentur, & per inferiora feces magis prodire: quod si vacuus fuerit, cum vi conueniunt, & violentius fecedunt, sub vesperam autem etiam exhibito, quæ ei, qui medicamento purgante usus est. Cæterum
si Natura

A si Natura eos non moueat succos, tunc ipsos tantum preparare tenemur humores pituitosos, auxilio quietis, ac somni. Sicuti in oppositum si hi mordaces succi ob morbi magnitudinem cacochymam per accidens vna cum ea magnitudine virgeant, ac simul surgeant a natura mori, eos educere opere pretium erit. Verum aliquem video obijcientem, si dixerit, tu iam eas sex cruditatum differentias connumerasti à Gal. statuas pingui minetas. Quandoquidem, ut ille ait, utriusque generis innumera particularum differentia. Tu autem eas trece vtriusque generis differentias tanquam exacte determinas poluisisti. Cui respondeo cum ipso me Galeno ibidem afferente, non esse opus quarta differentia, ac tres eas proponere differentias satis est, ut etiam satis sit eas ad vnum caput redigere, quod tibi veluti scopum agendorum proponas, & amica directat. Quamquam tamen ipsarum specierum adeo hic omnium meminisse necesse non est, & illico perpendo eas tres vtriusque generis statuit differentias, & dilucidat. Animaduerte autem quod sicuti species illæ cruditatum assidue hoc modo in compositione harum perpendendæ sunt, eodemque modo copia harum cruditatum expendenda est.

Obiectio.

Responsio.

CAPVT III.

B Cruditatum compositarum ex pituitosis primæ regionis cruditatibus, & ex mordacibus tertiæ, & quartæ regionis indicationes explorantur, à Galeno statuta, ac eius exemplis patefunt.



Vm autem, ut ait Gal. ambo redundant in primis venis cruda pituitosa excrementa & in solidis sua genere carnosio, aut in cute mordacia. Ceteri enim talibus fatius est vtriusque reuolui, & foras crudorum & intro mordacium. Rationemque reddit, cum perigendo dixerit fieri ut igitur in superioribus causis, ne vnde succi foras traherentur, quia ne mordaces reuocentur intro est vitæ, cauendum. Deinde ea omnia, quæ foras cruda primæ regionis, & ad tertiæ, & quartam regionem transmittendo, totum corpus inquinare possunt.

C connumerat, ut illæc omnia cauamus, exarans summè verò eorum occasione foras ferantur basium, exercitatio, & fistula, & balneum, & fomenta calida, & nullis calidissimis, imo ex animi affectibus, iracundia, & vno verbo omnia, quæ succos, qui alie in animantis corpore sunt mersi ad motum quoquoque trahunt, ut sunt diuretica, ore assumpta, ut Galæque renuantia omnia euidenter calida, pituitam liquefacientia, & sanguinis missio venæ caue secunde regionis, & solutiva medicamenta; nec non aer ambiens mltus pituitam liquefaciens suo nimio calore. Subinde autem, quæ intro aëria tertiæ, & quartæ cruditarum regionis ferunt constituendo, ait. Quorum vero occasione intro ferantur ea sunt, quæ vixque prohibent foras ferri, talia sunt ex his, quæ cui propinquas, & quæ frigida sunt, & quæ adstringunt. Ad hæc quæcumque succos introforas attrahunt, aut alias quoquo modo ipsorum intro motum excitant, quorum sunt tristitia, & horror, quæcumque de causa ortus, quippe quæ, & ex calida causa, & frigida tam horrorem gignit, tam etiam rigorem, qualem supra descripsimus, est ostensum. Preterea, quæ auditu, visu, animo, aut stuporem, aut horrorem incutiant. Hæc itaque omnia deuitanda. Ceterum adverte illæc me ponere voluisse, quæ vitanda viciunt in curatione harum cruditarum compositarum, anrequam ea ponam, quæ facienda sunt: com hæc, quæ curationi obfunt plura sint; ea verò, quæ curationi conducunt pauca sint: septem etenim tantum habentur, quæ has cruditates curare possent, earum namque conuocatio à natura conscia flagrat, pro qua ex eorum iudiciis mandanda quies ne diu corporis, vtrum etiam animi, ac lenius modicus requiescat Galeni confirmacione, Hippocratis decreto. Viterius viciis ratio tenuans, ac detergens, ut oximeli peisana, & mulla, aures monteuile, piceæ laxatiles, &c. inter olera sola lectuca. Præterea ea, quæ alium leuiter subducunt, quæ absterfunt indicationis, fumi que lenitius indicacionis sunt, veluti oximeli, aqua inulsa, appomeli, hydromeli, æ prafana cremor, quæ semper deobalibentibus, aperiensibus commiscere tenemur. Quare est cutis rarefactio, ac mordacium mitissima educio abique pituitosorum attractione. quod his verbis Galeniano intendere voluisse patet, dum semper iteris monumentis prodidit. Nam neque, qui extra sunt resse intro reuocantur, neque qui intus sunt foras: immo qui foris sunt leuiter educendi per halitum sunt. Si quidem, quæ vehementer id faciunt etiam eorum, quæ intus sunt, aliquid attrahunt: qui verò intus sunt hi attenuandi, coquendique sunt: ex quibus polletemis verbis habes à Galeno, tum primam, tum secundam indicationem ante allatam: quæ tum opus prima ad naturam, secunda verò ad artem medicam pertinet, Pergens autem Galen. sicuti damnauit ea, quæ vehementer foras, & ad alium trahunt, ita etiam ea, quæ intro, & ad profundum violenter rapiunt (ut purgatio aliqua valida, & vomitus sine) confutat, exarans. Quod si vel vomitus eos, vel alui deiectione educere violentius tentas: utique eorum, qui foris sunt aliquid intro rapueris. Quincum verò est, ut aer ambiens, ut causa

Quæ ad remiam & quæcumque excrementis crudis ex primæ regio nis impelleret, seu calore vellet conuocare nec.

Quæ ad feruorem primæ regionis cruditatis regio nem, acuta cruditates sentiat, & quæ regio na impelleret, seu calore vellet conuocare nec.

Quæ rationem cruditatum con ducentem ponat si de, quæ vero obfunt plura in ueniant, Septem dicitur, autem quæ ha rum cruditatum curationem prodeunt octo viciis. Quæ viciis aliquid attrahunt. Cuius autem facili. Et aciem eductio.

Veneris de delectatione ea quæ in uiciis de quæ cruditatis regio ne sunt ad attrahunt de delectatione attrahunt gremum.

4. De iun. ioc. 4.4.

4. De iun. ioc. 4.4.

4. De iun. ioc. 4.4. 4. De iun. ioc. 4.4.

4. De iun. ioc. 4.4. 4. De iun. ioc. 4.4. 4. De iun. ioc. 4.4. 4. De iun. ioc. 4.4. 4. De iun. ioc. 4.4.

Quoniam quod
conducit crudi-
tutibus acerbis.
Sextum.
E primum.

line qua non temperatus sit ad calidum, & sicum vergens Sextum statum hypochondriorum. A
discutere tenemur. Postremum vero, ut a rebus confectis indicatio desumatur. Ceterum novem
modis cruditarum ipsarum compositio contingere potest. Nam vel

A
4. De recte, An.
45.
4. De recte, An.
46.

| | | | | | | | | | | |
|------|----|---|-----|----------------|---|----|---|---|-----|---|
| | In | A | est | E ₁ | & | in | C | D | est | H |
| vel | In | A | est | E ₁ | & | in | C | D | est | I |
| aut | In | A | est | E ₁ | & | in | C | D | est | K |
| sen | In | A | est | F ₁ | & | in | C | D | est | H |
| sive | In | A | est | F ₁ | & | in | C | D | est | I |
| vel | In | A | est | F ₁ | & | in | C | D | est | K |
| aut | In | A | est | G ₁ | & | in | C | D | est | H |
| sen | In | A | est | G ₁ | & | in | C | D | est | I |
| sive | In | A | est | G ₁ | & | in | C | D | est | K |

Consequenter
inter has crudi-
tutes compositio-
nes.
Constat in
septa.

antea enim exempli studio ad hanc rem explanandam iam A, primæ cruditarum regioni, B, secunda regioni, & C D tertia, & quarta regioni assignata fuerunt: nec non E primæ differentie cruditarum pituitosarum F secunda differentie, & G, tertia differentie: Insuper H primæ differentie cruditarum generis acrium, & mordacium I verò secunda differentie, K denique tertia differentie consignata fuerunt. Per id enim patet primo, quoniam, & nono modo compositionis specierum proportionem inesse, atque tum in prima, tum in tertia, simulque quarta cruditarum regione æqualis alteratio, æqualisque sanguinis educationis consideratio requiritur: tanquam contraria petatur alteratio, sicuti etiam primæ regionis cruditates copiosius frigide sunt, tertiæ verò, & quartæ regionis cruditates calidæ existunt: In primo etenim modo parva alteratio, parvaque sanguinis educationis consideratio postulat, si utique sanguis peccat. In quinta verò dimidia alteratio, dimidiaque sanguinis missionis perscrutatio desideratur. At verò in nona maxima preparatio, maximæque sanguinis detractionis circumspectio æque in utroque flagitat: In primo autem modo, & quinto, & nono omni ingenio cavendum est utrunque reuulsus, ne venosum genus cruditatibus coingnetur, verum magis vitandum reuulsus in quinto, quam in primo modo, eum deteriores cruditates quinto modo insint, quam primo modo: Ceterum adhuc longè magis in nono modo prohibendum utrunque reuulsus, cum deterius cruditates æquæ seorsum contrarie inveniuntur in prima, & in tertia, simulque quarta regione. Unde quiete sunt servandi agri, & concoquere, ac tenuando adquare tenemur, & id diligentius in quinto modo, diligentissime verò in nono modo agere tenemur. In quarto autem modo, in septimo, & octavo primæ regionis cruditates maiorem alterationem, maioremque sanguinis missionis contemplationem, & animadversionem petunt, quam cruditates tertiæ, & quartæ regionis, maiorem verò in septimo modo, quam in quarto, & in octavo, quia maiorem inæqualitatem excedentem in septimo modo habent cruditates primæ regionis, quam in quarto, & in octavo: eam in septimo longius distent. In prima enim regione tertia species cruditarum pituitosarum inest, in tertia, verò, simulque quarta regione prima species cruditarum mordacium adest. In quarto verò modo in prima regione secunda species cruditarum pituitosarum: in tertia verò, & quarta regione prima species cruditarum acrium: sicuti in octavo modo in prima regione tertia species cruditarum pituitosarum: in tertia verò, & quarta regione secunda species cruditarum acrium: Omnibus autem istis tribus modis, quibus cruditates longè deteriores primæ regioni subsunt, magis quoque ad eas incumbere tenemur, quam ad cruditates tertiæ, & quartæ regionis, caventibus tamen nobis, ne dum ad eas incumbemus, intro cruditates serrantur. In secundo verò, tertio, & sexto modo compositionis cruditarum tertiæ, & quartæ regionis cruditatibus maior preparatio, maioremque sanguinis educationis discutio, & cautio confert: Adhuc verò maior in tertio modo compositionis eò, quia tunc maiorem inæqualitatem excedentem tertiæ, & quartæ regionis cruditates acres continent, cum ibi duos gradus inæqualitatis superantis habeant eò, quod tunc primæ cruditarum regioni prima species cruditarum pituitosarum inest: tertiæ verò, & quartæ regioni tertia species cruditarum mordacis inest: Unde ibi cruditates per duplum deteriores mordaces sunt in genere acrium cruditarum, quam cruditates pituitosæ sunt in genere pituitosarum. In secundo verò modo, & sexto inæqualitas quidem excedens repetitur per unum gradum inæqualitatis excedentis. Quandoquidem in secundo modo primæ regionis cruditates pituitosæ primæ speciei inveniuntur, tertiæ verò, & quartæ regioni cruditates acres secundæ speciei subsunt. In sexto autem compositionis cruditarum modo in prima cruditarum regione secunda species cruditarum pituitosæ, in tertia verò, & quarta regione tertia species cruditarum mordacis reperitur. Quocirca omnibus istis in modis maior curatio pro tertiæ, & quartæ regionis cruditatibus recte curandis postulat, quam pro primæ regionis cruditatibus: ac longè maior in tertio modo, quam in secundo, ac sexto petitur. Ac in istis tribus modis, tunc quidem iudice, præsertim ut ait Gal. humores acres sunt leviter educendi per balneum, verum omnino leviter, ne qui succi, qui primæ regioni insunt ad secundam trahantur regione.

4. De istis, An.
46.

CAPUT

A

CAPVT IV.

Cruditatum, quæ ex secunda cruditatum regione, simulque ex tertia, & quarta regione composita indicationes statuuntur.



Offt compositionem cruditatum primæ regionis, cum tertia, & quarta regione; illiçò alia compositio vtique secundæ regionis cum tertia, & quarta simul regione perpendenda venit, quæ sanè duorum generum esse valet, vel etenim ex cruditatibus pituitosis secundæ regionis, & ex cruditatibus mordacibus tertiæ, & quartæ simul regionis consurgit potest, aut ex cruditatibus mordacibus secundæ regionis, & ex cruditatibus similiter mordacibus tertiæ, quartæque regionis: In secunda enim regione frequenter cruditates illæ geminæ adesse possunt, sicuti primæ regioni tantum pituitosæ cruditates subesse per se, & frequenter quæne, & quemadmodum tertiæ, & quartæ regioni dantur acriditates acres, & mordaces inesse frequenter contingunt, vt ex Galeni doctrina toto libro quarto de tuenda sanitate est videre. Quamobrem nouem modi compositionis harum cruditatum, in quocunque horum cruditatum compositionum duorum generum allatorum inueniantur, Quandoquidem

| | | | | | | | | |
|------------|----|---|-----|----|----|-----|-----|------|
| vel | in | B | est | E, | in | C D | est | H 1. |
| aut | in | B | est | E, | in | C D | est | I 2. |
| seu | in | B | est | E, | in | C D | est | K 3. |
| siue | in | B | est | F, | in | C D | est | H 4. |
| alias | in | B | est | F, | in | C D | est | I 5. |
| Quandoq; | in | B | est | F, | in | C D | est | K 6. |
| Interdum | in | B | est | G, | in | C D | est | H 7. |
| Aliquando | in | B | est | G, | in | C D | est | I 8. |
| Nonnunquam | in | B | est | G, | in | C D | est | K 9. |

Quos omnes modos iam etiam posui cap. 2. istius lib. in secundo genere modorum compositionum cruditatum primæ regionis cum secunda. Verum, cum alias indicationes requiratur secunda regio cum tertia, & quarta simul iuncta, idcirco dicam quòd in primo, quinto, & nono modo, in quibus æqualis alteratio, æqualisque sanguinis eductionis contemplatio queritur tam in secunda regione, quam in tertia, & quarta. Nam in primo modo parua alteratio, paruaque missionis sanguinis consideratio queritur, cum in vtriusque regionis cruditates in prima specie sint, hinc mellestima, ac parua. In quinto autem modo mediocri tenuatio, & coctio, dimidiaque sanguinis detractionis animaduersio queritur, cum in qualibet regione secundarum specierum cruditatum, cruditates tunc reperiuntur. Sicuti in nono modo maxima tenuatio, & coctio, maximaque sanguinis eductionis circumspectio, ac diligenti, religioque per præmeditationem facta cruditatibus harum regionum congruissima habetur, ibi etenim cruditates deteriores existunt, cum in tertia cruditatum specie, quæ extremè à sanguinis specie distant, ac eo maior præmeditatio, maiorque, & simul diligentior curatio flagietur, quo extremè hæ cruditates contrariæ vicissim sint: sicuti etiam in quinto, & primo modo non solum, sed in omnibus ijs modis allatis. Ceterum aduerte, quòd licet æqualiter hæ cruditates primi, quinti, & noni modi indicent eorum ablationem, & curationem; tamen quandoque magis indicant cruditates tertiæ regionis, quando scilicet partes principales, aut aliqua pars, tum principalis, tum principali inferiunt, tum principali parti subordinata, quarum memini lib. 1. de magna morbi. Præterea etiam quarta regio magis indicabit, quoties aut peririta, aut dolore vlcerofo, aut alio morbo, symptomatice cutaneo vires prosterneat, vt vigilias gignendo, aut aliud symptoma vrgens. His autem omissis, perpe tuo cruditates venosi generis maiorem longè indicationem ad amandissimam flagitant. Semper autem nobis cauentibus, ne cruditates, quæ foris sunt, nempe in tertia, & quarta regione, ne intro rapiantur, nisi natura ipsamet niteretur, ac simul tentaret eas cruditates per vomitum, siue per sedem educere, tunc enim eos humores, vt turgent, ac simul vrgentes ratione magnitudinis morbi cacochymetice per eas vias extrahere poteris similiter per perricam. In quarto verò modo, & septimo, & octauo secundæ regionis cruditates maiorem indicationem præparandam, maioremque sanguinis eductionis diligentiam petunt, longè autem maiorem in septimo modo. Ac in ijs tribus modis magis quidem incumbere ad secundam regionem æquum erit quam ad primam regionem, & ad tertiã: Verum semper ad primam regionem hæ attrahendæ sunt cruditates: Explorata semper consuetudine egrotantis, per quam partem expurgari solet æget si natura ad aliquam partem non vergerit. At verò in secundo, tertio, & sexto modo, cum in oppositum res se habeat, tertiæ, quartæque regionis cru-

Tunc Tertiæ.

H

ditates

Humores morbi
non arguentur
per atri feces. I.
aripeda magis
in hys morbi
causis ymo per
stercora, vel
insipientia, vel
incontinentia

in curandis cru-
ditatibus ingre-
diendum est bal-
neum feracius
debetur per
quod vitem fo-
lorum sic eas ex-
purgare à vitiis
cruditatibus.

dicates quidem maiori curatione, maioriq[ue] præparatione, atque simul maiori sanguinis A
evacuacionis speculatione, & cautione indigent, cum deteriores sint, maioreq[ue] longè dili-
gentia in tertio modo egeant. Cum ibi maiorem quoq[ue] inæqualitatem excedentem obineant
hæ cruditates. Proinde tunc magis ad tertiam, & quartam cruditarum regionem incumbere tenemur,
quàm ad secundam. Quocirca tunc hæ cruditates mordaces iure merito *leniter educende*
per balneum sunt, qui verò intus sunt, hæ atquanda coquendaq[ue] sunt, vt Galenus constituit, non ta-
men vehementer ad cutim reuocandæ; si quidem quæ vehementius id faciunt, etiam eorum, quæ tu-
rus sunt aliquid attrahunt, vt Gal. ibidem; ac ita humores ad angustiores partes accedentes, subitu
tionem geminare 8. meth. c. 4. difficiliter valde curantur, & educerentur hi humores. Sicut
ei autem de primo genere modorum compositionum cruditarum, sic etiam de secundo alio ge-
nere, in quo cruditates geminæ mordaces sunt, tam in secunda regione, quàm in tertia, & quarta
regione explorandum esse intelligas: tamen si facillioris curationis sint cruditates hæ, cum altera-
tionem eandem non antem contrariam, vt in alio genere possunt. Superest autem, q[uod] sicut mon-
nus, cap. 3. istius lib. nempe, q[uod] sicut succorum crudorum, & locum, & speciem examinare perpe-
tuò deuenimus, ita simul etiam eorum copiam semper perpendere debeamus: vbi enim copio-
siores inueniuntur, ibi quoque maiorem curationem, maioremq[ue] præparationem, maioremq[ue]
diligentiam, & maiorem denique sanguinis educationis circumspectionem assidue flagitant.
Cæterum videtur deterioritas horum succorum semper copiarum eorumdem comes esse. Quando
quidem ceterum est cruditas eò deteriores, erudioresq[ue] esse, quò duntaxat à statu naturali re-
cedunt, ac eo vique hæ à statu suo specifico naturali distant; quo solum magis concoctio vi-
tiata habetur. At verò quò vitiosior coctio erit, necessariò quoque eò copiosior multitudo suc-
corum crudorum habebitur, ergo necessariò sequitur institutum allatum; ergo spississimè, semper
locus, seu cruditarum regio, quæ propter succi crudi speciem peiorem, maiorem quoque interius
alterationem, curationem, atque intensiorem sanguinis missionis circumspectionem petit, non
minus quoque sanè hæc propter horum crudorum succorum copiam, quæ perpetuò iam succo-
rum præteritum sequitur, postulat. Quocirca eius turgencia duplex erit, & propter succorum
speciem præuam, & ob copiam; sic asserendum est procul è mihi dubio in quacunq[ue] cruditarum
compositione. Cæterum de hæc compositione ait Gal. in venoso rursus genera apparet subesse
illi copiam semicrudorum succorum, in reliquo verò corpore toto multitudine horum mordacium,
quos lassitudo secuta est. Postea verò indicationem exemplificat. Maxime ergo, vt dictum est, detra-
here primo de sanguine oportet: deinde sic cum illam educere à venis medicamento solente, qui in
venis superare videtur. Postea verò ait. Quoniam ergo duo prima sunt, quibus primò intentus sit, opor-
tet, qui cuiusmodi affectibus medebitur crudorum sine etiam semicrudum, qui ante sanguinis perfectio-
nem fuerant per coctio, & acrimiam, ac mordacium in tertia, & quarta regione, qui secundi sunt, & san-
guine postiores eductio subinde ait, abstinere eos conuenit ab omni valido motu: blandè verò vinctus,
atque oleo per frictus per quem suauis lauare balneo, inde in oleo, abstinentiaq[ue] haberi: post sanguinis
missionem moliam, & post succi semietudi purgationem etiam somno si fieri porci minime igno-
rantibus nihil esse, quod aque concoquat ea, quæ concoqui possunt, & malos succos per habitum digerat,
vt somnus à balneo, quod notatu dignum est, ex balneo ita somnum inferre: ac per halieum edu-
care cum dixerit, vbi verò in extremis venis, & corporis habitu residet, & concoquenda pariter, &
per balneum resolendum. De balneo itaque subinde ait, conducit ad somnum non in postremis si sum
quoque balneum: Sunt enim qui eas sunt vbi omnes magis ad somnum propensi, modo maioris momenti ni-
hil obstitit. Ad eò tibi somnus, & causa, & signum percommodum sperare vtilitatis sit, veluti è di-
uerso non posse à balneo dormire, nec causa, nec signum est commodum facilis curationis, cum ibi val-
de acres, & copiosos adeo offendat succos. Postea verò de talibus cibandis agitur: cum tales in-
diciam fecerit nequeant, vt pichrocoli. Hæc autem posui ad eas indicationes declarandas. Verum
hic dubitatur, quia in tertia cruditarum differentia tum pituitosarum tum mordacium, iam fla-
tulentum est sanguinis missionis maximam speculationem adesse, tamen in ea ait Gal. nullus emi-
nus mittendus est sanguis quia humores omnino crudi sunt, ergo tunc nulla speculatio cadit.

succorum cru-
ditum turgencia
duplex est, vel
ob copiam, vel
propter speciem.

Ex balneo som-
nus conciliatur.

Somnus ex bal-
neo contrahitur
& causa, & si-
gnum sperare
facile.
Sicut ex balneo
si aqua dormire
inquantis totis
se h. er.
Pichrocoli.
Solium.

4. De ven. san.
c. 4.

4. De ven. san.
c. 4.

4. De ven. san.
c. 4.
4. De ven. san.
c. 4.

D. De ven. san.
c. 4.

A

C A P V T V.

Cruditatum compositarum omnium cruditatum regionum simul iunctarum compositionum indicationes colliguntur.



In totum corporis humani vniuersum cruditatibus afficeretur, similiter duobus generibus id contingere potest, cum in prima regione crudi pituitosi succi copiosi, quietiam in secunda regione, esse possint in tertia, & quarta mordaces, in prima, verò crudi pituitosi, quæ duo genera quinquaginta quatuor modos possident compositionis. Vnumquodque etenim istorum genus viginti septem modos cruditatum compositionum continet: Nam vel

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|-----|---|---|----|---|-----|---|---|----|---|---|-----|---|
| | In | A | est | E | & | in | B | est | E | & | in | C | D | est | H |
| | In | A | est | E | & | in | B | est | E | & | in | C | D | est | I |
| B | In | A | est | E | & | in | B | est | E | & | in | C | D | est | K |
| | In | A | est | E | & | in | B | est | F | & | in | C | D | est | H |
| | In | A | est | E | & | in | B | est | F | & | in | C | D | est | I |
| | In | A | est | E | & | in | B | est | F | & | in | C | D | est | K |
| | In | A | est | E | & | in | B | est | G | & | in | C | D | est | H |
| | In | A | est | E | & | in | B | est | G | & | in | C | D | est | I |
| | In | A | est | E | & | in | B | est | G | & | in | C | D | est | K |
| | In | A | est | F | & | in | B | est | E | & | in | C | D | est | H |
| | In | A | est | F | & | in | B | est | E | & | in | C | D | est | I |
| | In | A | est | F | & | in | B | est | E | & | in | C | D | est | K |
| | In | A | est | F | & | in | B | est | F | & | in | C | D | est | H |
| | In | A | est | F | & | in | B | est | F | & | in | C | D | est | I |
| | In | A | est | F | & | in | B | est | F | & | in | C | D | est | K |
| | In | A | est | F | & | in | B | est | G | & | in | C | D | est | H |
| | In | A | est | F | & | in | B | est | G | & | in | C | D | est | I |
| | In | A | est | F | & | in | B | est | G | & | in | C | D | est | K |
| C | In | A | est | G | & | in | B | est | E | & | in | C | D | est | H |
| | In | A | est | G | & | in | B | est | E | & | in | C | D | est | I |
| | In | A | est | G | & | in | B | est | E | & | in | C | D | est | K |
| | In | A | est | G | & | in | B | est | F | & | in | C | D | est | H |
| | In | A | est | G | & | in | B | est | F | & | in | C | D | est | I |
| | In | A | est | G | & | in | B | est | F | & | in | C | D | est | K |
| | In | A | est | G | & | in | B | est | G | & | in | C | D | est | H |
| | In | A | est | G | & | in | B | est | G | & | in | C | D | est | I |
| | In | A | est | G | & | in | B | est | G | & | in | C | D | est | K |

Hi enim modi sunt primi generis. Sicuti totidem secundi generis inueniuntur, si litera E. F. G. litera B mutaueris in literam H. I. .K quorum quidem modorum indicationes vtiq; ex modis, hæcenus declaratis cap. 17. 18. & 19. nec non ex horum modorum indicationibus, ibidem statutis, elicere poteris tu, ne tempus conteram: Solumque dicam quodd, sicuti ijs indicationibus, antea allatis c. 17. 18. & 19. difficile est satisfacere, præsertim ijs deteriores cruditates, & copiosiores respicientibus, sic istis ipsorum modorum, compositionum, cruditatum, indicationibus, difficultate proportionatis, dico impossibile satisfacere nos posse, cum vniuersum corpus iam affectum omnino sit. Quocirca in Arte Medica magnum fuit mirum; Illustrissimum D. Paulum Bragadenum hoc modo his cruditatibus laborantem, sanitati restitutum fuisse: in cuius curationis gratiam, huic doctrinæ compilandæ incubui.

D

Finis Libri Quinti.



DE CRVDITATIBVS RECTE DIGNOSCENDIS,

RECTEQUE CVRANDIS.

LIBER SEXTVS.

Vbi

Cruditatum simplicium in genere, differentia, ac specie, copia,
& loco, seu regione perspectarum,

*Curatio adimpletur his indicationibus, libro quarto statutis
adaquata,*

Omnia Hippoc. & Galeni autoritatibus, rationibus, experimentis, atque
exemplis illustrata.



CAPVT PRIMVM.

In primæ regionis cruditatum pituitosarum exacta curatione, san-
guinis missionem incongruam esse de-
monstratur.



inueniuntur. Prius in chirurgico, ut an venæ sectio in cruditatum pituitosarum curatione con-

Vm mea hic non interfit integram allatarum omnium cruditatum curatio-
nem statuere. Verum tantum curationem principalem cruditatum consti-
tuere quo ad regionem, genus, speciem, & copiam ponderatam Hippocra-
tis, & Galeni doctrina, autoritatibus, rationibus, experimentis, similibus
exemplis, vt assidue hanc doctrinam in promptu habeam. Quæ tanque
decerunt omnibus in edentibus conspicua sunt. Quoniam ergo præsidium
rum matris, vel in fonte chirurgico, aut pharmaceutico, seu diætetico
inueniuntur. Prius in chirurgico, ut an venæ sectio in cruditatum pituitosarum curatione con-
ueniat disquiram. Cum Galeno dicam alij humores priusquam ad exaltum sanguinem nutrimen-
tum perueniant veluti semicocti sunt, alij prorsus incocti, crudique, alij, paulo absint à sanguinis
forma. Deinde ait vt in ea differentia, quæ parum à sanguinis natura distat, audacter mittendus
sanguis, vbi verò semicocti, & semicrudi fuerint, nempe medio modo sanguinis formæ parces-
cipes, & simul etiam à sanguinis confectione longinquæ sint, tunc consideratius agendum
sicuti vbi penitus incocti, simulque crudi fuerint, omninoque à sanguinis specie dissonant,
in his nullus omnino mittendus sanguis, cum ad Hippocratis aureatum decretum respicere tene-
batur Galenus, vbi habetur si qualis, peccant, quæ oportet purgari, purgantur, confert, & facile fe-
riunt; si contra difficulter, dum speciem succi peccantis euacuari considerauit Gal. Verum cum et
quantita-

Gal. ad Thes.
lib. 4. cap. 1. de Hip.
lib. de puls.
medic.
4. de cruditatib.
1. cap.

Hippoc. aph. 25. de
6. de mor. lib. 4.
1. lib. 4. cap. 6.
de mor. lib. 4. cap. 1.
81. de 3. Thes.
lib. 4. de mor. lib.
4. cap. 2.

Don in sangui-
ne in illis, si
out de indre-
dione respice
generat vt in
Galeno de 1. lib.
4. cap. 6. spe-
ciem succi per-
cantis, & con-
sueti de crudi-
tatis succi con-
pian.

A quantitatem eius introspicere debeamus. Ideoque illico Galenus pergendo, ait, *inspicere verò et quantitatem còueniens, ut verbi gratia, si bonus sanguis exiguus sit, reliquis verò succis crudus omnino plurimus, utiq; in his abstinendum à detractione sanguinis est: si in quidem exiguus, sanguis verò copiosus, audacter vena incidenda est.* Quæ etiam postea iterum rememoratuit, inquit, *Caterum, in laeso corpore sanguis bonus exiguus sit, crudi humores plurimi, huic nec sanguis mittendus, nec alui deiectionis, aut exercitatio, aut omnino motus, aut balneum adhibendum; Quippe incisa vena bonum sanguinem emittit, malum, qui in primis venis maxime circa iecur, & quod mesentericum vocant colligitur, in totum attrahit corpus.* Vnde plura mala sequerentur: si vetò in primis venis vel succi paulo à sanguinis forma recesserint, vel semicrudi fuerint; tunc sanè sicuti de his in sinu venarum secundarum ait Galenus in venoso vasorum genere apparere subesse illi copiam semicrudorum succorum: *Maxime ergo (ut dictum est) detrahere primo de sanguine oportet.* Sic etiam pto prima regione, rectè cutanda procul omni dubio primò sanguis educendus est, sed non per venam eamam cubiti, immo tantum per venas sedales, venæ portæ immediatè communicantes. At vetò in copia pituitosorum, qui succi plurimum à sanguinis specie distant: nequaquam sanguis mittendus est, vt viderimè lib. 1. & 3. de magn. morb. sang. seu in loco proprio iam dictum est. Verum scàio venæ minime conuenit ait Gal. vbi plurimi sint succi, non existente morbi sanguine magnitudine inminente, seu incipiente, vel præsentè: si euim vna cum succis plurimis, etiam morbi magnitudo sanguinea fuerit fluens, seu fluxura à sanguine exiguo emergens, tanquam à vehiculo pituita ducente; vt lathargia magnæ contingit, quæ à pituita fluente copiosa fit, cum exiguo sanguine, seu vehiculo ad cerebrum eam ducente pituitam. Pariter vt in phlegmonoso mesenterij edemate, seu iecinoria caui phlegmonoso accidit edemate; tunc sanè reuulsina, seu deriuatiua sanguinis missio rectè agenda est.

Quæ necesse erodit
tatu. & quæritur
probi aliqui
sui sepienda
in vena abstinere.

CAP V T I I.

Pituitam crudam, in ventriculi fundo residentem, ad primasq; venas fluctentem, seu fluxuram, primò nos ad reuellendam per vomitum præparare debere: Deinde aliam, iam in primas venas fluxam, ad educationem disponere nos cogi, demonstratur.

C Am dictum est pituitam fluentem, atq; fluxuram primò tollendam fore: cum prius ad partem mandantem incumbere teneamus. Subinde pituitæ iam fluxæ, simulq; parti recipienti studere deiuicamur, vt in quacunque fluxione id conuenit lib. 3. de magn. sang. c. 1. abunde ostensum est præter gallicam ad penè fluentem fluxionem. Proinde duæ tum præparationes, tum euacuationes ad erudicatam pituitosarum primæ regionis copiam adimendam requiruntur. Quocirca prius illius pituitæ crudæ fluentis, seu fluxuræ adequantia, & euacuantiæ in medium afferat. Mox autem illius in primas venas fluxæ, simulq; compæctæ alterantia, & educentia statuam.

CAP V T I I I.

Pituitæ à ventriculi fundo ad primas venas fluentis, vel fluxuræ ad vomitum præparandæ præsidia constituuntur.

D T autem conuenientia, & discrimen simul, quæ inter hæc duo præparantia sunt perscrutari speculor: qd sicuti pituita cruda in primis venis coarctatur præparantia duas continent virtutes, nempe & fluxilem eam pituitam reddere, & naturæ mieissimè existeræ, seu prorsare; vt sicuti pituita ea fluxilis fit; ita à facilitate expultrici ad alium eam fluxilitatem, & motum, & inclinationem aliunde excretionis acquirat: Ita pituitæ crudæ in ventriculi fundo creata, & existente copia ad primas venas fluentis, aut fluxuræ præparantia alias duas continent vires, hoc est eam pituitam fluxilem efficiendi, simulq; ventriculom subuertendi, ac ad vomitum irritandi. Vnde quemadmodum ea pituita tenacissima fluxilis fit, ita quoq; procliuatatem ad vomituius excretionem recipit. Sicuti itaq; Mulla cruda pituitam in primis venis residentem, per ventrè inferiorem subducere, & oximeli ea pituitam fluxilem præparare pòt, vt Gal. 12. meth. c. 3. & 4. de tuen. san. e. 4. atq; etiam sicuti Mulla aquosa, & pituita cremor humores acres, & mordaces tormina, & vomitus, & mordicationes procreantes extra stomachi læsionem, citraque periculum detergie per vomitum: itaq; præparant, vt Hip. & Gal. afferunt. Ita quidem pituitosum, & crudum siccum raphani succus, osime lici commixtus, ad vomitionem disponit quem sacculi Gal. pro radiculæ succo accipit, inquit.

Finis cruda
prima regionis
que præparatio
non necesse ad
vomerem, & ad
deliciendum,
Præparatio reuulsina
si ea non
sufficiat, facili-
ter.

Vomitum reuulsina
dicitur quæ non
disponit,

CAPVT V.

Omnes per vomitum purgandi modi varijs naturis congrui explorantur :
Ea propter, quibus ante cibum, seu post cibum, quibus motu
plurimo, aut paruo, vomitus fieri debeat, quibusque
plures, aut pauciores, vices vomendi
conueniant, patefunt.



Modis autem per vomitum purgandi Hippocrates agit, inquit, vomitus autem hoc modo irritare oportet. Homines obesi, scilicet, vomant, currendo, aut celeriter eundo meride. Quoniam, ut ait Gal. in como. vultu crassi, igni vomitari sunt, corpus ex assaltum, quo sunt puniti, quo plurimo et rassi abundant, liquoris autem obesi namque corpora frigida, ac densa reperiuntur. Hinc pergendo ex arat, quoniam etiam omnium aperiri visum, et angustiorum meatuum raritas hac maxime ratione patitur. Fac-

De modis per vomitum purgandi.
Quomodo cor- pora obesa faci- lia vomant. Et ordo.

4. Aph. 24.

4. Aph. 13.

Loco supra etc.
de Stubi dia- ti 1. 1. 1.
Ibidem.

Ibidem 1. 2. p.

Ibidem 1. 2. p.

cius autem hac omnia ad faciliem, et animam molliorem vomitum. Motus praeterea solus vomitum facere ait Hippoc. & Gal. inquit, quod indicare potest nauigatio, qua motus species est, ad id turbans corpora, ut ad vomitum adigat. Quoniam igitur talis motus, vel sola possit ad vomitum corpus preparare sit, verisimile ipsam motionem vomitorio enipiam paruo medicamento iunctam longe maiorem habita- ram efficaciam vomitionis promouenda. Ea propter Hippocrates inquit. Qui ad veritatem non facile supra purgantem eorum corpora ante potionem vetari copiosiore alimento, et quiete praebe- manda. At vetò hoc facit Totoque elleboro corpus mouendum, quam somno trahendum aut queti: At- tamen his, qui crudorum copiam primo cruditatem regione habet, paruus motus confert, ne motu vehementiori, hac cruditates in secundam confluant regionem. Cum itaque homines ut Gal. depromit, crassi, humoribus praefus crassi, et frigidis praediti sint: ac namulii etiam lenius iudicè po- tionem coram humorum huiusmodi vultu esse. Hippocrates hysipoli quadantem in congio aequè cō- tritici, nempe in aqua vna, q. s. quem obeso aciem effundens, et salis aspergens, quo sit lucidissimū, & hoc vomitorium est ab Hipp. pro corporibus obesis constitutum: a iunio datum. Subinde, verò adamussim pergens, modum assumendi eam potionem vomitoriam nos docet, nobis per- cipiendi. Bibat tandem primum, deinde velocius: Nam ut Gal. in com. ait, a principio si assatum, bibisset, continuo vomeret, prius quam omne cibibisset, atque succos in ventre contentos abstergeret, quā- tum cum ea potione effunderetur, quos prima vena habet. Sin autem primo lenius, postea omnino bibat largius ea ratione fiet, ut medicorum tempore continere possit, atque in tempore imperium ad vomitum capiat, quod tandem assatum bibat. Modum autem vini, & ordinem gracilioribus, ac imbeci- lioribus vomitum irritandi subinde statui, hoc modo. Graciliores, et imbecilliores a cibo vomitū prouocent tunc in modum, cuiusmodi loci praebent meri heminam, mox omnis generis cibos ingerant, nec in comedendo bibant, nec a cibo, sed concineant se, dum quatuor stadia quis progrediatur. Deinde illis qui potum triplex vinum miscerit, auterum, dulce, et acidum, primum met acutus, et paulatim longè in vici- nis intervallo, deinde diluunt, celeriter, et assatum. Quandoquidem pro gracilioribus, imbecillioribus, que vomitū felicitate excitando hic Hippocrates septem obseruat. Primo enim atque cibo vomitū prouocent: ut graciliorum venter gracilis humectetur, ac etiam cibo ad ventriculi fundum descen- dendo, facilius vomitus irriteretur. Praeterea imbecillioribus tutior est, vomitus prouocatio per ci- bos, & potiones alimentales, quāni medicamentis. Cetera verò sex constituit, modum omnino dilucidando: quoniam secundo vinum meracius, primo postea dilutius vinus huiusmodi quan- tate calidum praebendum porrigit, ut eo vino calido venter calseat, humoresque colligantur, sientque fluxiles, ac via laxa, & aperte euadant: Vterius est, ut eo vino imbecilliores toborentur, hinc etiam, ut natura sua facilitate ex pulseri, validiori facta, facilius obnoxiam materiam expelle- re valeat. Tertio ait mox omnis generis cibos ingerant, nempe cibos austeros, ut ventriculus toboretur, quo roborato, facilius vomitum facit, & cibos dulces, & pingues, seu oleosos, qui vomitū concitant, ac humores emittunt, & acidos, qui succos, ventri infixos, abstergere possunt: ut etiam de his superbibendis afficit, ut infra patebit. Quarto autem ait nec in comedendo bibant, nec a ci- bo, ut hi varij cibi a vino superbibito statim non supernant, & ne vires eorum emittant, ut Gal. ait, in com. Vnde ut ex parte tenuiori alimentorum iam assumptorum quadantem venter, coe- perque nueriatur, toboreturque, necnon etiam, ut ea cibaria varia suauis quodque vires allatas, & venter, & humores impetiat. Quinque verò, ut ait Gal. tempus etiam constituit interueni, quod commovent, nutritioni sufficiens, ipsam ad id tempus promittant, dum quatuor stadia quis pro- grediatur. Sexto, ut Galenus depromit, dat bibere tertia, qua inter se sunt diuerso qualitatibus. Nam aliqui dicunt auterum ipsum administrare ob instrumentorum, per quae vometur, robur. Dicit et, ut vomitum concitet ad hanc, quod frigidat humores dulce vinum. Acidum, ut absterget, quae ventriculi sunt infixa. Septimo autem declarat modum, quo primum vinum meracius, postea diluunt praebere debeat.

Modi et ordo
quibus facilius
& citius gracili-
ores debet.

Sept ad hoc re-
de agendum,
ut sup. allegat.
ter.
Primum.
Secundum.

Tertium.

Quartum.

Quintum.

Sextum.

Septimum.

debeamus: Nam primum meracius, & paulatim, longoque temporis intervallo, ut eo vino generoso inibecillis patiens primo roboretur, & calsiat, ut prima indicatio à natura cōsuerunda est hausta. Deinde diluissius, celerius, & assatim, ut veluti à lanacro interno viæ relaxetur, & quodammodo ventriculū ad vomitum concitaret loco vomitorij medicamentis: tametsi Galenus coniecit hūc Ancorē in hoc perscitere videatur: qui Autor hic meo quidem iudicio intelligendus est. De vomitu verò concitando Galenus ait hos positi vomitorij potum, fac vomere: quod si difficulter euomat prius concalscere oportet, quia os ventriculi circumstant loca, & manus, & pedes: quod si neque hoc modo possunt euomere digito, aut pennas demittendo irritare oportet: quod si neque sic euomat rursus his oleum calidum, quod optimum exhibendum cum de viriosis humoribus os ventriculi mordicantibus alloquatur: hinc in pituita tunc vomitorium validius iterandum: Plures autem vices vomitus crassus hominibus: Paucas verò siccioribus conferre ait Hippoc. Vomitionibus autem post cibos cuiusvis generis, humidiores ter in mense utantur: sicciores verò bis, & sub id tempus lenioribus, & paucioribus laboribus utendum: & alibi inquit vomitionibus utantur per quatuor ut minimum dies. Et ad hēmorroidas curandas, seu euicandas, exarat. Poma septem diebus, aut ter in mense: nam hoc pasto optime corpus habebit. Adnoto autem duo hic: Primum namque, ut pauciores vomitionis dies fragilibus conferat, plures verò nobis: data paritate quantitate pituitæ peccantis, his corporibus proportionē respondentis: secundum est, quod Hippoc. seu Hippocraticus Autor asserit per quatuor dies continuos singulis diebus vomitus fieri debere. Nam in motu vomitionum disponitur materia ad faciliorem vacuationem: Vnde secundo die pituita egreditur, quæ primo disponebatur, ac ita de tertio, & quarto die respectu secundi diei, ac tertij dicendum venit: licet Gal. assereret nihil tamen causa est, quia per intervalla ista faciemus non continuos duobus diebus. Verum in hoc, & ægri natura, & emolumentū, & damnum vomitionis per dies continuos peratæ, aut interpolatos perpendenda veniunt, ut vomitiones ventura agendæ recte fiant.

CAPVT VI.

Pituitæ crudæ copiosæ primarum venarum ad aluinam eductionem inter præparatiua pharmaca, ab Hippocrate, & Galeno statuta, connumerantur, quæ vsq; ad tertium diem, & quartum, & septimum etiam pro nutrimento isti autores præbebant.



Repasantia autem pituitam crudam, in primis venis redundantem, non modò tenuancia, incidentia, aperientia, siccantia, simulque detergentia esse debent: At verò (ut antea ostensum est) etiam moderatè actia, miteque ventrem subducencia, mitissime aluam proritando: & quæ quoque vim quandam nutrien di continent: sine calfactione euidenti, ut oximeli, aqua multa, aut hyssopo, seu aliquo alio tali medicamento incidente incocto, cum exararit Hippoc. in cruditatibus propolitis febrem etiam, & grauem, ac implacidam concitantibus. Hoc ita degere oportet, ut nihil præter oximeli aquosum tangant, forbitiōnem autem non dabis donec sese malum remiserit, & vrina maturentur, hoc est, quousque hæ cruditates quadantenus coquantur: Si tamen ut ait Gal. in comæger virium robore suffecerit. Gal. verò hanc rem confirmando: primò ait esto ei cui domus, & e. sanè multa, in qua coctum hyssopum sit, his aptissima est, seruandumque ne vel cibum, vel forbitiōnem, vel aquam exhibeas, vel omnino liberaliter libere sinas, nisi multis tribus diebus primis domtaxas, quam vñtus rationem tenuissimam Hippoc. de liact. sect. c. 1. 3. in inflammatione iugillatorum seruatur, qui cum inedia in cruditarum alteracium vsque ad septimum diem peragen dam in his cruditatibus coquendis esse, statuit, inquit, eustodies deinde ægrum, donec septimum peruenire diem, & c. quod tamen in pectoris inflammatione ait: Sed Gal. in his cruditatibus vsq; ad septimum aqua multa, hyssopo percocta pro nutrimento præbenda ex Hippocrate depromit. Si verò mediant tibi iter primis diebus, ut dictum est, nihil ac corat incommodi, si dem ipsi vteris vsq; ad septimum aqua domtaxas multa, in qua incoctum hyssopum sit, contentus: Rationemque illico alligans illius diuturnæ inedia, inquit, Si quidem longissimam, qui ita sunt affecti cibi abstinentioni ferunt: corpore scilicet ex erudit ipsi, quos contineat, succis conuocandis alito. Quam rationem alibi asserendo ait. Ergo nutries eos maxime oximeli: aliquando etiam prifane, & mulsi exiguo quopiā. Sustinet enim bis vñtum, si modo alij vñstem: ipsa nimirum erudorum copia, quos paulatim coquant ad corporis alimentum abvntes. Vnde talc præparans quidem est, quod parum nutrit, non usquam per angustos meatus herat, sed & permeet ut vñtus per totum detergat, & quicquid in semio sit, crudisue succis continetur crassum, id dissecet id est incidat ac resoluat. Horum ipsorum gratia, & multa bis idonea est, & oximeli, & apomeli, & piper, & zingiber: poltre mō omnia, quæ eū a viriosis generationem succi, humorem crassum dissecant solvant. Quocirca inter alimenta, ut asserit Galenus prifana

De vomitu et
candō Gal. a
git, vomitū
medicamēti o
pe, cum intrin
sica affecit, s
cum extrinsec
admotu.
Crassū, & sic
quæ rixibus vo
mitū opor
tuit.

Primo admodum
vñtus dicitur.
Secundum ad
modum.

2. Ad Glan. c.
14.

3. De vñt. cap.
14.

1. De vñt. c.
p. 117.
4. De vñt. c. 14.
m. 11. 12.

C

4. De vom. c. 14.
m. 11. 12.

4. De vom. c. 14.
m. 11. 12.

4. De vñt. c. 14.
m. 11. 12.

4. De vñt. c. 14.
m. 11. 12.

12. Meth. c. 3.

11. Ibidem.

4. De vom. c. 14.

4. De vom. c. 14.

11. Ibidem.

Præparatiua in
temedia pro
pituita in
prima ostendit
se vñtus.

Quædam eni
dicuntur piti
tossam pectus
regionis vsq;
ad coarctationem
sacram pro co
arctatione regu
li aquosum dan
tum ex Hippo
critis vñtus ta
leo vñtus per
mittit acco
modo.

Multa hyssopi
f. ita pro nutre
mento trib. p. 1
m. 11. 12. 13. 14.
dunda ex Gal.
& Hippoc. de
c. 14. vñtus vsq;
ad septimū diē.
Vbi pitiuita co
quenda est.

Ex quo redit.
Confirmatio hu
ius rationis.

Concludit asser
tione.

Alia idem.

Multa autem
apomeli piper,
& zingiber.

Pituita contine
& multa sacra
aliqua.

Multa autem
apomeli piper,
& zingiber.

Pituita contine
& multa sacra
aliqua.

Multa autem
apomeli piper,
& zingiber.

Pituita contine
& multa sacra
aliqua.

A. *prifana cremor in hoc cafu tutior eſt, qui tunc modice nutrit. Muſum autem quoque inect alimen-
ta conuenerunt, inuſque. In alimentorum ratione ſunt priſana, & muſa ſimplex. In pharmacorum
verò oximeli, & nucumque incoquere in muſa natio compoſita licet: con calamiſtha, & hyſſopum,
& origanum, & ſerpillum, & rram, & apum diſtinctione tamē facta, ſi febris non adit, cum ſub-
inde aſſerit. Per ſerum ha omnia uſuſque ſalutidiora, ideoque febres accendunt: a trique ut vinum nu-
mirum aqua his compoſita oximeli uſuſque licet nec febres accendit, ac ſtremū deterget: ſed et ea que
glicimoſa, craſſaque ſunt, diſſoluit, & meatus obſtruſtos liberet. Hic autem ſpeculoſo, Gal. hunc in ſo-
cum etiam pituitam crudam, in venoſo genere redundante accepiſſe curandam: proinde et
calamintar, & apio muſum incoquendum ſtatuit, que ad corporis habitum, cruditates ducte
Idcirco in prime regionis pituita crude curanda redundancia nullatenus conueniunt: Sed tan-
tum Muſe hyſſopum origanum, iſecos, & ſerpillum incoquendum ſunt. Venio poſſimum hyſſo-
pum incoquendum, ut ex Gal. licet, aſſerente. Ergo quibus intus erudi ſic copia eſt, & forſis la-
ſſitudinis ſenſus, per hyſſopum in muſo coquens, non ſtatim nec primo die, ſed in ſequentibus diebus. Vi-*

hæc autem multo impoſuenda quæſione incidentia, ſimilique tænnantia ſunt, patet ex roſi Ma-
Gaſſeæ ſententia. Proſitum melacratum exhibebit proſitum cum cineribus ſedatis medicaminum quorū
veluti hyſſopo, origano, & interrim citius uſurā, aut pulgū, aut certe cum melacratō oximeli ſibi
Oximeli namque cance, talique efficaciter ſi habet, ſi ex hyſſopo, origano, ſeu pulgō, & mel-
copotum fuerit, ut animi defectus, & ſyncopeſ ex copia crudarū obſtructioneſ procreante obor-
taſe exiſti curetur, ut Gaſſ. falſus eſt, maxime additis arenuantibus, quæ uil illos oximellis, ſi
compoſiti adaugentiam aucto oximeli ex iadibus ſimul protreſſent, a pīſi, alparagorū,
bruſci compoſitum, cum diarrheticis ſit, ſiſ cruditateſ nocuium eſſe. Conteſtior autem in-
retum in ſumma crudarum nituroſorum copia Hinoacratem, & Galeniū oximeliſ dūper

xat, ut alimento alterante vltra septimum, reliquo toto tempore vlos fuiffie vbi a fuffocatione, calidi innai immixtis difcremen erat lipothymia, & fyncope, ut patet ex eodem Gal. de cruditatibus harum comia, rum primæ regionis, tum fecundæ, alloquẽce, præterit quorũ pulfus patius, & tardius, fimulque rarus fuerit, cum decomprefio, oximeli pro mulfa exhibere effluẽd debebit. Quod fi huius affluus vltis tadio effe cæperit, tranfire iuniet ad mulfam, & præfentem conueniet, dein rursus ad oximeli remitti. Maxime verò quibus iam parius, tum tardius, & rarus pulfus effe, fi frigidos febiles fuccos putandum, iſdem prætiũ & color vitatiũ in toto corpore manifeſtẽ cernitur, &c. Ergo æſas ſit, & æger frigida potione affueſtus frigidũ viciũ oximeli adhibe. Sin hyemi ſi omniũ ca-

madum sumy, qui frigida confusum offeres. Hac igitur de videris affatim succos esse animaduersis, oximeli pro multa exhibere affatim debetis, ut aiat Galen vbi multa cruditum et putrefactum copia fuerit, pro potione oximeli dandum fit: quod alibi quoque inter potiones in his casibus connumeratur, vbi scribit. Porro oximeli multa trinum tenet, et album et r. De multa vero in vobis alimentiali exhibendo, ad album mihi leniendum, bac docere voluit Gal. Accidit nam-

que post aquam mulsum, ut ea, qua in primis visis, qua scilicet circa iecur, & mesenterium sunt; colligi solent, hoc remedio commodè discurrant. Quod si maior visio superfluum impetum a d. alium citius, principio quidem percoquere mulsum amplius oportebit, ut à leuori alium, inde ducente exordiamur. Ea namque sicut minus alium subducit, ita magis iuti li, ac etiam roborat: contra vero cruda multa, ut minus iuti li, sic etiam magis subducit. Post hoc si superuacua largius descendat, ne sic quidem sistenda, sed exhibendum pro aqua multa prorsus cremor est: si vero fluere pergant alia idest tati succi fortissime mueris, pulsum interim ratione obseruata. Aliquando enim subito ad imbecillitatem, vel inaequalitatem, vel paruitatem mutantur. Quo tempore panem ex vino diluto exhibere conuenit, utque si nec ventriculus, nec iecur phlegmone laboret. Quæ omnia tum pto alterantibus etiam in vicus tantes adhibendis, tum quoque his præparantibus ad ijs alimentis ventrem subducenribus. Item hunc virum roborem conservantem proportionem adquare respondendibus

omino pacificandis me diffile volui. Caterum demum perpendo oximeli, sicuti pituitæ crudæ conducit: ita ubi humores acres fuerint, ibi aceti acris ratione oximeli haudquaquam cõfert: cum oximeli parum acre sit ac Hippocrates, & Galenus. ideoque in acris non oximelli, sed mulfæ, & pitufanæ cremor, & oleum dulciffimum, seu opicium maxime confert: Pitufanæ autem cremorem, mulli comixtum, præparabat Hippoc.

4. de viç. ear. in morb. acu. tct. 76. vbi pituitæ crudæ copia
inf. flabat, & 2. de morb. pag. 470. idem decem
diebus. Hæc autem remedia acris

conducunt humoribus, vt epic-
rausticam habeant
faculta-
tem.

Oximeli styde
nisi hylopo
incola in
mollissima.
In febricitis
hylopo colla
non caput
nec vultus.
In febribus vero
oximeli conu-
nit.

Calpurnia de
spum cu diu-
nifica sine la-
mali non sunt
coquenda in-
dianis. prima
regionis ralis
propanda.

Hyssopus ar-
tisanus, luteus, &
serpillē in mod-
is conseruata sunt
in herbaria siccis.
Osmorhiza hyssop-
o, origano, &
serpita codicum
quælibet fa-
cultates.

Ad Lycophyl indolentem et crudelitatem tuam, Osmeli diuturnum crudelitatem primas regium recte et iustis obedi.

de vino ad rem
pos. quo sibi o
ccidit, manet
ex parte, & quo
omnino. agnos
li, & aqua con
si compulsi ad
rem ex catha
ra.

data feriendo
per penam co-
quingitae radi-
ta, nimirum po-
mella simpliciter
exhibenda in-
terduo vero de
motu protulda
si pallus rona

me nascos fi,
Omnelli quillo
fignati, & quillo
de calidè, jecti
dundem.
A pîncipiu mul
fi sîmples colta
danda de munda
cunda, cum valè

Quando loce era
de anellu, p'fiss
na cornua, de

fieri faciem exhiberi debet per alimen-
tum.
Pulvis amari-
tans in studiis
tribus explosis
debent.
Quamvis quib-
dam.

In scribis, fuerit
non caritatis di-
stinctio, sed multa,
de personis cre-
mentis, de aliis
duobus illis con-
tinentibus.

Math 50

Ibidem.

Methods

4. De mes. San.
e.6.

Lib de cur. res.
per lang. maff. n.
14.

Idem 12. meth.
e. 8. & 9. meth. c.
20. & c. 21.
9. Ad Glau. c. 14.
& 20. meth. c. 3.
Et 1. de stricte
te vifus sat. c.
3.

22. **Math-cg**

Ibidem.

Ibidem.

4. De torn. fan.
64.
F. Meth. c. j.

3. De viſitandis
m. 2. c. 10.
4. De viſitatione
m. 2. c. 110.
5. De ſimp. med.
fac. c. 11. & 12.
meth. med. c. 13
6. Ad Glauco. c.
14- & 1 de ſim.
med. c. 11.

CAPVT

A retentam expellendam. Insuper asthmaticis, alijsque respiratione afflicto est expertum optimum inuenit: tam effica calicarium, et eius oleum calfactissimum, et vlcerauium fit. Quod sane de eius spiritui non est existimandum, vt iam fatis ostensum fuit. Si itaque antiquiores hoc medicamentum tunc præbante calfactissimum, ac vlcerauium; ergo eo tunc hoc præsidio arte frigidatiuum reddido, nihilque vlcerauium vti possimus, vt Quercetanus satis exploratum habuit. Vt iterum recensor Oñaldus Crolius reperit, et exarans. *Vtitur 6. aut 8. guttis in vino aqua mente crispæ, vel quod melius in iure carnis edido. In debilibus ventriculi frigidi, quæ digestiue promouet. In calculo, ære in aqua ononidis. In suffocatione matris, in aqua æ. emissa. In febribus plomæchi, calidioribus, et fiti 12. vel 15. guttis in aqua centauræ, et profuso &c.* Qui Medicus philosophus ita docuisti vixit. *Guyp. p. 131. Baric. f. 12. sunt in menta. et de. et Guyp. p. 131.*

C A P V T I X.

Primæ cruditatum regionis detergentia externa præsidia, quæ ad mouenda sunt eo tempore quo vias relaxantia adhibere non licet, statuuntur.

Topica autem, seu localia à Galieno vocata, quatuor generibus sunt, vt lib. 4. iam dixi: Quandoquidem & vis deterfua, quæ in cruditatibus adimendis, ad moueri possunt: abique quod corpus totum ex purgatum sit, neque pars cruditas referat purgata partim sit, neque cruditates eius partis relique partim concedit, vt lascentibus conuenit administrandis nunquam enim mollementia ipsa pro vijs aperiendis, relaxandisq; administranda sunt, quin hæc omnes tres reperitur conditiones vt lib. 4. ostendit: Alia præterea topica calorem partis affectu imbecillum languidi coquentem insuantia blandè calfactoria, cruditateq; simul maturantia fe habent. Quarta, verò topica hercè diaphoretica, hoc est, insensibiliter per haurium, in dissipationem euacuantur, crudorum in tertia, & quarta cruditarum regione redundantium, habentur; quæ omnia diluenda veniunt. Topica itaque primi generis nunc cataplasmata deterforia nuncu parta constituenda veniunt inter quæ hæc inuenitur. *(ortex vero raphani si in modum cataplasmati ponatur cum melle commixta hydropicis & spleneticis prodest.* Præterea Quo magis cataplasma, quæ ex oximelite, & absinthio, & capparibus sunt illi sunt idonea, & alibi ait cataplasma quod ex oximelite, & faba

Etiam si de chalcidibus, ac etiam
oleis ignis sit.
Ergo eo magis
chalcidibus ignis
etiam si sit, non
est, cum de
felicitate exhibenda.

Libertine.

Verfahren:

Experimentation
als unsere Fach-
in diese Sparte
verteilt und je
abhängig vom

Cum in (pi)s-
ta rapidi pre-
bido, ad pueri
regionis crudi-
tatem et ad
preparandum, sic
est.

Topica id est lo-
calia detergen-
tia adhibenda
ex tempore qua
laxantia ad con-
servatum viciu-
tum reliquum
corpus non est
purgatum, nec
materia ex parte
facili eliminan-
da: inobediens
nam creditibilis
esse potest causa
dixit.

Topiceis quae-
dam sunt gen-
era.

Gal. primum de-
terribitum esse
natum.

Secundum circa
plasma Glan-
terium.

See *basilica* &
twice pag. 110
& 111.Prime 4000 II
 2c. 418.

Elb. singl. sp.
state 677, 678.
lit. fr.

De verdie, 1911.
115. p. 100. 1.
116.

D
 3. De loc. aff. c. 4.
 12. Meth. c. 3 de
 Romet. c. 4 de 12.
 meth. c. 16.
 13. Idem loc. de
 3. de vi. r. r. r.
 ma. c. 6. de 12.
 meth. 17. & 6.
 epist. c. 4. p. 1.
 14. meth. c. 12.

Lib. Got. unib.
de Comp. me. Ap-
F.
ss. Mich. 16.
6. Mich. 24. =

Vetus olei dige-
rentur ea herbis,
feminebus vbi
cibus & mra fa-
cium a Gal. po-
tuit.

Oleum vetus
valde digerit
remet vno val-
de emolliat.

teriz, concoctionem efficiendam iuvando: Si autem oleum effeceris ex herbis, feminibus, & alijs, vt ait Galenus oleum tenuissimum maturissimum esse debet; potissimumque quod est antiquum: Si ad digerendum aliquod transieris: Mox in vase duplici tansisper calfeceris, dum modico riter q' alius: em berba imberis, oleum enim calidum, et sic se digerit. Si tenuissimum exher generis fabinum est, fuerit: Nihilominus cum medicamento digerente fortius digerit: Hic autem aduer- te oleum fabinum vetus valde digerere posse. At recens valde emollire, & relaxare, doloresque, in igris fedare, minus tamen admodum digerere, quia id, quod recens est magis per balium digerit nempe laxando; minus tamen tennat, minusque calfacit: hinc in profundo minus digerit, quam vtilitum. Ceterum, vt idhar digerentia, ne dum crassas, viscidas, & frigidas mesenterie coquant cruditates ar vero etiam spiritus calidi innoti mesenterie viuificant, simulque aduant, & excitant ad concoquendum per modum calfaciendi ista maturantia administranda, percendo, vel per modum fomentationum, p'ongijs moliendorum, vt in decoctibus vsu veniat, aut per modum stil licidij olei, hora vna ante cibum singulis diebus id executioni mandare posse: totoque diei reli- quo tempore, vel cerato imposito, aut vnctione, lana pecuina sordida, carmelata apposita, ca- lidaque semper actu conseruata.

CAPVT XII.

Primæ regionis copia à cruditatibus vnà, & flatuum copia valde offensa: ca-
loris naturalis languidi, coquere nequeuntis roboratiua, simulque
cruditarum concoctiua, & flatuum, discutiua phar-
maca interna, ex Galeno conscribuntur.



Vperest autem, vt ea, quæ lib. 4. c. 13. & etiam c. p'p'et. proposita fuerint; disqui-
ramus, vt calore primæ cruditarum regionis à copiosis cruditatibus vnà, & fla-
tuositatibus ita imbecilli reddito, vt ne dum, tum eas cruditates, tum cibum co-
quere calor is valeat: at vero et deterius imminuat, nempe vt animi deliquimus,
& syncopem, vt ait Gal. ubi maximam crudorum succorum copiam vnà, et cum oris
ventriculi, quod sanè stomachum offensum: Hinc ad hec symp'tomata petitiua cur-
randa, inquit dandum piper, aut diatriâ pipercon, aut diaspolicum, vbi multa pituita frigida in ore
ventriculi furrit acerrata, sicuti etiam zingiber dandum est, quæ roborant, coquunt, flatumque
discutunt, & ad intestina, & aluum, tum flatum, tum crudem ipsam liquidam ducunt. Nil-
hil autem in genus venosum, nec in reliquum totum corpus ducunt. Quo circa eodem tempore
quo ad quantibus internis vrimur in præcordijs tenus, ac milaris, turgidique facias, ob eadem
cruditates, his flatuum carminatiuis, caloremque innarum roborantibus, cruditarumque macu-
ratiuis, ac denique chylicationem moliendâ, iuantibus, aliois pharmacia, vt deinceps
alioqui in acri perirent. Aut enim Gal. Quoniam autem præcordia illiusmodi omnibus tri-
gida, infla-
taque sunt, ac facili quæque assumptis in flatum vertitur. Quoniam, vt etiam iam dictum est,
vbi fusè de fluitus generatione in vrina sublingali li. 3. c. 39. Nani tumor durus: obstructions à cras-
sis, & viscosis humoribus spiritusque sen sitiosus distentiones, idque in extremis vasorum partibus, quæ
ex vena ipsius portis exoritur: Nam quidem obstructions sequitur grauitas sensus, quæ dextro hypo-
chondrio incumbat: Quod si baliosus quoque spiritus, cui non potest exire, ibi concludant: non solû
grauitas, sed tensionis etiam sensus sequitur. Subinde autem Gal. pergendo ad hypochondriorum
tensionem, inflationemque; de mendam p'fidia allata proponit, deptomens non matie fuerit lou-
gi piperis aliquod cum cibo dare: quippe quod flatuosi spiritus crassitudinem soluit, & quæ in præcor-
dij pigra cessant ad ventrem inferiorem depellit & coquendi, quæ semper subuenit pro comuni
piperum ratione. Quod si huius longi copia non est, vixque albo videntur, quippe quod supra duo reliqua
genera ventrem roborat: Sin hoc non adest optimum nigrum petendum est: id vero fuerit, quod pondere
præcellit. Illico autem postea ad diaspolicum remedium perueniendo concitibendo, inquit.
Vtilius sanè sit, & diaspolico medicamento vari, cuius compositio duplex est. Alias ex partibus cum-
mibus, cumino, pipere, vni a nitro, potellique ita magis ventrem solvere: cum nitrum acre sit, ac alia
stimulet. Alias cum reliquorum pari pondere miscetur nutri dimidiatum solùm: hoc minus aluum
mouet. His autem duabus compositionibus, diaspolieticis, conscripitis, postea hæc simplicia me-
liora eligenda præscribit: subinde modum, eam compositionem concitandi, nos docet: hoc
modo: Præstiterit autem cuminum esse, quod vocant Aethiopicum. Piper vero vel longum, vel
album. Macerabitur cuminum in aceto maxime acri deum continuo id trahitur, aut etiam prius
modice frigidum in vase fictili, quod colium in camino quam optime sit. Quæ enim exallic, penitus-
que colli non sunt, hæc luteola potius, quam figulina sunt, & qualitate suarum nihil mediū acen-
tremittit. Sunt vero & rura folia modice siccata: Vt enim si pluvium fecerint, actia, amaraque
redduntur, & supra quam par est calida: Si prius non fuerit, excrementum quendam humorum re-
tinent, non dum ex toto concoctum, cuius viro flatum discutere minus possunt. Quare his aliquando
discip-

Potentia colo-
rum naturalium
aliorum parum
imbecilli in
modica.
Piper, dicitur
se peritum dis-
policum &
singulare.

P'p'etis nati-
gido in vltima
sali vltima co-
gna sunt.

P'p'et, longum,
P'p'et album,
Nigrum.

Diaspolicis de
syrigis, & com-
posito duplex
a Gal. sit.
Primo rura
opporuit diti-
gna.

A
12. Meth. 2.

1. De comp. p'c
gen. cap. 4. de 6.
meth. c. 1.
2. De com. med.
p'c gen. 2.
3. Meth. 2. de
7. de comp. 12.
p'c gen. 3.

B

12. Meth. c. 3.

1. Ad Glasc.

2. De

C

1. De fini. 100.

2. De 2. c. 3.

1. De recen. 100.

2. De

1. De 2. de hoc ad.

2. De

1. De 2. de hoc ad.

2. De

D

1. De 2.

A deformatum mel additur, aliquando nihil, sed sola sine melle reponuntur, ac prisana cremari, & alijs, quibus maxime convenire videntur, cibis immiscuntur. Et hic est vnus modus assumendi diaspolicum in cibis loco specierum. Tamen aduerte in diaspolitico pulueres tuderet, non autem tenuiter esse debent, tum ne in vasis ingrediantur, tum etiam in venter inhaereant, mordicent, ac ventrem inferiorem subducant; vt Gal. ipse statuit. Ceterum statim secundus modus, quo diaspolicum id remedium assumere possumus à Gal. proponitur, dicente sumitur & per se medicamentum hoc & ante, & post cibum. Immo tres illi modi sunt diaspolicum accipendi. Primo enim, modo toti ventriculo aequaliter auxiliatur. Ante namq; cibum assumptum magis ventriculi fundum tibiatur. Post cibum autem magis stomachus fouetur. Eamq; sanè ob causam medicamentum id adhiberi potest, sicuti res postulat. Denique verò Gal. Diatrium pipereum landat, ad has intentiones propolitas executioni mandandas, exarans. Expediatur autem preparatum habere ad

Modi probandi diaspolicum. Obsecratio in diaspolitico correspondens. Secundus modus dandi diaspolicum. Accipit.

4. De men. lib. 4.3.

Ibidem.

Ibidem.

manum dupliciter medicamentum triapi perco paratum sicuti ipse sulco, alterum simplex, quod vique bis dandum est, qui parum concoxerit, & qui recens frigus in ventre habent puratissimum succum. Alterum quod medicamentum magis est, quo maxime trinitur in fluxionibus, quæ à capitis descendunt ad pedes. Verum hoc gallo fit preparatum alibi dicitur. Nam hic prius simplex diatrium pipereum explanat, inquit. Simplex illud, quo ad eruditatis abundantiam, qua in primis est venis vniuersi huiusmodi est. Ad cuiusque triumpiperum drachmas quinquaginta abunde adduntur, anisi, ac thimi, & zingiberis singulorum drachma esse. Sin adhuc magis simplex volueris id fanè erit, à quo destratum zingiber est. Verum subinde aliud validius deferitur. Alterum verò est, quod ex istis conficitur; Verum ad cuiusque triumpiperum drachmas quinquaginta reboquon cuiusque sexdecim drachmarum inuncta pondus, nempe auzi, thimi, & zingiberis, quo etiam ad proposita vtrumque commodissimè. Modus verò hoc medicamentum componendi ibidem quoque statuitur. Quo factò, statim modum; ac tempus id medicamentum præbendi nobis assignauit. Hoc igitur medicamentum dare conuenit non semel, bisne quotidie, sed etiam sæpè si quidem morbo, & acute cibum, & etiam post cibum euacuatim plenè datur. Postmodum verò eius quantitates exhibendi perhiberi alicuiens. Cuiuslibet pleni mensura, atque huius quidem, vt pariter parat. & maxime maximi, ita medijs tensionibus, ac inflationibus ad portionem ænipe medijs coactant mensura. Postmodum autem aliud medicamentum ad eandem intentionem ponit, scilicet zingiberis aceto macerati præsidium, vt calor eius vehemens, qui cruditates in totum corpus duccret aceto extingatur. Quocirca alia medicamenta ita calida, quæ eas eradicates in totum habitum impellerent, damnant vt euitanda: veluti sunt fefeli, hysciscum, eleum, spica Nardi, cassia lignea, & alia ijs similia. Verum præterit diacalaminthen cauendam esse statuit, cum dixerit. Præter ea etiam zingiber, quod ex barbaris asseritur, acipion, acerrimum. Est id virentis herbe radix, à coctibus statim in acetum coniecta. Extingitur enim cismo di medicamentum calor, circa ipsas primas venas, nec in totum perferitur, corpus, veluti aliorum quorundam cismo di medicamentum est, quod diacalaminther præperea quod calaminthen recipit, vocant. Alia verò nãrã etiam paulò in superius in compositione diaspolitici explananda damnauit. Denique autem Gal. inuenio, alibi aliud pharmacum conferripit illi ad conuoluentem, quod parum scilicet cibos concoquant, tum ad appetentiam excitandam, ut, qui ea languent, & in infirma quod ventus robet conciliat, & compositionem ipsius, quæ ad hunc modum se habet. Accipies succi malcy cyconorum, quæ dulciora, maiora q; sunt, ac minus acerbã, quæq; nostrates in Asia graec vbiuolunt vocant, sexdecim romanos duos, quibus mellis optimi tantumdem misce bis sextarium vnum, & semissem, hac cum super primas modice coxeris, & snum destraxeris, immittes zingiberis vntas tres, piperis albi duas, dein versus in sinistis igni recoques, donec mellis crassitudo assat. Hoc verum medicamentum est, quibus inuallidum iecur est salutare in primis est: id duas, triobus heris ante cibum obuleris, maxime dandum esse medicis mystri modo. Verum ne vltrem ad desingrat, vtor eo ego in meis eporetantibus vltico post epnam, seu post prandium. At verò perpende, sextarium vnum romani mellis micas 17. continere. Mystrum magnum autem habere mellis micas 4. & semissem, parum verò habere drachmas 9. Quocirca mensura istius medicamentum Mystrum medicis esse debet, non aut magni, nec parui ergo ad vnc. 3. circiter dandum.

Diatrium pipereum conueniens. Simplex diatrium pipereum. Triumpiperum in fluxionibus à capite. Simplex vltis in cruditatibus primarum venarum. Triumpiperum in cruditatibus primarum venarum. Triumpiperum in cruditatibus primarum venarum.

4. De men. lib. 4.3.

Modus ut rem. possit dandi. Dosis est.

Zingiberis aceto in cruditatibus vlticis.

Diatrium dam. nãrã de Gal. pro. nuntiat.

Diatrium dam. nãrã de Gal. pro. nuntiat.

Dosis. Triumpiperum in cruditatibus primarum venarum.

6. De men. lib. 4.3.

Lib. Gal. arch. de pueris, & mens. 275. 3. 4. 6.

B utrumque triumpiperum drachmas quinquaginta abunde adduntur, anisi, ac thimi, & zingiberis singulorum drachma esse. Sin adhuc magis simplex volueris id fanè erit, à quo destratum zingiber est. Verum subinde aliud validius deferitur. Alterum verò est, quod ex istis conficitur; Verum ad cuiusque triumpiperum drachmas quinquaginta reboquon cuiusque sexdecim drachmarum inuncta pondus, nempe auzi, thimi, & zingiberis, quo etiam ad proposita vtrumque commodissimè. Modus verò hoc medicamentum componendi ibidem quoque statuitur. Quo factò, statim modum; ac tempus id medicamentum præbendi nobis assignauit. Hoc igitur medicamentum dare conuenit non semel, bisne quotidie, sed etiam sæpè si quidem morbo, & acute cibum, & etiam post cibum euacuatim plenè datur. Postmodum verò eius quantitates exhibendi perhiberi alicuiens. Cuiuslibet pleni mensura, atque huius quidem, vt pariter parat. & maxime maximi, ita medijs tensionibus, ac inflationibus ad portionem ænipe medijs coactant mensura. Postmodum autem aliud medicamentum ad eandem intentionem ponit, scilicet zingiberis aceto macerati præsidium, vt calor eius vehemens, qui cruditates in totum corpus duccret aceto extingatur. Quocirca alia medicamenta ita calida, quæ eas eradicates in totum habitum impellerent, damnant vt euitanda: veluti sunt fefeli, hysciscum, eleum, spica Nardi, cassia lignea, & alia ijs similia. Verum præterit diacalaminthen cauendam esse statuit, cum dixerit. Præter ea etiam zingiber, quod ex barbaris asseritur, acipion, acerrimum. Est id virentis herbe radix, à coctibus statim in acetum coniecta. Extingitur enim cismo di medicamentum calor, circa ipsas primas venas, nec in totum perferitur, corpus, veluti aliorum quorundam cismo di medicamentum est, quod diacalaminther præperea quod calaminthen recipit, vocant. Alia verò nãrã etiam paulò in superius in compositione diaspolitici explananda damnauit. Denique autem Gal. inuenio, alibi aliud pharmacum conferripit illi ad conuoluentem, quod parum scilicet cibos concoquant, tum ad appetentiam excitandam, ut, qui ea languent, & in infirma quod ventus robet conciliat, & compositionem ipsius, quæ ad hunc modum se habet. Accipies succi malcy cyconorum, quæ dulciora, maiora q; sunt, ac minus acerbã, quæq; nostrates in Asia graec vbiuolunt vocant, sexdecim romanos duos, quibus mellis optimi tantumdem misce bis sextarium vnum, & semissem, hac cum super primas modice coxeris, & snum destraxeris, immittes zingiberis vntas tres, piperis albi duas, dein versus in sinistis igni recoques, donec mellis crassitudo assat. Hoc verum medicamentum est, quibus inuallidum iecur est salutare in primis est: id duas, triobus heris ante cibum obuleris, maxime dandum esse medicis mystri modo. Verum ne vltrem ad desingrat, vtor eo ego in meis eporetantibus vltico post epnam, seu post prandium. At verò perpende, sextarium vnum romani mellis micas 17. continere. Mystrum magnum autem habere mellis micas 4. & semissem, parum verò habere drachmas 9. Quocirca mensura istius medicamentum Mystrum medicis esse debet, non aut magni, nec parui ergo ad vnc. 3. circiter dandum.

C ruditatium pituitosarum prima regionis medicamenta lenitius eliguntur, validè verò solutius ignea, acrioraq; damnantur.

C A P V T X I I I.

Cruditatum pituitosarum prima regionis medicamenta lenitius eliguntur, validè verò solutius ignea, acrioraq; damnantur.

Entum quancq; pituita cruda in primis rediūda venis, tēporis processu à natura ne dum coquatur, vti ē in perfectum transmigrat sanguis, nec tamen hęc pituita superuacua tam atzē aduēta, quam à natura concoctā, in has relinqui debet venis, qui ipse q; eam per vices euacuare debemus pituitā. Sicuti acres succi valida epos purgatone, cum hi ad nutrimentalē conuerti nequeant benignitatē; nec his humoribus epos nostrum ali valcat. Vnde confestim hi educendi sunt, quemadmodū paulatim pituita euacuāda est. Verum enimvero paulatim dico, cum vbi hęc cruditates gignuntur, semper ventriculus

Tomus Tertius.

1 3 imbecil.

6. De men. lib. 4.3.



Ad cruditiem
pertinet
prima regula ne
est educenda
leues, nisi
autem soluta
constituerit.

Solutio est
calida.

Lenientem
vires.

Quando sit
dura humor
leues, a
quem soluta
valde de curis
no reddunt.

Solutio pro
le quatuor
calida leues
vires vim ha
bet.

imbecillis necessitudo sit. Sed quoties venter, aut hepar afficitur, tunc non nisi pauca humo-
rum purgatio effici debet, vt lib. 2. de magn. cacoeh. iam ostensum est: quia hæc duæ partes, cum illis
chylificatione, & sanguificatione celebranda, consignata à valida euacuatione valde lacerantur:
hinc non amplius concoctionem exactam ingredi possunt. Ea propter, cum pharmaca cathar-
tica, aluum soluentia, in duplici genere sint: quia vel efficacissimam horum humorum ex-
purgandi vim continent, vel matrem vim possident: cuius distinctionem Galenus meminit his ver-
bis, qui vera rem molliunt pharmaca, quæ modica prouocare possunt: quæ enim acriora sunt, tunc oportet.
Hinc priora, antea allata, vt acriora, ac ignea efficaciter, seu citius solutua à Medicis appel-
lantur, quæ succos peccantes, iam iam adequatos attrahunt à quacunque parte corporis parte,
tum secundat, tertiatque regionis cruditarum etiam à pedum vnguibz, ad ventriculi regionem,
ecce ad purgationis terminum: per quem hi humores educuntur. Quocirca isthæc duplici virtu-
te decorata sunt, vt ait Galenus, quarum alia quidem vis succorum attrahitoria familiaris, &
specifica habetur, alia verò valde acris, & mordax, quæ facultas expultrix irritat, ac excitatur
ad eos succos, circa ventericulum, & intestina iam attrahens per aluum deiciendos. Alia verò le-
nientia nuncupantur, quæ solum à primis venis, humoris iam tenuatos, fluxu lèquæ reddidos, tra-
hunt, ac sine euidenti acrimonia expultricem naturæ facultatem ad eos humores expellendos
prostant. Quæ tamen, vt ait Galenus plures succos educunt, quàm mordaces, quando scilicet
propter vasorum infirmitatem, propterque ostiorum tunicarum venarum laxitatem, ratione cu-
ius valæ, & oscula irritata propter purgantis mordacitatem contrahuntur, & clauduntur potius,
quàm permittant humores tum attrahi posse ab eo purgante aciori, tum ab expultrice expelli
posse. Eamque sanè ob causam plus lenientia in talibus expurgant, quàm solutua: non tamen à
longinquioribus partibus species carnosæ, solidarumque partium educunt: Ideoque tales ægeri à
cruditatibus tertie cruditarum regionis liberati non possunt, nisi diaphoreticis. Quocirca quò
magis laxæ partes fuerint, eo leuora purgancia, danda sunt: Primæ itaq; regionis crude parti-
tæ, iam ad euacuationem dispositæ, educit quidem lenientibus non aut solutua agèda est: nisi
solutua minima in quantitate præbueris: tunc enim solutua ne dum lenientia euadunt, vetum
etiam alterantia tantum, vt experimento constat. Aduerte autem Gal. asserere cautos humores
in salubritudine antequam in febrem, seu morbum incidant ægeri, cautè educendos esse: Vbi ve-
rò morbus iam factus sit, non esse educendos, immo penitus, ac optime præparandos, materia-
tamen nonurgere. Quia autem lenientia, pinguem purgantia sint, vnicuique arti medicæ,
operam danti, notissima sunt. Vnde hic frustra impendenda non veniunt.

A

5. De sim. med.
fac. c. 10. dicitur
1. aph. 2.

8
1. De simp. me.
loc. 2.

De curis per
lang. lib. 4. c. 10.

C A P V T X I V.

C

Pituitæ crudæ copiam creantis, ac ad primas venas mandantis ventriculi
languidi tum fouentia, seu media roborantia ante partium ventricu-
lo adiacentium tensione laborantium purgationem molienda,
tum penitus roborantia, post corporis totius purga-
tionem administranda, proponuntur.



Is autem hæcenus expeditis: Antequam primæ regionis cruditarum pituitosa-
tum vicus rationem adhibendam explanem: Roborantia quidem tum ventri-
culi, & capitis hæc cruditates transmutantis, tum mesenterici recipientis, præsta-
tuenda veniunt. Venterculus itaque hæc pituitæ crudæ copiam gignens, non
modo in fragilitate, ac humiditate interperatus esse valet. Verum etiam inter-
dum in fragilitate, siccitate autem, & crassa peccare potest, vt in sensibus ventri-

D

culi, & siccorum habentibus hæc pituitæ crudæ copiam emanare videmus: Cum ta-
men id vitæ fines tantum in raritas fiat de cuius ventriculi roboratione egit Gal. per balnea, &
lac. Proinde ventriculi frigidi, simplici humidiorationis rebus faciemus: quoniam hæc venti-
culi discrasia frequentius contingenda contingit. Quod equidem in explanandis ijs à Gal. consti-
tutis, executioni mandabo: Ant enim vt cibis assurgentibus, & subamari interitum in quoq; ho-
minem, & quicquid assurgere contingeret veluti alios rursus à refrigerantibus abstineri. (Ceterum
autem enim ratione vinum viti ex eorum genere, quæ facilius valde calidum exhibet, immo
nutritum, quod calidum non haberet, cum largo pipere in nouulis omne consilium euacua-
tionis ad sicandam daret: dabamque ijs tum cibos, qui natura essent sicci, ac probe assati, tum profusa
exiguam potionem iunxi, autem, & adstringentium omnium vim, quæ tum, qui illis circa
rationem

7. Meth. 2. c.

Ad ventriculi
fragilitatem, & hu-
miditatem
leues gignens
& ad primas ve-
nas potius eu-
dant modicam
imbecillitatem
expurgant di-
le assurgere,
& cibis autem
viti ex eorum
genere, quæ
facilius valde
calidum exhibet,
immo nutritum,
quod calidum
non haberet, cum
largo pipere in
nouulis omne
consilium euacua-
tionis ad sicandam
daret: dabamque
ijs tum cibos, qui
natura essent sicci,
ac probe assati,
tum profusa
exiguam potione-
m iunxi, autem,
& adstringentium
omnium vim, quæ
tum, qui illis circa
rationem

Rationem medentur, normæ: & aduertenda est, hæc victus ratio, in hoc casu seruanda. Potissimum autem abstinendum vmbiliferum, ratiôno valdè validius habetur, & pontico: pro ventericulo roborando, omnino eo ventriculo à quacunque cruditate immuni existente, vt ait Galenus: quod & conferuè modò, & in vino abinthite præberi potest: etsi non minùs etiam menta opem ferret. Verùm omnium præstantissima tum theriaca vetera, tum maridarum vetus reperitur pro nostro instituto moliendo. Pergit autem Galenus exarans, & quod ex mali cotonei confectus fuerit, vt diacyroneum ante positum, & d Galeno 6. de tuend. san. cap. vitæ de scriptum, alysiæ eiusmodi, vt confectioes stomachicæ, & alia præsidia, quæ ventericulo frigido, & humido conducere possunt, qua deservant medicamentis: inter quæ sanè aqua thermalis est, veluti hie Venetijs aqua thetuciana intus sumenda, in vsu reperitur: sicut enim eadè aquæ stillicidio, regioni ventericuli admoer, ceteris externis ventericulis roboratiuis, ex Galeni sententia, præcellit, ita etiam intus assumpta, idem putandum esse reor. At verò quid ad ea pertinet, qua extrinsecus applicantur, primò perfunditur ventericulum ex abstinio, & oleo crudo insissimè, ex oleo enim immaturo abstinio maior roboratio fit, quàm ex oleo maturo abstinij max hapsim nempe manipulum, vt lib. de præcogn. ad Posthumum cap. 1. r. expressit, lana scilicet purpurea, vt ibidem & 7. meth. cap. 7. pro adstringendo ex plananitum ex ussem ipsi, tum verò ex turgentis, medino, & mastichino, & nardino imponi. Ex oleis autem stillicidio autem admoerere solet egrogantium maximo emolumento, & hoc est. Recip. olei abstinij, mentæ, mastichini ana lib. 3. olei distillati ex ephrophylis vnc. 1. olei amigdal. dulcium, terecenti extracti vnc. 6. ad oleorum aliorum siccitatem corrigendam Misce ab his ceratum ex ussem compositum. Vt Recip. spicæ nardi, mastichis, tæamagæ, macis, cinamomi, piperis, zingiberis, nucis moscæ an. 3. i. ephatophyllum ferup. 2. ecet, rasine, ac thebereuthing talis q. s. M. & l. ceratum f. a. Post aliâ pharmaca ritque ceratis valentiora, quæ d medicis vocantur epibemata: Ea tum ex dulci turgentis, tum ex ipsi, quæ similem vim obtinent medicamentis componuntur, in quibus est aromatum quoque multitudo non parua spica nardi, & amomum, & calamus aromaticus, & iris, & ledanum, & malabathri folium, & styrax, & bdellium, & apobalsamum, & xylobalsamum, reliquisque aromatum catalogus. Multas idè antiquorum epibemata, seu malagmatum pulcherrimas, efficaciorèque compositiones ad ventericulum frigiditatem, ac humiditatem incemperatum roborandum posuit 8. de com. med. 5. loc. cap. 5. Verum denique ait. Quod si horum nihil profecerit, commune omnium remedium, quibus imbecillitas nocet, in sine adhibuissim, nempe rubrificatiorem, qua per thapsiam, vel sinapi, vel tale aliquid exciatur, quod medicamentum sinapissimum vocant medici. Deinde ad vsum aquarum calidarum ablegassim: Quippe ultra hæc Empiricus nihil nouit. Ad Tabias enim tum hi Medici, tum Galenus egros mittebant, vbi aquæ thermæ lunc calidæ, & siccæ suâ facultate, quarum stillicidio, & intus assumptione supra cetera sanabantur egri. Nobis autem Medicis hic Venetijs, egros Patavium opus non est, vt mandemus, vbi aqua adest aponitana, quæ, vt ait Fallopius, per embrocam administrata exsiccat, & calfaciendo, tuendo, roborandoque cerebrum, & ventericulum morbos frigidus, & humidus figat. Immo tantæ efficacitæ est aqua ipsa his quatuor virtutibus, quod facit quoque ad hydropem vniuersalem totius corporis, quam leucophlegmatiam vocant, nec non ad hydropem particularem, hoc est, solius ventris: ipsi præcipuè æger vitatur: huius aqua vaporibus, id est ipsi. Præterea etiam aquæ sancti Petri in agro Patavino habentur, quæ eisdem quatuor virtutibus aponitanæ concinent, quia moderatè calfaciunt, moderatè siccant, & leuiter roborant. Vnde quando tunc minus nimiam calfaciunt, & siccitatem aponitanæ aquæ confugimus ad has sancti Petri aquas: Vnde hie Diui Petri aquæ tantum Patavij administrandæ. Nam si Venetias transirentur, virtutem suam partim omitterent: Aponitana verò aqua vires, etiam Venetias asportata, optime retinet. Vnde nobis opus non est egros ad Patavium mittere. Si hie Venetijs aquæ aponitanæ, & stillicidio, ac flusa, & potu quoque egros nostros cutate voluerimus, vt pluries expertus sum. At verò perillustrem Mercatorem amicum inueni, qui stillicidium noluit. Quocirca fomentationibus ipsius aquæ aponitanæ, & vini nigri generosi abstinio, ac menta thalicti ventericuli regioni adhibitis, huius ventericulum roborari, prius tamen intus aqua thetuciana singulo mane vnius hebdomadæ epota. Ceterum ex hædenus allatis aliqua blandiora,

itaque ventericulum fouentia mediocriter roborando exhaustire possumus, vt eas intentiones, quæ proposuit fuerunt lib. 4. c. 5. adimplere possimus.

✱

Tonus Tertius.

I 3 CAPVT

Abstinio vmbiliferum egrotum.

Menta.

Turgentis & medino efficellina mentolium sunt.

Distillentis ana thapsiam.

Aqua thetuciana vnc. assump.

Extrinsecè admoerunt, & huius speciem stillicidio adhibita.

Oleum abstinio hie hapsi lanae grana molita.

Oleo stillicidio.

Ceratum.

Epibemata.

Syrax bdellii apobalsamum, & malabathri.

Vide multa à Gal. de com. med. 5. loc. cap. 5. c. 5. Sub similia ex pro-um efficacitæ.

Et aquæ thermæ stillicidium epotantur.

Aponitana aqua tantum à Fallopio explorata.

Capitis pituitæ crudæ fluxionem, deſtillationem cū de ad primas venas, tum-
gignentis, tum transmittentis ſouentia, & roborantia promulgantur.



pituitam verò eſt improprie vocatam etiam in cerebro intemperie laſo, vt à fluxionis deſtillationum fonte, ex Plac. & Gal. gigni poſſe, iam declaratum eſt. Pyz-
torea tam pituitam crudam, in cerebro exortam facillimè ad ventriculū de-
ſcendere poſſe, & ad primas quoque ſuere venas etiam offendi lib. 1. c. 9. in fine.
Vnde ait Gal. ſingatur igitur in ventriculū deſuere ex cerebro ſuperfluum quendā
humorem frigidum, atque in eius occaſione intemperiem quandam in ventriculo con-

traſſam iam eſſe, quā potius malam iam ſuam per totum coſpus modica nimia ſimili-
tatem ſpacia occupaffe: & abbi ait. Non pauca verò cathari, & correge (ideſt deſtillationes per gu-
tur, per nares) quæ offendi videntur, conuerſa certo tempore in ventriculi loca ſunt. Ergo in talibus
pius toto corpore prolixius purgato, ſubinde capite, naſi purgijs quoque purgato, cerebri
laſum roborare conari deuenimus. Primo itaque de cerebri frigidiſſitate, ac humiditate intempe-
ratius roborantibus præſidijs, deinde de cerebri nimis calido, & humido corrigendo remedia pro-
ponam. Si igitur primò cerebri emendandum ſit, ſupra omnia ſilicidum quidem eſt aquæ
apontana, capiti admodum, cum dixerit Fallopius. Stillas idum huius aquæ conduci primò ad
capitis intemperiem frigidam, & humidam. Similiter ad catharrum ex intemperie frigida, & humida
vel frigida tantum, vel humida tantum. Hinc omnes à talibus intemperamentis cerebri conſimiles
morbos fugat aqua. Apontana caſſicando, calfaciendo, emuendo roborandoque cerebrum, eiusque
membrana, & reliquis cerebri partes: Ad id ſi quòd quando medulla ſpinalis eſt refrigerata, & in-
motus priuatione, aut diminutione à cerebro occipite intemperato oborta, ſolent inſtillare a-
quam hanc ad principium medullæ, vel occipite, vel totum doſum, & eſt remedium. Cauteria verò,
ſeu quoque viſiones, cerebrum, caputque tum nimis frigidum, tum humidum calfaciendo, ſic-
cando, conſtringendo que valde roborant cuius præſidij primum Hippocratem inuenio memi-
niſſe, hoc modo. Dolores autem ex pituita ingruunt, ubi in capite moræ, & exacerbatæ fuerint, quod ſi
ſubinde dolor, & tenebriofa vertigo in capite incidat, hæc quidem admodum præſunt. Iuas etiam ſanguis
ex naribus, aut ex vena frontis detractus. At ſi diuturnus, & vehementer capitis morbus enadat, neque
capite purgato, ſollatur in eo caput perturbare, aut venas circumaduertere conemus. Hæc enim vnicui ſa-
nitatis ſpes reliqua eſt: nempe io hæc aduſionibus; quas autem, & quot viſiones capiti inſeſe poſ-
ſint molliende Aetius & Archigeni in apoplexie curatione connumerant, hoc modo. Ego verò
ne cruſtas quidem inducere dubitare, vel enim igne, vel etiam medicamento vnam in concauitate
occipitis, ubi ſpinalis medulla incipit, duas in vtroque ipſius latere, tres aut quatuor in vertice, vnam
in ipſius capitis medulla, tres in cervice: vlcibus enim copiam materia deriuant: iſtus integram ſa-
lutem non deſperauerim. Proinde Hipp. ait venas capitis circumaduertere conemus; quæ viſiones, vt
viſiones (vt dixi) calfaciendo exſiccando, ſimilique conſtringendo valde roborant, ac fluxiones
ſubinde: vlcera verò his viſionibus facta copiam pituitæ deorſum deſcendens deriuant ſuſſum-
traheodo; ubi cogimur nos interdum in capite copioſa materia redundante, vt in apoplexia, &
in paralitiſ his viſiones ioduere; Verum igne facius eſt, quàm cruſtam addidit, id ſacere,
eſt vt tuncque calfaciant, exſiccant, ſanguiniſque fluxionem ſilient: hinc etiam adſtringunt, &
roborant. Nam ignis vt ſenſibile etiam actuale excedens ſenſorium ſenſus corrumpit: Vnde igitur
dum agit, nihil attrahit, cum ſerè inſtanter opus ſouum efficiat: cauſtica verò cruſtam mouentia,
dolorem necis moriæ, nuriæ, æque thoris. Vnde ſi ea adhiberentur cauſtica, procul omni dubio, pars
iſta non roboraretur. Ergo ad minus duæ viſiones eſſici poſſunt, nempe in occipitis fouea, &
io futuræ coronali medullæ. Præterea etiam tubificantiæ, ſynapiſmata de ad roborandū caput,
ſicut etiam ventriculū optimæ ſunt: quæ tum ad roborandum, tum ad deriuandum attrahen-
do quoque admodum valent: Quocirca ad deriuandum etiam etiam capitis futuræ coronali
valde calidi iſthæc illius Matronæ Romanæ apoſuit Galeus, cum ibi vrgenter longè mære-
tiz in pulſiones tuentis motus fuerit, quàm cerebri inextincties, vt Capiaueus ad occit conera
Alexandrum Tralianum, qui Galeum carpit. Viterius cerata ſunt capitalia calida, & ſicca, ſi-
milique adſtringenti ſaculære, vt ceratum Montagnæ capitate, & pulueres calfacientes, &
exſiccantes intra capillos aſperſi, vt eſt puluis agariæ, iſteos, aſſari, calami aromatiſci, ſi nu græci,
betonice, ſitæ ad, ſalibz, roſiſſiſi rini, herbe paraliſi, liſiorum conualioerum, laudani, garoſilo-
rum, neuiſi moriæ, nuriæ, æque thoris. Porro cerebrum calſierit & ſiccat potefſi odoribus;
Vnde ponam manibz geſtandū, ac odorandū, ex his pulueribus compoſui valet, paro cere,
& gummi arabici addito. Inſuper cerebrum calſierit & ſiccat potefſi oleo amigdalorum amari,
chamæmilæ, anethi, cumi calſiore, & croco compoſito; in auris inieci. Et hæc ſunt quæ cere-
bro ita intemperato roborando valde conducunt. At vero ſi cerebrum caliditate, vt humiditate

intem-

Ad cerebri ſi-
gidi, & humidū
intemperie col-
legendum.
Aque apontana
ſilicidum

Viſiones & cau-
ſtica capiti in-
ſtillanda opor-
tuit.
Hæc viſiones ab
Hipp. iocentur.

Viſiones in ca-
pite quæ in a-
poplexia agen-
da ſunt ex Aetio
nempe dicitur de
ſitu.

Quæ viſiones in
capite igitur ſi-
nt.

Viſiones, &
cauſtica capiti
inſtillanda opor-
tuit ad cerebrū
roborandum.

Pulueres

De dec. Hipp.
& P. c. s.
Lib. 1. c. 8.
De comp. c. 4.
& com. 6. apha.
& com. 7. apha.
10.
7. Meth. c. 2.

7. Meth. c. 2.

Lib. de lib. 8.
quis & metulim
1. 3.

Lib. deſtillati-
bus pag. 317. ex
Fœlio.

C
Lib. 6. c. 1. in
ſitu.

D

Cap. de ſingulis
ſignis.

Antemperatum fit, ut falsæ distillationi sæpe contingit; tunc sanè stillicidium id futuræ coronati frigidandum admoveo. Recip. Aquæ R. V. vel Vitis, aut chaldariææ libras 3 o. aquæ laetæ, radices nenupharis, hederæ ana a libras quinq;ue, iquæ sempernivi, plantaginis, tofæmuri, betonicæ ana a libras duas. Misce. Cæterum vero eide coronati infundendum futuræ pro mæx Vitis phthifis imminente evitanda, eatearho falso ventura, composio; quod ei magnam contulit emolumentum. Cuius composio est; Recip. Pulveris tofæmuri, rubearum, rubearum, sandalorum, rubearum, alborum, cornucervi præparati, mirtilorum, eranj humani, radicum hederæ, radicum nymphææ, boli armeni, coralliorum rubearum alborum ana 3 s. ad penetrationem vero adde, Laudan. Agacici, mirchæ, thuris, amphiore; betonicæ ana 3 s. cerej, refinæ, ac cerebinthini q. f. M. & fæccatum f. a. Pomum autem per manus gestandum, & odorandum ad cereb. cum refrigerandum, & fîccandum optimum fiat ex laudani deæ. s. sandalorum eitiorini, tofæmuri, rubearum, rubearum, lambruse, zingelj, coriandrorum præparatum capium pauperis, hederæ, tadicum nymphææ, an 3 s. opij et bacij semper. s. gatiophilorum einamoni an feru. s. ambræ g. v. gummi arabici 3 s. cerej q. f. M. & Epomum f. a. Et ita cerebrum caliditate, & humiditate ineniperatum, & laxatum refrigerare, fîccare, & robotare poteris.

B C A P V T X V I .

Mesenterici, primæque cruditatum regionis roborativa remedia
proponuntur.

Cum autem facis non sit, partes vitiosos generantes succos, simulque transintē-
res corroborare partes, dum hē malis sit purgare sint humoribus; eo, quia
cetera membra, quę de nouo cōsumuntur, & fluxus recipiunt, ac tēpe-
re possunt succos, etiam corroborare deuinimur. Quocirca pēdidit, & vetriculū,
& cerebrum pituitam etiam gignens, acque deponens seu transmittens ad
primas mēscere venas, corroborantibus iam constitutis; Ideo decessi, vel
modo remedia mēscere laxum roborantia ponam, ne amplius impoſuerim eam fluxum
recipere valeat cruditate. Verum vitio ab hae re me expediam, inquam aquę appointis sim-
plicis primo fomentationibus, mox huius aquę alteratę eum corticibus radicū capparonū,
ac deinde etiam addito abſinthio fomentis, optimē inibecille, & laxum nos posse roborare mē-
scereum. Si autem his rebus alium addere volueris vinum, in fine tuto poteris, cum vinum
roboret. Cappares vero, & abſinthium valde mēscereum roborant, eum siſſe duo lientem, hep-
ar, & vetriculum roborare possint, & quoniam mēscereum inter lientem, & hepā, & vetricu-
lum refidet, & quia mēscereum de liene participat, & vetriculi chyliſicationem recipit, &
quodammodo perficit, vñ & hepatis sanguificationem incipit. Proinde de vetriculi & hepatis
uatura participat, ac ideo & capparis, & ab abſinthio mēscereum roboratur.

C A P V T X V I I.

Primæ cruditatū regionis pituitæ crudę copię rectè curandę, victus ratio
adhibenda Hippocratis, & Galeni sententia disquiritur.

Asterum vigis ratio, vt antea iam dixi, alimentis quidem attenuantibus, incidentibus, detergentibus; siccatantibus, atq. mixt. eal. facientibus, flatu-
que discentibus, simulq; chylicificationem celebrandam iuantibus, ex-
cutioni semper mandanda est. Nos quoq; assidue diuretica euacuando, & ea,
que manifestum calorem liquant: inducunt, & quæ in omnem corporis partē
he cruditates liquare ferunt. Ea vto mixt. acuta, nileq. ventrem infestio-
ni subducentia amplectendo, notumq; omnem cavendo seruandū. Enim,
bi sunt in omni quætu corpore, tum animi, somnū que moderatē longē relinquendi; in quib;
consociū hī, atq. ætē moderate calido, & sicco degere debent. Aq. purissimas erudicati-
bus copiosis primæ regionis laborantes. Perpetuo tamen eiborum quantitatē, & consistentiā
perspicua, vt natura iam aduenticia facta. Ergo nutritis hoc maxime oximeli, aliquando etiam pissa-
na, & melleo exiguo quopiam. Quoniam Accidit postquam nullam oximeli, pisanāq; cremorem,
vt quæ in primis vris, quæ scilicet circa iecur, & mēserē cū sunt colligi superuenia. Solent hoc com-
modi deiciantur. Nam pariter fluxilitas q. vident, que per sedem exortiri habent, mella, & cibis
hī, qui ventrem moliant, vt pisanæ cremor, & pharmacis, quæ modicē prouocare possint, vt oximeli,
apomeli, & mella hyssopo, iride, nepeta, origano, & teripolo composita. Quandoquidem in ali-
cuiusmodi ratione sunt pisanæ, & mella simplex in pharmacis vto oximeli, & quatuorq; inque

Slavici expectant
Hicem habebat
17 mense, 1. 27
ita obsequium
hunc per 24 vltra
solis cursum
indidem 2. ad
Glennam 1. 24.
cum sui inter
pauca inter
mura relictis pa
tibus, 24 di de
capum murae pae
mulpet, idem ip
dem amedijs
murae.

Ad ea sunt
peruenientia prius
transierunt
regia in illis
curandis viciis
suis esse con-
ducere con-
uenit debet.
Et in hoc ha-
bit in viciis
suis conuenit
conducere
conuenit.

A vires, quas vino Galenus tribuit: Quocirca viciu[m] ante hoc tempus non dandum, si etenim animi deliquitum imminens fuerit à mutatione pulsuum subita in paruos, imbecilles, & inaequales sapienterum præcognitum, tunc non vinum, sed opheliam vino madefactam dare expedit, si ventriculi, & iccoris phlegmone non fuerit, ut iam dudum dictum est. Hippoc. autem huius vini ab eo oligophori, nempe pauciferi appellati, cum memineris, arti medicæ ita prodidit. Cæterum vino albo tenui, paucifero, & inodori quodammodo nullis fortior est, quod ammodo imbecillior est, & Gal. in com. ai. manifestavit tum substantiam memorans ex hoc verbo tenui, non virtutis imbecillitatem, tum adiecit oligophoro, id est paucifero. Vocatur siquidem oligophorum sine pauciferum, quod ut bibatur minima eget aque missione: contrario autem modo polyphorum, vel mult: i. crassi appellatur, quod ut bene temperetur, multam exigit aquam, æquivalentes dixeris, quod aqua multum sustinere possit ad bene temperatam missionem. Quod verò pauciferum, & oligophorum appellatur id exolutum, imbecillumque, & ad potum inutile redditur, si multa dilueris aqua. At qui, quæ in vino hoc effearentis odoris, ea imbecillitatis, frigiditatisque efficacissima nota. Nulla verò hoc vino fortior est, ut eis cruditates tenuare, detergere, atque per alium subducere possit: Vinum verò hoc nulla fortior in eas cruditates coquendas, adiuuandamque naturam ad concoctionem molientiam. Quandoquidem vinum fulvum, aut album concoctioni suo spiritu, & calore conducit: præterea sanguini deputando à ferulo rocremento prodest per vinum enim ferum sanguis expurgat. Tertio verò nos vinum boc iuvat, membra omnia calfaciendū, roborandūque. Hinc sensus compositi. Non tamen etia vinam ciete valet, ut sanguinem calfaciat, nec liquefaciat: tale namque vinum dominandum esset. At verò vina nigra reliqua, quorum crassa, quæquidem ad stringendū longo tempore, in ventre manent, & fluctuationes in eo excitant ob terream scæcem, ijs vinis nigris committit. Cæterum perpendo plius in cœna, quàm in prandio multos nutrire agros nos debere: nisi cerebrum humiditate, & crassitie in temperatū fuerit, cum Gal. dixerit. At quoniam non solum quies, & somnus, sed etiam longius tempus huius naturalæ administrationis expedit, rationabile est, ut valentiores ciborum hoc maxime tempore offerantur. Si quidem in somno concessio sit, in vigilijs verò digestio, cum itaque post cœnam somnus longus sit, in eo coctio sit: post prandium, vero digestio.

An redimidi
crassitiam si-
bi in coctio-
ne sit in dante
cultura? non
egregia? non
remota? non
debet? non
debet? non
debet? non

Vini oligopho-
rum. Gal. meth. 6.
ut aqua sola
ut appello stru-
tum, quod omne
est, & puri de hoc
vino oligopho-
rum loquor.

Multa fortior è
vino ad eis cru-
ditates temperan-
das detragenda,
ut per statim
diffusa edocua
diti.

Vini emoluit-
tis. Obiectum op-
ponitur.

Vini nigra in-
congrua ad eis
coquendum con-
ducunt.

Actu. Jan. in
cœna, quoniam
prandio stendi
venit.

C A P V T X V I I I.

C De cruditate pituitosarum secundæ regionis curatione, rectè agenda, per sanguinis missionemque molienda, Galeni doctrina, experientis confirmata.



Rinæ cruditas regionis curatione, rectè administranda, iam peracta. Nunc ergo secundæ cruditatum regionis curationem constituendam ingrediat: & primò cruditatem pituitosarum, mox acrim, seu mordacit curationem et planare nitat. Cum autem fontis pharmaceutico semper chirurgicus fons qui- dam præstendus sit: Quandoquidem dabo, quod in secundæ cruditatum regione æquaturum plethoriam, tum cacochylia peccant, ut simul ambe subesse possint Hippocratis Galeni Pauli, & Auicennæ sententia: semper prius sanguinis eductio molienda venit, ut lib. 1. de magn. sanguin. c. 32. iam quoque dixi. Auxilium enim quod prius vena secta habetur, ita depromit. Auctor ille lib. Gal. alcripto de renu in affectuum dignatione, & medicatione c. 4. Quoniam si per sanguinis missionem corpus prius vacuatum fuerit purgans medicamentum exhibitum venas, & arterias, & inanes corporis partes, & regiones inuent non opletas: quo fit, ut absque ulla impedimento in totum corpus diuane ad attrahendum succos, facillimeque fiat eorum evacuatio per vasorum spatia, & fusionem, tenuitatemque succorum crassitudinem, simulque viscositatem in maiorem massæ sanguineæ vacuando. Damnum verò, quod sit, si ante sanguinis educationem aliqua purgatio teneatur, promulgando, si æque tum sanguis, tum succi mali peccet, inquit. Nam si massa sanguine copleta sit, & purgatorem dederis non poteris plenitudinem in corpus differri, unde fit, ut subiecit. & nihil efficit, aut si quis quam faciat, malè faciat. Hinc Galen. in venoso vasorum genere apparere subesse illi copiam semicrudorum succorum, & illius spatiora illi quodammodo sit sanguis. Maxime cogit ut dictum est, de crasse primò de sanguine oportet: Deinde succum illum educere, qui superare videtur per copiam namque semicrudorum succorum, ibi copiam pituitosorum humorum intelligit, ante sanguinis generationem generorum. Quoniam alij prorsus ad exalatum sanguinem nutrimentum peruenit, veluti semicotti sunt, alij prorsus incocti crudi alij paulo absque à sanguinis forma, quos tres differentias iam declarauimus lib. 1. cap. 3. Nam in prima differentia, quæ paulo à sanguinis forma recedit ad differendum sanguinis est: in secundâ verò ibi semicotti, semique crudi sunt, tunc sanè considerandi agendum, in certâ verò, cum prorsus incocti, crudi que sint, tunc equidem nullas curatio mendum est sanguis. Postea verò has cruditates primæ secundæ, ac tertie differentie quantitate sanguini probò, ait nos semper comparari debere.

Quoniam si sit
dignitas quæ
vult plethoriam
in cacochylia
fuerit æquib
lites motu na
grauitatis im
sanguinis quæ
cacochylia om-
nino non solu-
tione, vel
paulo quæda
rit pias vena
secunda potest
viam purgandi.
Emoluitur ex
hoc articulo
ut administrato.

Idcirco que sit
sententia, quæ
prias purgandi
sententia.

De viciu
in a. 1. 30.

De viciu
in a. 1. 30.

De viciu
in a. 1. 30.

De viciu
in a. 1. 30.

De viciu
in a. 1. 30.

De viciu
in a. 1. 30.
Lib. de coacti.
Actu medice c.
19. & 2. epide.
4. item. 6. de 4.
de viciu. in a. 1.
Lib. 1. c. 10.
Lib. 1. de coacti.
1. 30.
Lib. 1. de Galen. in
a. 1. 30.

De viciu
in a. 1. 30.
Lib. de coacti.
Actu medice c.
19. & 2. epide.
4. item. 6. de 4.
de viciu. in a. 1.
Lib. 1. c. 10.
Lib. 1. de coacti.
1. 30.
Lib. 1. de Galen. in
a. 1. 30.

De viciu
in a. 1. 30.
Lib. de coacti.
Actu medice c.
19. & 2. epide.
4. item. 6. de 4.
de viciu. in a. 1.
Lib. 1. c. 10.
Lib. 1. de coacti.
1. 30.
Lib. 1. de Galen. in
a. 1. 30.

De viciu
in a. 1. 30.

A

CAPVT XX.

Cruditatum secundæ regionis tum pituitosarum, tumque acrium mordacium interna tum præparantia, tum flatus discutientia, chylicationemque infirmam à languido ventriculo factam, iuuantia præsidia statuuntur.

Cap. 7. & 8. 4. De vicinis, in 10. & 11. & 12. de 11. 21. Meth. 6. 1. & 2. Meth. 4. & 11. de curandi ratione per farg. 101. & 11. & 12. 11.



Non istius verò secundæ cruditatum regionis pituita cruda præparanda, ipsidem præparantibus primæ regionis pituitæ crudæ adequatis remedijs, antea allatis intertus tum Hipp. tum Galenus utebantur: Quandoquidem ijs in locis horum autorum patet, eos Autores pituitam crudam tum in prima, tum in secundâ cruditatum regione constituisse, pro cuius adæquatione, & oximeli, & aquâ nullam hyssopo, origano, iridè compositam, & alia narrata quoque remedia.

Interus præparantia cruditatum pituitosarum secundæ regionis.

Quæ nam sint hæc præparantia. Digerunt in melle & calidissimum detonicum, fœnentum.

B Vide 6. 11. 11. 11.

4. De ven. 11. 11. 11.

21. Meth. 6. 1. 11.

præbuisse, ijs modis, regulis, conditionibusque explanatis. Vnde hic ea repetere non conuenit. Vtenti idem de pipere, zingibere, diaspulico, & diatriapipece, quam hyPOCHONDRIORUM, ærogenium, ac infistorum flatus discutientia sunt, simulque caloris naturalis, tum pituitam crudâ, tum chylicationem languidè coquentis auiliatiua habentur, potandum esse reor. Vnde Gal. ait. *Sanissimus ijs, quibus in primis venis maximè crudus succi congesta copia est simplex diatrion pipereum medicamento vit: Ergo si non modò in his, sed etiam in omnibus venis sit, superque in ipsa carne in principio curationis ipso diatriopipereò vitendum.* Acutum verò, seu mordacium succorum secundæ cruditatum regionis præparatiua, ne dum generica, ac verò quoque specifica esse tenentur, pro vili amare præparanda calidæ, vltæ, & crassæ magis, & minus præparantia frigida, tenuantiaque & detergentia proportionata conducere possunt: Atque prout atræ bili acida, & melancholicæ adequatæ præsidia magis, & minus calida, tenuantia, detergentiaque congrua sunt. Præterea, etiam semper perspectio, vt alterantia ipsa sua propria vi illam partem cruditatibus reſertam respiciant, vt ex his Galeni verbis est elicere. *Nam quale medicamentum roborans, simulque præparans iecinori est absinthium, tale est lieni capparitis cortex: Quale rursus iecinori quod vocant eupatorium nos autem agrimonium appellamus hic Venetijs tale est lieni scolopendrium nemine Alphonium, seu cotach: vt præparans si quidem simili genere medicamenta ambo viscera possint.* Sic vtiq; cæteræ partes similia medicamenta exoptant, vt capor betonicam, oculus Eufragiam, & ita cæteræ partes flagiant. Cæterum tanto valentiora lenis, quanto crassiora vtiur alimentis. Particu lariter autem hic omnia isthæc præsidia connumerare mihi non licet, cum ipsidem remedijs scriptorum Autorum liberi pleoi sint: & quoniam meum in hoc opere tantum est, hercle mirabilem Hippocratis, & Galeni de cruditatibus rectè curandis, respectu regionum potissimum, doctrinam, certam penitusque infallibilem tradere, ideo superuacanea relinquam.

CAPVT XXI.

Secundæ regionis cruditatum tam pituitosarum quam mordacium extrinseca, tum detergentia, tum vias relaxantia, simulque calidi innati languidè coquentis iuuatiua præsidia commemorantur.

D Cap. 9. & 10. & 11.



Mnia verò, quæ antea de viarum, & humorum crudorum externis tum detergentibus, tum relaxantibus, tum denique calidi innati imbecillis; languidè coquentis, iuuatiuis perſidijs iam demonstrata fuerunt in prima cruditatum regione, optima quoque ad secundam cruditatum regionem esse introspiciuntur: Ne in hoc opere toto vitæ meæ decursu moram faciam: Vnde ad ea tria capita confugiendum est circa has intentiones, executioni mandandas, nempe ad 9. & 10. & 11.

C A P V T X X I L

Cruditatum tam pituitosarum, quàm mordacium iam preparatarum secundæ regionis purgatio, molienda statuitur.



Humoribus autem iam ab arte preparatis, à naturaque concoctis pharmaco-
vique specifica qualitate succis educendis Proportionem respondentem alui-
na purgatione exsuperandi sunt vel confestim, vel paulatim, aut pancis vi-
cibus, seu pluribus euacuatur, perpetuo non humorum superuacantium,
educendorum quantitate vacanda. Verum tantum virium robore copiam
succorum detrahendam permittente per penso Hippocratis decreto. Sinus
etenim venarum aluina purgatione potissimum à cruditatibus liberatur:
quauis etiam eadem ventris inferioris subductione cruditates tertie crudicaturæ regionis qua-
damtepus vacuatur, vt iam dixi lib.4.c.14.&c. vt clarius videbis in hoc lib.6.c.35. cum Hippoc-
dixerit. *Pars verò cruditarum ex earum per medicamenta, & potiones diffunditur.* Verum, vt iam
lib.3. ostensum est, excrementa venosi generis tum per vrinam, tum per sudores euacuari possi-
billet. Eamque sanè ob causam expurgato venarum sinu aluina expurgatione, quoad nostrum
posset, si aliquod excrementorum residuum superisset, quod natura, aut per vrinam, aut per sudo-
rem rejicere vergat, tunc optimè etiam seu diureticis, iut diaphoreticis id expellet, ac naturam
inclinantem excretionem mouere.

Excoementa se-
cunda regimini
viri quod per
aliam primo
edenda, etiā
per urinam &
fadois vacuan-
te.

$$x - \Delta p_h + y - \Delta c = 0.$$

E
1. De machina
p. 18.

C A P V T XXIII.

Iecinoris nimis calidi, ac ignei succos acres, mordaces, vitiatosque gi-
gnentis refrigeratiua roboratiuaque praefidia tam interna,
quàm externa tanguntur.

[illegible]

Lxurgato autem toto venarum sinu, tunc vtique ne amplius illi vicioſi humores mordaces iterum ab hepate calidiori proceſſerunt, remedijs aq̃ue tum interius aſſumpſimus, tum hepatis regioni exterius admoſis, Iecur ipſum refrigerare, ſimulque roborare cogimur. Intro itaque præbendo primo à leuiori præſidio exordi- ci ſolito, quod præterquam hepatis tunc refrigerare, tum adſtringendo roborare valet, Iecur quoque ab obſtructionibus libetum facere poterit: quarum titium ſa- luter, Iecur quoque ab obſtructionibus libetum facere poterit: quarum titium ſa- luter, Iecur quoque ab obſtructionibus libetum facere poterit: quarum titium ſa- luter,

cultatum cichorei lucus vtique de purgatis, & endiuia, Jēris græcè appellata, eſt. Quorum Gale- num meminiſſe inuenio, his verbis. Cichorei itaque, & ſeris. Facultas horum oleum ſubfrigidū eſt, & ſubamarā, ac moderate adſtringens, & propter has qualitates optima pharmacā calidis intem- peraturis iſtius hepatis exiliſſima. Ultra hoc enim quod moderate refrigerant, amplius, & robur uſuſſeri addunt per adſtriſſiorum facultatem. Inſuperque commiſſuras eſeſcorum venarum in ſua parte vi- ſceris ad eas, quæ in gibba ſunt exteſſe, & vtilius autem non ſolum ſuccus ipſorum eſt, tum recens, tum exſiccatus, ſed & olea exſiccata, iſſuſque, ac triſta, potui inſerſa, & eorum decoctum in porri acce- pitum auxiliatur; vt enim ſubamarā deterget: vt verò ſubacera ſecundo adſtringunt, ac adſtrin- gendo roborant, ſua verò facultate ſubfrigidā ſunt. Idem quoque frigidis intemperies magnopere ſedunt, quemadmodum, quæ frigidā ac humiditatem abſque adſtriſſione, aut amaritudine poſſident, fa- cere ſolent. Aliqui verò ſucci cichorei aquam ſtillicitacem propinæ. Vtentiſſis ſerum caprum optimum eſt, non autem ad libit. capotum, immo ad lib. 3. accipitum, præterquam macris corporis datum, ſi venter ſiſſi robur talem ipſius ferre quancitatem ſerre poterit. Sin ſerum lactis Af- ſinini haberi poſſit, ſatiſ adhuc etiam erit. At verò his remedijs non ſufficiētiſſis tempore adſti- pteſſe, & ægrique conditionibus requirētibz exiſtētibz ad aquæ frigidæ thermalis po- ſitionem decurēdum, ſeu aquæ B. Virginis parauimus potioſiſſe, ſue aquæ vullenſis in Lucifæ agro inueniatur, aut aquæ calderianæ, in agro Veronenſi reſidentis, potio ſit. Nam & facultate refrigera- riā, alijsque virtutibus ſeorſum hæc aquæ diſcrunt, vt ait Fallopius: Vnde itarum aquam, quæ hercū ægrotanti magis coarctetur, præbere poteris omnibus conditionibus, ad harum quoque aquarum aſſumptionem requiſitis, à Fallopioque rememoratiſſis, perſeſſe ſis. Cæterum ſi ne dum hepatis verò totum corpus caliditate intemperatum ſit, tunc etiam aquæ dulcis balnea coſtrui ſima erunt, maxime ſi emaciatur corpus fuerit, & lactis & habitioſe, vt Gal. ait. Exterius verò pro hepate iſſo calidiori refrigerando, ſimilique roborando hoc vnguento vocat. ſucci cichorei, & hepaticæ denſati, ſucci funi denſati, lactis cæ denſati vnguenti ſandalini an. vnc. 5. ſucci ſemper viui denſati, ſucci abſinthij denſati an. drac. & caphoræ, drac. 1. acceti vnc. 1. 5. M. f. vngue-
ntum.

Refrigerant
valve & carbon
the best place in
the building.

Chloroform can be
polished and has
efficiency.

8. Do not med.
9. Just a B.

D

Aqua Th. Virgi-
nae, aut velleit,
feu calderiana
nata.

Fullerton,
Cap. 13.
Cap. 17.
Cap. 14.

Buena notte dal
città
Ecco l'ultima
esposizione.
Verganti pro
brano rifugge-
ando.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd

A tum. Ex ijs autem succis recentibus vnguento sandalino, camphora, & aceto eadem proportio-
ne, epichema componi potest, huic nostro instituto deferuiens. Sin validus extrinsecum reme-
dium ad manum haberi optaueris, maiorem succi hepaticæ, lactucæ, & semperuiui portionem
addere poteris: perpetuò tamen hoc ponderato, ne vt pote nimia refrigeratione hepatis suo calo-
re, natura infuso, petuetur.

Epichema ad
idcm.

CAPVT XXIV.

Secundæ regionis cruditarum tam pituitosarum, quàm mordacium, rectè
curandarum victus ratio molienda explanatur.



Ia utem pro secundæ cruditarum regionis pituita cruda, & copiosa curanda vi-
ctus rationem exoptaueris, eandem quidem capere denincens, quæ pro primæ
quoque cruditarum regionis pituitosis succis crudis, & copiosis rectè curandis
antea Galeni sententia iam constituta fuit. At verò si pituitosorum non summe
crudorum, immo semiscrudorum tantum, simulque acrim eodem tempore co-
positorum victus rationem quæliueris eandem sanè accipere debebis, quam Ga-
lenus quoque ad compositionem semicrudorum succorum in venoso viscosum genere redundan-
tium, & mordacium in reliquo corpore toto copiosorum redundantium rectè curandam constituit.
Quæ vtique talis est. Sicuti autem in primo die, ita etiam in secundo fortitionem, & minimam & sim-
plicem illis exhibebimus: quippe largè his apponere quibus auferri potius aliquid debeat, planè est con-
trarium. Sicuti rursus omnino non nutrire, & fastidia stomachi creat, & tandem ladit, & vires labefes-
cat, & malum succum adauget: cum ab inedia sanguis bilis fecat. Ergo exiguum his dandum, ac potis-
simum, si fieri potest, pituita cremor simpliciter conditus: sin aliter farris eodem, quo pituita, modo præ-
paratus, cum paulo aceti adiecto: præsertim si crudis abundantiæ vel in venis, vel in toto corporis
habitu subesse suspicamur. Quippe si nihil prorsus aceti sit alicui admixtū glutinosior erit, quam vt pro-
positis conducatur: itaque obstruet magis, quàm detergebit habitus, me atque. Quod maxime petiuit in
crassis, & glutinosius succis, cuiusmodi pituitosi sunt. Ac boni succi far quidem ipsam esse, & propterea
eiusmodi, quæ a victoribus si lentior eius corrigatur adiectis aceto, & porri modico non solum obstruet, sed
etiam nutriet plenus quàm propositis sit ex usu. Hac itaque de causa pituita cremor in hoc casu tutior

Ad faciem ter-
rudum pitui-
tis exordium
feruor quædam
tum regionis vi-
ctus ratio, & ad
modum sanè
exoptatur.

Acrimia fecit
nam dicitur ut
Oura agitata
Seditionem.

Medicamenta
elementaria que
vt alimur à
Galeno p. 480.
bucunt.

Alimentum est
lingua à Gal.
affigunt.

Diuturna ali-
menta nisi tunc
pena de secun-
da regionis
exoptatur
vt per alia de.

Ad pituita cru-
da, secunda re-
gionis alimen-
ta ab Hip. sum-
ta.

In visceribus en-
duntur Hippo-
crates primo de
hælia rebus
victoria
pituita melle
mixta, & vino
albo aquoso vi-
bunt.

C est, vt qui tum modice nutriti, tum nusquam per angustos meatus hæreat; Sed & per meos ipse, & meatus
per totum detergat, & quicquid in semicollis, crudis succis continetur crassius id disiect, ac resol-
uat. His autem fortitionibus explanatis, quas in principio vniuersali exhibere debemus. Subin-
de alia cum alterantia, quæ sepe etiam vt alimenta incidentia, tenuantia, alnumq; mirè subduc-
ta sunt administranda peculiariiter vbi pulvis paruus tardus, ac rarus fuerit, vt ex Galeni ipsius
sententia etiam antea diximus cap. 7. tum alia flatum discutienda; tumq; calidi innati languide,
coquentis iuuatua connumerat, inquiriens. Horum ipsorum gratia, & multa his idonea est, & oximi-
li, & apomeli, & pipere, & zingiberi: postremo omnia, quæ citra vitiosi succi generationem humorem cras-
sum disiectant, soluentque. Postea verò in catalogum omnia alimenta, nostro instituto præserti in-
feruentia, redigit, artem medicam his verbis illustrando. Frugum namq; maxime apta est pituita, &
oleum sola lactuca, piscium, qui saxatiles dicuntur, panis, qui & furno coctus, & fermentatus, & modice
parus est. Aues monticula, inter quas Gal. 7. meth. 6. perdices connumerat, potio oximeli, mulla,
vinum tenue, & album, tamen oximeli, & mulla, post pituita cremoris acceptionem nunquam
potanda sunt, vt antea iam extendi ex Hip. 3. de vict. rat. in mor. ac. r. 22. immo antea, & semel, quæ
boni sunt succi, eundemq; detergent, nec glutinosa sunt, nec crassum succum efficiunt, nec valenter nutriunt.
Postmodum verò diuturna, & quæcunque alia, quæ in secunda regione resident, in tertiam, &
quaretam cruditarum regionem ferre possunt, damnat, inquiriens. Quæ verò vrinam cient, hoc casu
non proba. Quæ nam talia sint, quæ euitanda iam ex hætenus antea demonstratis patent Cappa-
res autem in nostro casu ex oximelite, oleo, & passulis condici, optimi sunt: potissimumq; lieni
indurato ita plurimum conducunt. Quemadmodum ad hepatorborandum, & succos in ipsius
visis infarctis purgandos piscilia vitissima inueniuntur: licet autem obstruções maxime icteris
liberes tamen etiam thoracis, pulmonisq; obstruções piscium admittit. Verum in Hip. inuenio
in hydropse, hæc haberi. Pituita succum melle affuso coctum sorbeat, & pro obsonio galli carnes assas
ha beat, catulinis etiam coctis utatur. Piscæ verò galas ac torpedine affatis: quos pisces etiam febri-
citantibus præbebat. Vltimus in hœnosis ait. Ex piscibus verò scorpion, draconem, cuculum gobium
crassissimumq; rogi, collos, & frigidus exhibe. Verum aduerte Hipp. decem primis diebus in vni-
uersis cruditis, fortitionibus vti pituita succi melle mixti & vino albo aquoso in hy-
dropse. Vbi verò dies decem præterierint, eos puros assumat, & pro obsonio galli carnes assas, & cre-
tamen hoc nostro æuo ita ægri curadi non sunt cum natura debilioti sint, quam Hippocratis tem-
pore erant.

CAPVT XXV.

Tertiz cruditatum regionis mordacium, seu non mordacium excrementorum copiz binam vacationem esse aluinam scilicet, & cutaneam. Primoque eos succos ad aluinam purgationem agendam preparari debere, demonstratur.

Tertiz & quartiz regionis cruditatum.
Tertiz regio cu
terio excremento
se aluina ac dia
phoretica.
Succo in carne
lactis, pulmo
nis expectoran
tibus educitur.



Tertiz autem vna, & quartiz humani corporis cruditatum regionis curationem ingredi enitit: Verum quoniam tertiz regionis excrementa cruda, & copiosa æque tum aluina, tum diaphoretica euacuatione educi possunt, ut antea quoque id exploratum habui: cum Hipp. asseuerarit de latere tumescit, ac induratum in plenitudine, Pars vero ex carne per medicamenta, & portiones diffunditur, & per calidiora extrinsecus adnota, ad eos morbus per totum spargatur. Subinde verò de pulmonis inflammatione, in quo bilis, aut pituita copia inest, iane conferi potiones bibere, ex quibus pulmo humectatur, & expuit. Nisi enim expuat, & durior pulmo euadit, simulque arefcit, & hominem perimit. Hic enim Auctor statuit eas cruditates in carne cum lateris, tum pulmonis medicamentis expectorantibus per sputamenta quodantenus vacuari posse: partiumque diaphoretica, & cutanea insensibilique euacuatione dissari posse. Cæterum sienti de thorace, & pulmone, quibus purgatio per sputamenta, commoda, familiarique per viam proximam peragenda est: licet de toto corpore, ac de reliquis cunctis corporis partibus intelligendum esse liquet, tametsi de aluina expurgatione tantum expressi, cum per eam patte ni quæcunque nostri corporis pars æqualiter euacuari possit à medicamentis solutius æqualiter attrahentibus: hinc aluina purgatio equalis est omnibus partibus, cæteræ autem vacationes inæquales sunt: sicuti etiam sanguinis mischio inæqualis vacuatio reperitur, ut lib. 3. de magn. morb. sang. iam Galeni sententia ostendi. Cæterum hanc tertiam regionem deiectionis expurgari possit: pharmacis Galenum inuenio, clare id asseuerantem, ita, *Vbi phlegmone premittur deiectionis id medicamentis tum detergens, tum lacerans, quo dimittat, relaxetque superflua.* Quod autem rationi, & experimento simul cruditates, in carne alicuius particele residentes, à solutiuo pharmaco extrahi posse consentaneum sit, experimento quotidiano tumores cuti inifros, à tali medicamento dimitti patet. Quandoquidem ratio est, quod solutiuum pharmacum suauitate attrahente in toto venarum sinu, etiam angustissimo iam diffusa, non modo à venis angustissimis, simulque à porositatibus harum venarum angustissimarum cruditates ad alui regionem attrahere possit. Verum etiam eas cruditates spatis, meatibusque, ijs extremis venulis angustissimis, propinquis inherescentes, primo ad eas extremas, & angustas venulas attrahendo; dein de ad alui regionem quoque attrahere valeat, ac denique facultatem ex pultriciem sua actiuium, & mordacitate itatando, ut causa insinimentalis dispositiua, ut hæ cruditates, quæ in carne feratæ erant, per aluium expellantur. De secunda verò, ac diaphoretica insensibiliter facta euacuatione eo in loco alloquendo, ut vidisti, ait, & per calidiora extrinsecus adnota. Gal. quoque in hoc nostro calu inquit, *Vbi verò in extremis venis, & corporis habiuit residet, crudis sunt ei copia, & concoquendum pariter, & per halitum resoluendum.* Primò itaque extinsecis preparantibus, ea cruda tertiz cruditatum regionis ad aluinam, seu ad aliam ipsi crudis succis educendis accommodatam euacuationem molendam disponere deuinemur, prius tam enim expurgata omninò tum prima, tum secunda cruditatum regione, tam à plethoria, quam à cacochymia: postea ea excrementa iam disposita internis pharmacis educere; cum dixerit Galen. *vbi totum corpus expurgare oporteat ad curationem affectuum alicuius partis particularis agendam, ait, vena sectione vitare, & purgatione, & chyliferibus, & inedia, ubi totum corpus anparnerit, aut multitudine humorum referatur, aut corundem malitia vitatum: in oppositum autem si neutrum horum adstet, statim ad curationem per loca remedia peruenimus.* Sed rarissimè contingit in corpore non peccare, nec plethoriam, nec cacochymiam, immo frequentius vtrumque redundat. Postmodum verò tum præparare, tum educere cutanea, per halitum, seu per distillationem insensibilem, euacuatione, cætera, cruda tertiz, & quartiz regionis tollenda sunt. Denique partem, quæ cruditatibus copiosis alligata laborauerit, ac denique cruda accipiat, adstringendo, corroborare tememus.

Lib. 1. c. 14. &
in hoc lib. c. 43.
B
L. 1. c. 1. de morb.
413.

Met. med. c.
13.

Lib. 1. de morb.
413.
De iuen. san.
c. 3.

D
De rebus, med.
1. c. 3.

Tertiz regio in
parte interius
alui purgatio
ne conueniens
in parte car
nari per cum
diaphoretica
cutanea.
In phlegmone
id verificatur &
alioquin euacu
tio.
Experimento id
conprobatur.

Ratione etiam
idem confirmat
ur.

De alia etiam dia
phoretica vacua
tione ad purga
tionem.
Succi per alui
educendi & eu
acuatione exter
na præcedit
preparari debet
in tertiz con
coquendo & eu
acuatione inter
na præcedit
alui purgatio
per loca remedia
peruenimus.

A

C A P V T XXVI.

Tertiæ cruditatum regionis crudorum succorum tum mordacium, tum pituitosarum externa præparantia ad aluinam purgationem molendam eadem esse, quæ antea cap. 9. & 10. & 11. iam statuta fuerunt.



Vin autem antea scriptis capitibus eundæ exterius admouenda, æquè tum detergentia, aut totius corporis expurgationem apponenda, tum viæ densæ, obstructæ, simulque referat & emolliantia, vna, & relaxantia, tumque denique calidi membris infestis languida, infirmisq; coquentis, calidiora, auxiliantia, cruditateque maturantia iam vberimè Galeni auctoritatibus, rationibus, experimentis, ac exemplis explorata habuerim: hic utique superfluum esset eadem repetere, aut alia ijs similia, ita perfectæ addere. Vnde ad ea, quæ lib. 4. c. 11. 12. & 13. nec non c. 9. 10. & 11. libri ipsius consurgendum est.

C A P V T XXVII.

Tertiæ cruditatum regionis cruda copiosa per aluum euacuari possunt, ne dum solutius pharmacis ore, aut aluo interius assumptis: Verum etiam cataplasmatibus, & vnguentis exterius admouendis, quæ hic etiam statuuntur.



Vmocius iam dispositis, ut quadantenus, tum solutio aliquo validiori pharmaco epoto, aut deuorato, aut ensemate acriori, valentiorique per ventrem inferioriorem impositio hi succi vitiosi edaci possint, illico euacuandi sunt. Quandoquidem, ut ait Gal. Proinde ubi phlegmone, duro, seu tenso tumore premitur deiectionis ad æthereum medicamentum tum detergemus, tum lacessimus, quo dimittat, relaxetque superuacua: duplex sanè est ratio cuiusmodi medicamentorum usus. Cum partes superiores possint, laborent per ea, quæ eduntur, ac bibuntur expurgentur, cum inferiores per id, quod sit per clysterem infusum. Quandoquidem, quæ eduntur, ac bibuntur, coram vis, antequam ad inferiores partes perueniant, resoluitur, ea omnino ad ætherum usque ascendere non possunt, immo etiam si admodum nitaris, fortasse tenuè tantum intestinum contingant. Per vim enim tum vim attractoriam, tum irritantem solutorum Galenus intelligit: Vnde medicamenta purgantia, ore assumpta, quia circa ventriculum morantur, ubi etiam eorum facultas conseruatur: hoc æqualiter à quacunque parte attrahant succos vitiosos, non tamen succi æqualiter cedunt vi attractorie, cum magis cedant illi, qui prope medicamenta purgantia sunt: Ideoque partes superiores renibus plius solutius ore acceptis expurgantur, quam enematibus; quoniam à societate cum vicinis partibus, quod idem cum situ est, illi capiuntur euacuatio fit, ut etiam Hipp. primò inuenit, ubi ait. Morbi autem, per eam partem, cui maxime vicini esse solent, educendi. Sicuti membra, renibus inferiora clysteribus validioribus plius expurgantur, quam alio modo altior: Ideò Gal. pergendo ait. Ergo illud quoque ex partium positura didicimus nempe inferioribus intestinorum aliquid esse per clysterem infundendum superioribus verò, atque etiam ipsi ventriculo lieni, & stomacho superne aliquid exhibendum. Ideoque iecinotis causa per inferiorem ventrem, & lien præfettim euacuatur, in liene enim alteram viam non esse liquet, quæ expurgari possit. Præterea melentereon, & ventriculus & cæcaputque medicamento superne assumpto purgatur. Ad tenes itaq; expurgandos non minùs valent clysteres valente virtute, quam solutiva pharmaca ore capra valent. At verò Aetius exteroa pharmaca ponit purgantia, quæ sua mordacitate non solum in partem, cui adiuuentur intero permeare valent, sed etiam expultricem vim protrahendo, eam purgare possunt: Vnde & per ventriculo, & melentereo, ventremq; inferiori hepate, liene, utero, ac denique hemoroidibus expurgandis isthæc præsidia Aetius composuit, quæ hic non sunt frustra rememoranda, cum in Autore ipso eorum compositiones haberi possint.

Partes superiores per phlegma & solutius ore assumpta faciliè purgantur: inferiores per clysterem & cæcaput. Ratio. Obiecti op-
portunitas.

Solutio enim sit admodum ab Aetio enati
statuta.

*

A ra ficca, & dura solutius modis inter maturaciones reponitur, maturacione scilicet omne ad mediocrem temperamentum humidum, & molle ad dissolutionem significante, ut in maturefcentibus fructibus confpicitur. De alio vero habet, Alterum solutius modum narravit corporis raritatem a medicis consilio effellam, & simili vero acate raro, cum labefactis viribus, extenuato corporis habitu, & male nutrita ficca, duratque cute, laxiores meatus euasit. Hinc cutis moderate rara iam facta, moderate quoque humida, molliorque cutis euasit. Alium vero modum (Vidit Trincavello interprete) Galenus explanando, inquit. Et alium ambiguit dictionem, sine per solutionem eam intelligere oporteat: sit autem hic modus ex ipsius corporis subtilitate diffinitione, que omnibus non modo animatis communis est: Verum & rebus inanimatis. His vero tribus modis statuit, omnem crediturum collectionem in aliquo membro conflatam, seu tensionem, seu tensionem durum coneoqui, ac per halitum dissolui statuit, inquit. Ita sanè, & quidam à natura alieni tumores paulatim, longiori tempore dilabente materia, dissoluntur. At vero primus modus non quidem euacuationis modus est; immo tantum excrementorum ad eorum euacuationem molientium preparandi modus est, per modum concoctionis tenuationem, fluxilitatemque excrementorum efficiens: Nec etiam secundus euacuationis modus repetitur, quippe solum meatum, viarumque, per quas ea excrementa, quæ crassa, & substantia aquea, simulque terreæ repetiebantur esse, mox autem illius concoctionis ope, in substantiam aeream vaporabilem iam conuersa ea excrementa facillimè euacuari per halitum possunt. Quocirca duntaxat tertius euacuationis habetur: alij autem duo procul omni dubio preparationum: Cum in quacunque recta euacuatione illi duo modi preparationis requirantur: nec sine illis duobus preparationibus simul iunctis vita excretio rectè administrari valet: Unde &

matæ educende, & vitæ semper pro euacuatione, probe agenda, optima preparatio petitur. Oleum itaque pro digerendo humore, tum pro rarefaciendis meatibus, laxando, & molliendo, & feminibus abietis tuditur confusus, & oleo maceratis spacio dierum ad minimum duotum mensium ad solem expositum Galenus statuit, dum ait. Nos vero saps, & tres, & quatuor etiam multis plures menses macerari permittimus (sic deinde semen abietinis) humidum vero luteo percolamus: oleum vero maturissimum esse debet, cuiusmodi in Italia Sabinum est: oleum autem amigdalorum dulcium optimum esset, nisi rancidisset: ergo oleum tenuius, ac maturius commune accipiendum est: cuius olei accipe lib. 3. resina, abiectione vero vnc. 3. tasinè pineæ vnc. 4. terebenthinæ vnc. 4. coques vero inquit Galenus commodius hæc in vase duplici à balneo Mariæ, aut certè igni lento. Id enim quoque Medicamentum apertissimum, est ad omnem lassitudinem, seu spontè ori am, seu alia quavis ratione contrallam, cui cetæ parum addere poteris, ut in vnguenti formam redigatur. Cæterum ut ait Galenus, & sioribus populi nigra loco seminum abietis oleum conficiunt: Nonnulli autem dum macerari tum flores populi nigra tum semina abietis non ferentes, partim ea in oleo cogunt partim aquam, iungere vtiq. qui cautiore sunt, quo videlicet nec torrentur, quæ sunt in resina, nec oleum tensionem, odore referat: Porro sufficit tantillum aque admisceri, quantum coquendo totum euasceret: is modus erit, si quadruplum, aut quintuplum sit. Verum oleum te vera non ex bulitione, sed in maceratione, confici debet. Aliud vero oleum quoque enstituit. Hæc alba radix, cucurbita agrestis, & althea, & vitis alba efficaciter enaporant, ubi suam ipsæ quiditatem, quæ in oleo aliquo maturo, cui rasi nam, tum abietina, tum pineam, ac terebenthinam adijcere conuenit, cui parum cetæ si addideris vnguentum conficies, quo totius corporis omnes partes artuum lassitudine etiam laborantes: & hypochondria tensione affecta inungi possunt. Verum hypochondrijs requiruntur adhuc validiora tum relaxantia, seu mollientia iam lib. 4. cap. 19. & maturantia quoque lib. 4. c. 13. statuta, quæ & vesica semiplena, seu vtre, & fomentationibus, & vnctionibus, aut omèto fuillo, aut hircino, aut lana pecuina sordida, nigra præsertim admoueri possunt, & stillicidijs modo apponi valent: laxat autem opopanax & sagapenum styrax, Ammoniacum, bdellium, chabbanumque: ut lib. 4. c. 11. & 13. iam ostensum est: Verum inter ea sanè, quæ materiam tenuate, viasque densas tumorem rarefacere queunt, nullum vtiq. efficacius præsidium est ipsi magnis, & sicis cucurbitulis, maxima ignis flammâ applicatis. Ultra quod vehementissimè foras materiam extrahunt citra inuisionem calorem, ut ait Gal. Ait enim. Quæ enim humida aut calfaciunt: pharmaca prætere hæc, quæ omnes iam præcè vocare chalcitica id est relaxantia solent, &c. In talibus sanè nec cucurbitule vtilis est inuision: id etiam in strumatum ad violentiam attractum à medicis exogitatum, de quo præsidio iam fusi lib. 4. c. 13. dixi. Cæterum scias primum concoctionis modum, qui reuera est materię crude concoctionis, ut ait Hip. per calidioria extrinsecus admoda fieri: Cui sententia assensit Gal. his verbis. Peruntamen humorum, cui impatiorem curatio profus foci calidorum medicamentorum perficitur, calida autem, simulque humida, ac mollientia esse debent medicamenta, huic modo primo concoctionis deficiente, necessario esse tenentur. Atamen his etiam calida, & sicca commiscenda, quæ sanè causa sine euacuatione per euaporationem halituosam cum enim tumor, aut fructus durus molis sit, à calore, & humiditate concoquitur tunc exhalatio aliqua siccitatis calidæ auxilio molita requiritur, alioquin molis non heret: Ideo in maturantibus non solum calida, & humida, sed etiam aliqua calida, & sicca lib. 4. capite 13.

B

4. De nat. fan.
4. 8.

C

Idem.

D

11. Meth. c. 6.
4. Meth. c. 9.

3. De morbis p.
4. 18.
6. Epidem. lib.
1. 2.

E

Oleum maturi
maturata sunt
requiritur ha
bitus candidi
dus.

Oleum aliud
maturans.

Vnguentum.

Mod. qm pars
crassissima ef
fecta, ratiom
bus foranda sic
Constat fice
perstantissi
ma id est ex
tractio, & eu
acuatio.
Relaxantia ge
nè chalcitica di
cuntur quæ cal
da, & humida
sunt.

Maturantib. per
calida, & hu
mida semper
maturantia per
accidentia com
menda sunt, quæ
exhibent ac e
uacuant.

Ibidem.

Cicco. 64. 7.

31. De sim. me.
Sicut 2.
Ibidem 2. ad Gl.
p. 6. c. 4.

Ibidem.

Ibidem atque
A. de medic. lib. 2.
p.

Abus vlcetosis, aut extensivis contingit; Cuius autem aquæ balneum id confici debeat, mox nos docet, ut infra videbis. At quoniam post frictions eas, & post balneum patientes nostri nutriendi debent: Idcirco illico, quos cibos assumere habeant, ponit, aicens. *Præterea alimentis, quæ & boni succi sunt, & minime glutinosa eorum materia supra iam dicta est. nempe cap. 4. lib. 4. de tuend. sanie. ubi præsanam ad Italia Landam, & pisces saxatiles, & axes monticula apti cibi sunt, & qui assentant, de quibus scripsimus uno libro. De attenuante vici. rat. conscripto.* Ceterum quia Gal. cap. 7. libro 4. de tuend. san. *De vlcetoso afflu, cui cruditas in extremo corporis habitu sui consimilis: A. de parando medicamento. Diacalamintes agere intendit, ut in illius capite inferipto est videre. Quod utique etu medicamentum in iuro assumptum, diaphoreticum omnes hostes concoctionis modos narratos producendi viui continet. ibi conscribere incipiendo, inquit. Nec est, quod vaceris, ne calorem vehementer accendas. Quinimo medicamen quod diacalamintem vocant, audacter dabis. Quandoquidem nunc cum in prima, & secunda cruditate regione crudorum copia non sit: ideo medicamentum id dandum timere non oportet. Si namque Galenus ad elephantiasim curandam ex atra bile in carne, & cute residente obortam, primo misso sanguine, & atræ bile detracta, vlcis in olla eugullaris in modum præparatis, ut diaphoretico remedio datus evaporato per entem afflu plures homines sanatos penitus infpexerit, quod medicamentum venescum videtur: ergo longè tutius, audaciusque diacalamintem præbere valeamus, tanquam præsidium cæterorum medicaminum, optimum, efficacissimumque intero assumptum diaphoreticum: Cui utique ne dum vim continet crassas cruditates, glutinosas, ac lentas, tum in carnosa specie, tum in partibus solidis, coaceruat, vehementerque infixas, tennandi, incidendi, fluxileque reddendi, simulque porositates, & meatus rarefaciendi: Verum etiam easdem cruditates, iam tenuatas, incilas, fluxileque factas, dissolvere, ac per evaporationem hâimofam vacuare valet: cum Galenus alluaverit. Peritum ad ea, quæ nunc agimus omnia, quæ mihi cognita sunt optimum medicamentum est il diacalamintem: Nam crassa, leniaque attenuat, & per halitum educat, & urinam movet, & mulieribus menstruis. Cuius compositionem ita conscribit. *Est verò compositio eius huiusmodi. Accipe calaminthes, & pulgē, & petroselinū, & sesoleos, cuiusque vntias duas: seminis apij eacuminum thymi vntiasque vntias quatuor. Ad hæc libyitici vntias 16. piperis verò octo, & quadraginta. Ceterum ut medicamentum id à ventriculo usque ad cutim elabi valeat, ait. Hæc omnia simul trundenda, cribrandaque sunt tenui cribro, ut in tenuissimam, omninoque in petrepebilen redigatur pulverem, nempe sine vlla asperitate. Quippe eiusmodi medicamenta, ita in tenuissimum reddita nimirum diuretica mentes cuncta, simulque diaphoretica penitus permeando in totum corporis habitum maxime digeruntur: Veluti diverso crassiora ventre harent. Hinc iussit diaspoleticum, diatrion pipercon, piper, ac zingiber rudissimè contundenda esse, cum ita crassiora, quæ in ventre harent ipsam venerem inferiorem itritando solvunt, & ut quæ angustia venarum oscula, ut venarum nœfæticarum oscula sunt subire nequeant. Quomobrem etiam medicamentum, quod diaspolepticum vocant, crassius facere sileo, quoties devere alium per id siudeo. Quod ex mpto declarabit experimento desumpto. Quidam verò id non intelligens, quoniam tenuissimum, minutissimumque iussit pollonis fecisset, ut alio deicienda nihil contulis, sed urina non solum plene movet. Ac huius quidem præcepti in omnium medicamentorum compositione inemisse expedit. Præpositum verò in presenti medicamentum omnia prorsus subtilia postulat, quæ facile in omnem corpus partem digerantur, feranturque. Per digeruntur autem in modum, quo diacalamintem tenuet, sudoremque moveat exsiliando, nos docet: Quandoquidem sicut diaspolepticum rebus rudè contritis confectum ventri inhærescens, inibit: cum digeratur à calore naturali actuatur ad secundum actum, qui operandi habetur. Vnde ex quo natura facilius eo medicamento expultrix irritatur, ad excretionem aluiam mitè molendam. Ita quidem diacalamintem ingre-**

Bidentibus diaphoreticum phlogistatum ad hunc interopacum calidum adhibendum adhibet & Galenitum Compositum in ore dicitur in thymis & nigra non exant diaphoreticum.

Hæc, & cetera, quibus alio die posuimus scribere.

Diacalamintem diaphoreticum phlogistatum ad hunc interopacum calidum adhibendum adhibet & Galenitum Compositum in ore dicitur in thymis & nigra non exant diaphoreticum.

Diacalamintem diaphoreticum phlogistatum ad hunc interopacum calidum adhibendum adhibet & Galenitum Compositum in ore dicitur in thymis & nigra non exant diaphoreticum.

Diacalamintem diaphoreticum phlogistatum ad hunc interopacum calidum adhibendum adhibet & Galenitum Compositum in ore dicitur in thymis & nigra non exant diaphoreticum.

Corporis habitum maxime digeruntur: Veluti diverso crassiora ventre harent. Hinc iussit diaspolepticum, diatrion pipercon, piper, ac zingiber rudissimè contundenda esse, cum ita crassiora, quæ in ventre harent ipsam venerem inferiorem itritando solvunt, & ut quæ angustia venarum oscula, ut venarum nœfæticarum oscula sunt subire nequeant. Quomobrem etiam medicamentum, quod diaspolepticum vocant, crassius facere sileo, quoties devere alium per id siudeo. Quod ex mpto declarabit experimento desumpto. Quidam verò id non intelligens, quoniam tenuissimum, minutissimumque iussit pollonis fecisset, ut alio deicienda nihil contulis, sed urina non solum plene movet. Ac huius quidem præcepti in omnium medicamentorum compositione inemisse expedit. Præpositum verò in presenti medicamentum omnia prorsus subtilia postulat, quæ facile in omnem corpus partem digerantur, feranturque. Per digeruntur autem in modum, quo diacalamintem tenuet, sudoremque moveat exsiliando, nos docet: Quandoquidem sicut diaspolepticum rebus rudè contritis confectum ventri inhærescens, inibit: cum digeratur à calore naturali actuatur ad secundum actum, qui operandi habetur. Vnde ex quo natura facilius eo medicamento expultrix irritatur, ad excretionem aluiam mitè molendam. Ita quidem diacalamintem ingre-

Didentibus diaphoreticum phlogistatum ad hunc interopacum calidum adhibendum adhibet & Galenitum Compositum in ore dicitur in thymis & nigra non exant diaphoreticum.

perspirationem eos iam in evaporabilem materiam convertit educunt humores.

*

Ada, & sicca vi sunt. At verò, quæso mihi libeat hic calaminthæ vires tam diaphoreticas, tum, epispalticas à Galeno in modum allatas rememorare. Nam calamintha essentia est tenuis, & calida, siccaque temperie ex tertio quodam modo ordine utraque qualitate. Horum manifestæ sunt indicia partim quædam apparentia, partimque experientia cognita. Genuisti quidem scripsit, & palam calida est, ac palam omnino amaritudinis obnoxia. Perclitantes autem, & corporis admonitionibus exarscentes imposita primum quidem valde exarscent, & mordicat, eumque, cuiusque postremo etiam vlcus efficit. In corpus autem intro assumpta, tum ipsa per sese sicca, tum etiam cum meliorato persificus calfacit. & sudores ciet: omneque corpus tum digerit, tum exsiccat. Ea ratione duelli quidam ipsam contra corporis concussionesque, rigoresque per circuitum repetentes adhibuerunt, fors quidem oleo incocta toti corpori iungentes, cum frictione non seguis intro assumentes, sicuti est dictum. Qui modum capite precedenti vidisti. Cæterum modus, quo diacalamintha vi valemus duplex est: vel enim electuarij forma, ut alterante medicamento, simulque succos, narratos, peccantes educens. Aut certè, ut condimento, salis loco cibum alterante, ut Galenus falsus est, ira deprimens. Misceendum verò his ita præparatis, in tenuissimum poluerem, nempe redactus, est inelapsissimum, cuiusæ diffusum, licet, & siue admixto melle siccum medicamentum reponere, eoque salis vice ad obnoxia præparari sit licet, & in præsura veluti acetum miscere, vel in eiusmodi aliquid propiperare. Verum, quo ad ordinem exhibendi, hoc medicamentum, ut ait Galenus, ubi succi crudi copiosi in ipsa carae sint in principio curationis ipso diatrion pipere seu diaspolicum utendum, sed cum admixtum petroselinum tantum sit, quantum auzi, & rhyms, & zingiberis habeat: ut prius si quid horum succorum fuerit, quod per alium expurgari possit, educatur. Post primum verò diem, magisque etiam post secundum misceendum eisdem est aliquid diacalaminthes: mox verò partes æque tum diaspolicæ, tum diacalaminthes misceuda: Procedente deinde tempore ipsius diacalaminthes plus addendum: ad extremum verò etiam solum diacalaminthes exhibebitur maxime, ubi in primis non modo sed etiam in omnibus venis quoque aliquid crudorum subelle suspicarietur. At verò pro diaphoretico solo diacalamintha, ubi dare volueris, ei aliquid liquidum propinandum miscere oportet, vel melicratum, ut ait Galenus, aut vinum aquæ mixtum, quo Hippocrates, ad rigores, horroresque adiuuendos utebatur. Verum in calidioribus corporibus in aqua, vel ex herbis cichoracis, vel ex sero caprino stillatio diacalamintham præbere poteris. Quæ verò ad quantitatem Galenus nihil dixit: Verum supposuit diacalaminthæ quantitatē dandam, æqualem esse debere quantitati diaspolicæ, ab ipso statuta, assumenda. Tempus autem, quo id præbere tenemur, ut medicamentum diaphoreticum à Galeno præscribitur. Porro eius usus erit post maturam frictionem, antequam excretionem, & balneum. Hic autem rememorandum est id, quod capite præcedenti, de frictionibus duplicibus, & balneo modicè calido administrandis ex Galeno diximus. Ratio enim cur prius frictionibus uti cogamur mane, cum à somno patiens exspertigat: deinde oleo laxante totum corpus vngendum: postea diacalaminthes dandum: subinde vero dum quiescere modicèque deinde inambulare: mox plures frictiones iterare: denique cur balneo modicè calido lauare deinceps, est sanè: quoniam pro tertiz, & quartæ cruditates excrementis superuacuis crassis, ac tenacibus tollendis, nulla quidem primæ, seu secundæ regionis cruditas lubellæ debet: immo vix omnes à venterculo ad rectum, quartamque vique cruditatum regionem adeo aperte esse tenentur, ut diaphoreticum ore assumptum, à venterculo ad cutinē vique liberè petransire valeat, inibi quæ morando digeratur, digesto autem, ac aduata sua potestate, eius opus integrè efficiat. Hinc cetera præcedente diei elapsi exigua, potioque ea in cetera vinum solum tenue esse debet. Hæc frictiones concoquentes tertiz, & quartæ regionis cruditates, præparantesque eas ad educationem agendam, simulque viarum præparatus rarefaciendo summo mane admulstrandæ veniunt. Dein diacalaminthem fuisse, diuque quiescere conuenit, ut natura duntaxat ad medicamentum adiuuandum, ad medicamentique operationem iuuandam intentia sit. Quod sanè postea auxilio modicæ deambulationis, simulque frictionis relaxatis, ac aperientis post frictiones statim, antequam diacalaminthæ acceptio: adiunget beneficio facilius executioni mandari potest. Cæterum eo, quia cruditates illæ crassæ, glutinosæ, ac leuæ, copia peccantes, carnis maribus, cauemillis, sparsius angustissimis inhaerentes, non nisi difficillime per eorum educi valeat: hinc eodem tempore, quo diacalaminthes duabus horis assumpto pharmaco illo elapsis per halitum eas cruditates educere incipit, eodemque tempore denuo eas vias angustas, densasque aperire, & rarefacere par est: necnon easdem cruditates iterum tenere, in vaporesque halinosos reddere, æquum est: ut postea frictionibus multis ne dum laxantibus, & coquentibus, verum etiam euacuantibus, eas cruditates iam in vapores exhalabiles conuersas educere possimus: At verò eo quod in optimâ maturatione suæ his etiam maturiscentibus communi, humidum molliem gignens calido annexum esse debet, ne corpus etiam equalidum nimium carne tennatur, contumptumque euadat, ne fortassis quoque igneo temperamento vitæ humanæ destructio, calor tum membris infusus, tum sanguini accretiarum, venarumque infusus vna cum corpore toto labefaceretur: omnibus ergo his de causis, statim post frictiones, balneo modicè calido, ne dum omnes eas frictionum vires statutas obtineant: Verum etiam cruditates molles reddente, simulque totum

Calamintha si
est admodum
tenuis epispal-
tica & intro
sumitur vna
diapolicum
halitum

Modus diacal-
aminthes dandæ
duplex.

Ordo diacal-
aminthes adhi-
bendæ.

Modus diacal-
aminthes dandæ
et utriusque
vehiculo præ-
paratus.

Quantitas dia-
calaminthes exhi-
bendæ
Tempus dia-
calaminthes præ-
parandæ
Non estis post
maturam su-
mendum.
Et post ortum
corporis laxan-
tem venterculo
& ante excreta-
tionem semper
diu fricetur, &
inter balneum.

Infuso medicæ
otido.

De simplici
cal.

De mensura
c. 7.

De mensura
c. 8.

De simplici
cal. de calamin-
tha.

De mensura
c. 7.

C

D

Balnea aquarum
calidiorum & sic
cantium vi con-
suetudinis.

Balneum cum
diaphoretico
tunc epistaxis
vix ita Hippo-
crati, in maiori
regio.
Tempus dictum
minime in pri-
mo, & post pro-
benda.

Post cibum non
quoniam dictum
diaphoretica nec
diacalamina.

Diaphoretica
interiora à facie
pila secretis.

Inter Cardum
& Scilicetum
concordia de
diaphoretico
vi radicem in-
cipiunt.

Inter diaphore-
tica interiora
fuerunt ac
utilissima & su-
periora choli-
cismus cum sal-
phuris est.

totum corpus humefcane, vna & nimium calorem commoderante uti quidem debemus. Quan-
doquidem etsi plus ducant balnea calfacientia, & exsiccantia aquæ marinæ salis, seu nitrosæ
thermalis, aut sulfureæ; atamen cum non humefcunt, nec etiam calorem immutuant in
hoc nostro proposito, sicuti in biliosis humoribus educendis, nec etiam conveniunt, sicuti bal-
nea aquæ dulcis actu modicè calidæ: ideo balnea calfacientia, & exsiccantia damnanda. Hip-
pocrates autem expurgato toto corpore in morbo regio inquit, balneis purgato, & cucumeris
agrestis radicem contusam, & in aquam concoctam balneo parato. Si ergo maiorem crudorum
evacuationem efficere volueris, hoc balneum conficere poteris. Præterea Hippocrates 5. epid.
Ægro-9. ait leptosum. Hic nullis remedijs sanari potuit. In melum autem ad balnea calida profe-
sus prurigne, & cutis crassitudine liberatus est, hydropse tamen perijt. Sed tempus quo in pran-
dio, ac cæna diacalamintham exhibere liceat statuit Galenus, exarans. Non modò autem sicem
ipsum medicamentum salis ritu in vario est usu, sed etiam cum est admixtum, si quidem id quoque
potest, cum aliquo cibo mixtum sumi. Verum hic adverte. Post cibum tamen nunquam nec
hoc medicamentum, nec aliud vllum, quod ad distributionem vehementiorem facit, sumendum
est, talemque medicamentum, chylum priusquam in ventriculo probè concoctum sit, in
hepar quidem, venalique secundas interferret: Non enim distribui tunc, sed concoqui qua sum-
pta cibo sunt est utilis. Quippe quòd, ut diu chylus in ventriculo coquendus moratur exhi-
beri diatriopiperon simplex; quoniam etiam ipsum piper; quod si qua fortasse maior necessitas inci-
derit ad silio coquentis, simulque chylum in ventriculo tementis in principio cibi dandum
est, ut ait Galenus etiam quod ex succo mali cytonæ conficitur, à Galeno descriptum sexto de
tuenda sanitate capite 15. & in hoc libro capite 12. recensitum, post cibum etiam sumendum
pro stomacho roborando. Sed ultra diacalaminthem omnia fere interna diaphoretica ex plu-
ribus antioribus eruditissimis, & nunquam satis villo encomio pro dignitate, & honore lauda-
tus Hercules Saxonia, qui vixit in 15. Præceptoribus finit, hunc in modum colligit. Ad dia-
phoretica venisiam, sunt hac medicamenta duplicia. Quædam enim valent siccatione, quædam
autem exsiccantur alexipharmaca: quæ siccatione valent sunt sulphur, oleum sulphuris, oleum
ex chalantho, trochisco viperini, decoctum, vel infusio viperarum, decoctum cardui benedicti scor-
dei, quercus, & similium. Quædam autem venisiam venenis omnibus, quæ-
dam verò huius luis propria. Communia quidem sunt Theriaca, Mitridatica, aqua iberiacales,
quæ à Rondoletio, & Fernelio oppiata dicuntur. Decoctum iuniperi, Buxi, Ebeni. Propria verò
sunt china salsa, lignum sanctum guaiacum. At verò iuniperi decoctum non ex radicibus qui-
dem fieri debet, cum radices veneficæ ex Dioscoride sint, sed ex folijs, seminibusque: etsi Scaliger
contra Cardanum asserueret, radicem iuniperis cortices veneficas vtiq; haudquaquam
esse, sed veneficam eam partem radicis medullarem esse. Verum enim verò reliquorum om-
nium sanè præstantissima, simulque tutissima diaphoretica, ad regionum propositarum
cruditates extirpandas, citra vllum calorem manifestum, citraque vllum acredinem, ac mor-
daciæ caloricam, spiritum potius acidum tantum, tum chalcaneum, tum sulphuris
esse inuenio; quoniam spagiritici ethymica sua præparatione, ab eo spiritu oleum igneum,
acre, & mordax omnino extrahunt, tam Quercetani, Libanij, & Crotij autoritate, & exem-
plis, quam ratione: Cum acidi sint, nec non experientis plurimis, à me exploratis,
ut etiam libro hoc capite 8. iam dictum est. Cætera verò diaphoretica, ore su-
peranda, ignea hercle sunt, calida, & mordacia, aciaque, & non vndi-
que tuta. At verò illi spiritus acidi, aceti hinc minerales vocati,
si vi diaphoretica exhibeantur, vique ad g. 30. sunt
præbenda, ut efficaciter agant. Enacueantia
autem emplastra, epistaxis, &
diaphoretica ad tumo-
res duros adimen-
dos

tum guttatis, tum faciei, aurium, mammarum, cætera-
rumque corporis nostri partium ex Andro-
macho, ex Asclepiade, & De-
mocrate, & à Ga-
leno

libro sexto de compos. medic. per gener.
capite 13. 14. 15. 16.
& 17. inue-
nies,
✽

A
Ad Glauco-9.

De locis homi-
nis.

De remedijs.
27.

B

Lih. de luei
venæ ca 1.

Exercitationes
140-149.

C

D

CAPUT XXXII.

Tumoris duri, ac scirrhosi, ventriculi, Mesenterici, Hepatis, lienis, & vteri curatio instituitur.



C Alterum quoniam satis non est vniuersi corporis tertie, & quartæ crudætatæ regionis curationem, rectè administrandam scire etiam cuiuscunque membri potissimum viscerum, quæ abdomini insunt, eandem curationem recubissimè molliendam vndique cognoscere deueniunt. Quandoquidem ibi plures, varique partes subsunt, quæ sibi quatenus spongiosiores interspicuntur, carne sua propria molli, & vacua, spariosæque simul, & meatibus, ca nenu-

lindè raræ, facillimè in se cruditates crassas viscidas, ac lentas, simulque frigidas, præsertim pituitosas, & melancholicas recipere possunt ex quibus resoluta parte serosa, tumores duri, ac scirrhosi confici solent. Eandem sanè ob causam sapè nostris agris ventriculum, seu mesentericon, vel iecur, aut lien, vel mulieri vterum hoc tumore duro, ac scirrhoso læsum esse inuenimus. Quibus utique tumorebus nisi egregia talis tumoris curatione constituatur, faciliè certè patientes illi perire solent. Hac itaque ratione impulsus ipsius tumoris partium exactam curationem cunctis remedijs muniatam consignare tentabo. Quocirca supposita, tam totius corporis, quam membri particularis integræ euacuatione penitus, penitusque interioris iam admissitæ, eos tres quidem concoctionis modos ita ordine seorsum semper assequi tenemur sicuti huc vsque declarauimus. Primo namque humidis, & modicè calidis relaxantibus, tensionem adimere cogimur: porositatē, & spacia carnis partit labefactare rarefaciendo, simulque eodem tempore calidius primariò, & humidis secundariò mollientibus duritiem vni, & succos crudos concoquentibus eos humores in vapores halitusque conuertendo. Ex postea tertio sciri tum vix, cum humores illi, ad diaphoreticam, simulque epispasticam euacuationem preparata sunt; itaque quoque vapores illi, per halitum aquæ tum digerendi, seu discutiendi, tumque vni cum reliquis humoribus concoquendis, sursum attrahendis, extrahendi sunt; hinc etiam educendi veniunt. Semper autem perperis, ut nos his tam viarum, quam cruditatum præparatiua longè magis, quam diaphoreticis, & epispasticis euacuatis studere debeamus, tam vti curatio facilius reddatur, tumque ne durities ea lapidescat, rarefaciendo, simulque eodem tempore calidius primariò, & humidis secundariò mollientibus duritiem vni, & succos crudos concoquentibus eos humores in vapores halitusque conuertendo. Ex postea tertio sciri tum vix, cum humores illi, ad diaphoreticam, simulque epispasticam euacuationem preparata sunt; itaque quoque vapores illi, per halitum aquæ tum digerendi, seu discutiendi, tumque vni cum reliquis humoribus concoquendis, sursum attrahendis, extrahendi sunt; hinc etiam educendi veniunt.

C Alterum quoniam satis non est vniuersi corporis tertie, & quartæ crudætatæ regionis curationem, rectè administrandam scire etiam cuiuscunque membri potissimum viscerum, quæ abdomini insunt, eandem curationem recubissimè molliendam vndique cognoscere deueniunt. Quandoquidem ibi plures, varique partes subsunt, quæ sibi quatenus spongiosiores interspicuntur, carne sua propria molli, & vacua, spariosæque simul, & meatibus, ca nenu-

Ad Gliscia & cap. 1. & 14. meth. c. 5. a. De morbo vteri. p. 712.

Idem p. 711.

Idem p. 711.

Ad Gliscia & cap. 1. & 14. meth. c. 5. a. De morbo vteri. p. 712.

D Alterum quoniam satis non est vniuersi corporis tertie, & quartæ crudætatæ regionis curationem, rectè administrandam scire etiam cuiuscunque membri potissimum viscerum, quæ abdomini insunt, eandem curationem recubissimè molliendam vndique cognoscere deueniunt. Quandoquidem ibi plures, varique partes subsunt, quæ sibi quatenus spongiosiores interspicuntur, carne sua propria molli, & vacua, spariosæque simul, & meatibus, ca nenu-

Idem p. 711.

Ad Gliscia & cap. 1. & 14. meth. c. 5. a. De morbo vteri. p. 712.

Ad tumorem du-
ros, emolliendos
vix quædā ratio
rationis requi-
ritur.

Ne tumores illi
in curatione ab-
sentibus la-
pidem causam
dant.

Reita cunctis
modis, cunctis
se, ut inquit, di-
scutiunt.

Tripla magis
molliendū pri-
mo delectum
quam siccatum
causare.

Ad vterum va-
rietas tumo-
ris curatio.

Pro scirrho vti
pocissimum
& discutiendū
vix non autem
aque dissolutum.

Ad fibrili cruditate venenosa diaphorica & epistatica pharmaca.

Emetur bubulū diaphoreticū remediū modica mēti sub stipulamentum sicut Gal. Gal. sicut Medio Myle Helleponti seu sui medicamentū iugulentur tibi.

Mollentia gra-
e mollitia ve-
nere, sicut venenosa
et vel tunc vel
dentis sunt.
Vnde quoniam
venenosa cruditas
dicitur in eis
affectionibus di-
versis specie re-
media parantur.
Dicitur parantur
si venenosa, ac
ligantibus libe-
ratis parantur
diaphoreticis
& epistaticis
remedia compe-
rant.

Et enim statim
fibrili affectu.
Acerum aceti-
sum pro de-
fic potissimum,
de quo magna sa-
piens comen-
tatur.
Cetera pro sa-
pia.
Suffumigat seu
fumentum.
Acerum aceti-
sum ad fibrili
equilens quo
modo aliquan-
do ad mēti
fuerit.
Temper quo ac-
eto tunc in ve-
nena.

Acerum quo fi-
citur adhibe-
bunt nec di-
phoreticū, nec
epistaticū,
et cum per
calidum sed
pro se venen-
osum de co-
cundo venen-
osum.
Dicitur pro
suffumigat, vel
fumentum ad pa-
tem venenosa
enim de pro
fibrili.

At verò scirrhis tumores tum laxandis, tum quidem coquendis, adeps tum leoninus, totus taurinus aptissimus est, cum calidiores sint; leoninus tamen taurino quoque calidior, ac isti adipes magis concoquunt, quam relaxant, sicuti Scyllus, & ceruinus, anatinus, bubulinus, asnerinus, galinaceus, hircinus, & caprinus, è contra magis relaxant, quam macturent. Sed scirrhis tumores humores medicamenta euaquantia discutendo, simulque extrahendo sunt radii cucumeris agrestis, ciclamini, bryoniae maris, eleborus niger, stethium nempe herba lanaria, seu radícula appellata, & herba regina thabacum etiam vocata, & semen ricinae, seu Keruz. Insuper ster-
cus bubulum, de quo ait Gal. Et huc & ipsum facultatis excruciatore, verum ut traherem etiam obtinet, ubi ait Medicus quidam medicamentorum peritus in Myra, quoniam Helleponto est ad tumores omnes scirrhis ex aceto in cataplasmatibus formam compositum illens. Verum ego hoc phar-
macum non ab illo Medico Myse, ut exillimauit Galenus inuenit fuisse inuenio, immo ab Hippocrate quingenta circiter annorum spatio, antequam Medicus ille Myse natus fuerit, tale nanque pharmacum in veni tomore, simulque, cum stranguria praeberetur, & c. Purgans me-
dicamentum, quod insacum mulierem purgare valet, si vteri osdem recte habueris, forum exstern-
core bubulo sicco, infuso, & excusio ad quatuor choenicas exhibeto: Aceti autem heminas decem addito, & urina bubula tantundem, & postea alij similli compositioni addidit erui farina choenica. Praeterea autem stercori bubulo acetum adiecitum acetum ne dum intro penetraret, sed etiam calidum actu temperat, incidit, discutiat, exhalareque faciat, vnaque extrahat. Hinc etiam Galenus. Etenim verò partium, quae iam scirrhum contraxerunt, vacuatio per illa medica-
menta perficitur, vocantque ea malactia, id est, mollentia, medicis solent. Quoniam autem membro-
rum alia rariora naturae sunt, alia densiora: nam rariora facilius recipiunt, difficilius verò recepta retinent: densiora verò in oppositum, difficilius recipiunt, facilius autem recepta re-
tinent etiam vaccinationem eorum diuersa specie remedia postulare est necessarium: cum pro rariori-
bus, recte curandis, laxantia, emollientiaque incedunt facis sint. At verò ad densiora (quae cruditates receptas non nisi difficillimè expellunt) curanda, laxantia quidem seu mollentia non
sufficiunt. Ilac igitur de causa tum in tendonibus, tum in ligamentis, cum scirrhis fuerint, visum,
mihi satis erit et rationi, quod per mollentia medicamenta mollium aliquod incisionem admi-
scere. Ex quorum numero vel in primis acetum est, interim verò & in alijs partibus etiam raris, moli-
bus, & vacuis spongiosis, quas scirrhus affecit, ut videtur. Verum in tendonibus, & ligamentis
in hunc modum. In aceto acerrimo eandem igni lapidem extingito, ac si quidem haberi potest, qui
ceret in magnis vrbibus raris non est pyritem, vulgo Marchisita vocatur: Sin eius copia non da-
tur, molare, & graci Mylitem vocant, scilicet ex quo molis, quibus molitur faciant. Deinde ascen-
dente post infusum lapidi acetum vapore calido in hoc dimoueri scirrhusum ligamentum, vel tendonem
cogo, atque medicamen exinde rursus, quod molliat impono: de raris etiam partibus mox in-
quit. Ex ammoniac quidem thymiamate, cum aceto etiam alij non pauci lieni impovent, vntur,
ad luti crassitudinem, quod ex vtriusque mistum est, redacto: cui addo ego & bdelium, & serapi-
um, & opopomacum, puluerisque thabaci, vel ciclamini, aut bryoniae quantitate de-
centem, & super eorum re linat atque terebinthinae paucis addito ceratoque extenso, ad moueri
loco scirrhis potest. Tamen etiam in suffumigato, aut fomento spongijs ad mouendo, omni-
bus etiam membris spongiformis conuenit, acetum, radice altheae, cucumeris, & syllustris bu-
litem, deindeque lapide, narrato, ignito, actu percalcato: His tamen conditionibus seruatis,
cum Galenus ibidem dixerit. Atque vtr, ut dixi, quotidie: Ceterum curatio, quae per acetum ad-
ministratur, velis est vitio iam adulto, & cum preparata iam sub mollentibus pars fuerit: Exco-
gitanti autem, & composita quadam ex aceto medicamenta, quae inter mollentia visum ad unum diem
impono. Si quidem aceti vis modo ea, quis modice, & debito tempore vntur, salutaris cuiusmodi affe-
ctibus est, cum crassos, viscidiosque humores discieans nempe inciens. Quocirca non in curacionis
principio quotidie adhibere possumus, cum tunc magis laxare, & molliare, & coquere, quam di-
scutere, & quod incidit, simulque adstringere, acetum enim adstringit: ideo ait. Sin vel in mo-
deratis, vel in tempore non idoneo tenuiores partes violenter absint, id, quod reliquum est lapide-
fere finit: Ergo tantum ubi tumoris maiori parte iam auxilio reliquo euaquantur, euaquantur
cunctaneis ablata aceti fomentacionibus, suffumigatibus vti recte deer. Aduerte autem acetum
de genere quidem euaquantum humoris tumorum reuera non esse: quia sola ea, quae calfaciunt,
sed non admodum, vnaque ex his ante euacuationia sunt, ut capite praecedent, iam ostensum: Quae verò
fortiter discieant, etiam si non exalfaciunt, ut acetum quod vi frigidum est, tamen ipsa non per me-
dium euacuando scilicet, quod subtile est: tamen acetum quoque incidendo, & simul excoquendo
conuat: Vnde consequenter discitur, non tamen extrahit: Vnde aceto semper relaxat, ut iac-
cendat altheae, & euacuans ut radice cucumeris agrestis, vel ciclamini committere debemus
Verum cum talia antea allata euacuationia nimium calida, nimiumque sicca sint: ideo semper
laxantibus, emollientibusque corrigenda veniunt: ut exempli causa. Recip. radicem bryoniae
maris, ciclamini, cucumeris sylvestris herbae lanariae, & reginae an. M. i. altheae liborum alborum,
Kiri an. M. j. feminum lini, fenugraeci an. vnc. i. flor. melliloti, camomillae an. M. i. sem-
per autem aliqua addenda sunt, quae propriam partem laesam respiciunt: ut pro venenosis me-
tam,

A
1. De s. s. s. s. s.
2. De s. s. s. s. s.
3. De s. s. s. s. s.
4. De s. s. s. s. s.
5. De s. s. s. s. s.

De s. s. s. s. s.
De s. s. s. s. s.

De s. s. s. s. s.
De s. s. s. s. s.

B
Pag. 69.
14. Med. 9.

Idem.

Idem. modum.
2. De s. s. s. s. s.

C

D

De s. s. s. s. s.
De s. s. s. s. s.
Idem.

omnia vna vice; immo paulatim relaxantia, & emollientia, simulque ab euacuantibus auferre. **A**
 deuiocinatur: similiter adstringentia gradatim loco laxantium, & emollientium adijcere debe-
 mus. Vt exempli causa decoctum in vino albo dulci, pauco aceto penetrationis gratia semini-
 bus ricinæ, radicibus cucumeris agrestis, cyclaminis, bryonix, & herba tam lanariæ, quam regin-
 næ factum, erit quidem decoctum euacuans, calfacioeia, exiccatoria, ac extractoria vi decora-
 tum, cui decocto relaxantia, & emollientia hæc adijciuntur, nempe altheæ, maluarum, lithiorum,
 alborum, Keiri, flores meliori, semen lini, & signu græci. Item adeps cerui, suilli, &c. & ammoni-
 acum, bdeliu, &c. hoc presidium tandiu admoendum erit, donec tumore, & durities, & ma-
 gnitudo remittatur, quibus non modò remissis, ac verò quoque penè finitis, tunc loco vini dulcis
 albi, vinum album austerum, & generosum pone, & paulatim, gradatimque isthæc laxantia, &
 mollientia auferantur, quorum loco ablinchium, rosæ, balauftia, sumach; & mirtilli paulatim,
 gradatimque laxantibus, & mollientibus succedant; ac denique vice vini albi austeri, acetum
 acerrimum assumatur, in quo decoctum fiat ferè solis euacuantibus, simulque adstringentibus,
 quo decocto stillicidium parti læsæ adhibeas, ventriculo itiuo vna hora, reliquoque tempore,
 si tibi videatur aliqua mollientia admoete apponas. Verum semper factus erit in fine stillici-
 dium aque apponitane porrigere, cuius aquæ beneficio perpetuò æquè, tam euacuabis, quam
 roborabis, vt cap. 16. huius lib. vidiſti, & reliquo tempore ceratum hoc infigere. Rccip. ammoni-
 aci, bdelij, serapmii, opoponacis, styracis an. vnc. 3. his in aceto dissoluis: croci scrup. 1. spice
 nardi drac. 5. laudani mæſſ. an. drac. 1. ablinthij drac. 5. pulueris radicis bryonix, cyclaminis an.
 drach. ij. & 5. balauftiorum, mirtillorum an. drac. 5. ceræ, cæſing, terebinthine q. l. M. f. ceratum.

Decoctum pro
 stillicidio. Si
 nigro vel fusc
 no vel fusc
 eripidas & ma-
 dus de ordo, ac
 tempus quo ex
 vespertinum, vt
 pars stillicidii
 eodem tempore
 de curia, de ro-
 boris maneri,
 ne decocto affi-
 ciatur.

Genit ad lib.

Finis Libri Sexti.





DE CRVDITATIBVS
RECTE DIGNOSCENDIS,
RECTEQVE CVRANDIS.
LIBER SEPTIMVS.

Vbi

Compositionum, regionum, cruditatum, rectè curandarum.

Curatio Galeni sententia statuitur.



C A P V T P R I M V M.

Conexushuiuslibri cum alijs præcedentibus libris.

4. Demen. An.
c. 1. 1. 7.
Ex primo de
diff. resp. ca.
de 1. 1. 1. 1.



Quoniam omne compositum posterius est simplicibus, ex quibus compo-
situm conflatur: hinc iure merito habemus simplicium regionum crudi-
tatum nostri corporis curatio, recte executioni mandandis, vi-
dique explanatis: superest ergo, vt quatuor cruditarum regionum
compositionem, (vt tantum laconice me expediam) quae sepius con-
tingere solent, recte curandam, curatione ingrediar. Nam, quo ad
reliquarum: compositionum cu: rationem ita fusi libro 5. indicationes
quidem promulgauimus, vt ipsi quoque curationi satisfecerimus. Eae-
que sunt ob causam no:ua defatigatione hic opus non est: Satis enim
mihi est, cum Gal. de compositione primae cruditarum regionis cum secunda regione non egi-
t, nostri dilucidationis gratia istius compositiois indicationes colligere voluerimus.

C A P V T I L

B Compositionis cruditatū primæ regionis cum tertiâ, vnâ & quarta regione curatio defumitur ex Galeno.

4. The word "div."



DE compositione verò primæ regionis cum tertiâ, & quartâ, agit Galenus. Quo loco de diastolico, & diastrippereo agitur, tum ad preparandas primæ regionis cruditates, tum ad confectionem cibi fovendam, tum etiam ad alium modum leniendam eorum pulueribus, ruditer factis, datisque cum mulla oximeli, apomeliq; , ne in habicum corporis tertiæ, & quartæ regionis cruditates illæ introfiterentur: hinc quæritur, ac fomino, tunc patientes curate tenentur secundum indicationes huius compositionis collectas: Curata enim prima regione; faciliè postea tertiâ, & quartâ curabuntur. Supposito etiam quod secunda regio impura non sit.

Prima credita-
tione de totius
de quatuor simul
reprehenso compo-
sitionis recta
curatio est.

CAPVT III.

Compositionis cruditatis secundæ cum tertiâ, & quarta curatio traditur.

Crudi sunt se-
cundæ regionis
expediri, & ij
acriter, & ij
quintæ regionis
inhiberi, & i
sacrandi.

Crudi sunt se-
cundæ regionis
expediri, & ij
acriter, & ij
quintæ regionis
inhiberi, & i
sacrandi.

Crudi sunt se-
cundæ regionis
expediri, & ij
acriter, & ij
quintæ regionis
inhiberi, & i
sacrandi.

Crudi sunt se-
cundæ regionis
expediri, & ij
acriter, & ij
quintæ regionis
inhiberi, & i
sacrandi.

DE compositione autem secundæ cum tertiâ, & quarta regione agit Gal. iniquens. In venoso visorum genere apparere subesse illi copiam semicrudorum succorum, in reliquo vero corporis totomultitudinem horum mordacium, &c. Quoniam ergo duo prima sunt, quibus primam intentus sit oportet, qui eiusmodi affectibus medebimur crudorum sine etiam semicrudorum, qui ante sanguinis perfectionem fuerunt, peregrino, & acuto, ac mordacium, qui secundi sunt, & sanguine posteriores eductio: Nam in acutum tertiâ, & quartâ regionis eductione cum intrinsecis, cum extrinsecis molita, etiam horum succorum alteratio necessaria sequitur. Verum cavendum ne cruditates secundæ regionis in tertiam, & quartam introferantur regionem eò, quia tunc læsa partibus solidis ab ijs cruditatibus acerbis actiones nostri corporis consequenter afficerentur: ac etiam curatio multo difficilius evaderet, & copiam adauget ratione, tunc factis viribus imbecillioribus. Ideoque ait pergens. Abstineri eos convenit ab omni valido motu: & à quacunque re, quæ ad altum eas cruditates ferre valet. Ceterum cum superius dixerit. Ausus præterea illi quodammodo, & sanguis esto: Maxime ergo detrahere primo de sanguine oportet: deinde sic cum illam semicrudum in genere venoso existentem tum mordacem tertiâ, & quartâ regionis educere, qui superare videantur. Ideo quoniam aliquando aliqui nolunt, quod sanguinem illis detrahamus, ut lib. 3. de magn. sang. dicit, ait. Non sustinente autem homines sanguinem sibi detrahi: Quid tunc agendum sit nos docuit, iniquens augere de illis: si verò neutrum nempe nec sanguinis missionem, nec expurgationem admittat, aliam quampiam rationem inira, quæ maxime si non brevis, ac longiore tempore præstantiam corporis habitudinem homo recipiat. Ideoque ait. Abstineri eos convenit ab omni valido motu respectu cruditatum implicatarum id est oppositarum, cum prohibendum sit utrumque resultum: Nihilominus ad plenitudinem tolerantiam, inquit illico. Blandè verò viscosos, atque oleos perfrictos per quam suavi lavare balneo: inde in otio, abstinentiaque habere, atque etiam somno: quam rem cum iam explanatim, non amplius tangent. Verum tantum de balneandi modo Galeni verba, antea, non posita, narrabo; ibi enim ait. Quum igitur primo die experti an facile finita lassitudo sit, similiter granatum hominem eernimus, tum mutendus in balneum, secundo etiam die est; tum in quiete, abstinentiaque cibi habendus: aquo vero & si iterum, & tertio die oportere videris ipsam dietam laudare, quietem, ac somnum ipsis lavationibus interponens conducit ad somnum non in postremis ipsam balneum quoque, &c. Verum enim vetò si patiens permiserit, illis nos tum sanguinem detrahere, tum purgancia medicamenta præbere posset, ut res æquè postulat: prius sanè genus venosum, ne secundam cruditatum regionem dixerim, æquè tam à plethoria, quàm à cacochymia penitus liberam facere expedire subinde vetò tertiâ, & quartâ regionis mordaces educere cruditates operæ pretium est. Alio enim modo proba curatorem nos ingredi impossibile mihi visum est. Si namque balneo suavi, & vñctione blandâ, leuiter erudicates mordaces per halitum educere (ut indicationibus huius compositionis cruditatum dictum est), tiam niteremur, semper quidem cruditates secundæ regionis, ad tertiam, & quartam quoque regionem semper terraheremus, quod maxima iactura esset. Unde non nisi prius toto corpore omnino expurgato, sanguinis detractione, alinaque simul purgatione, nec non posset etiam per peritricheam diureticis medicamentis molitum; nunquam sanè eas acres, & mordaces eruditates tertiâ, quartâque regionis diaphoreticis prædictis tum intro assumpris, tum extra admixtis admittere possemus: semper observatis ijs omnibus, quæ de curationibus cruditatum simplicium omnino statuta sunt, tam de præparantibus, & euacuantibus, quàm de victus ratione. At verò talem harum cruditatum compositionem ventriculus plūs frigidus æquo, forsamque humidus; & hepar plūs iusto calidum, fortassisque siccum, ne deuo regnarent. Isthæ viscera utique luis oppositis, tam intrinsecè adhibitis, quàm extrinsecè applicatis, ad eam temperamēta naturalia redigenda sunt hinc eodem modo corroboranda

veniant, sicuti libro præced. capite 4.
& capite 13. iam dictum
est.

CAPVT

C A P V T⁺ I V.

Compositionis cruditarum primæ secundæ, tertiæ, & quartæ regionis
curatio ex Gal. elicitur.

H

Vitus compositionis omnium cruditatium locorum, curationem nobis tradere voluisse Galenum his verbis, confiteantem esse, caput id enim iam inscribere. De vlcero affectu, cum crudiorem copia in corpore tueri se coniungatur, et habet Gal. Cum vero reliquis lassitudini, affectus sit, in quo supra vlcerois sensum copia crudiorem in toto corpore congeri, de hoc quoque dicendum est, etc. Quoniam enim de compositione primæ repositus cum tertia, et quarta relictæ secundæ

Composita con-
dita est consili-
beliquante re-
gionem simul
funditum ora
no recta a Gal-
confligunt.
Locus Galent ex
silantio.

regione) videatur tamquam Galenus dixisse, hoc modo. Si enim tibi in primis ventris crudi succi copia est, diffundendum nobis cum esse, consequendumque diximus, quod aenteribus semper, ne in habitum corporis traducatur, tibi vero in extremis venis, & corporis habitum referat copia ipsa cruditasque, & consequendum pariter, & per habitum resoluendum. Nimirum quibus ambo incidentur, inis ambe rationes sunt misceande, atque idisi quidem pari mox regere videbuntur, aequali utriusque resistentia. Si autem alteram praequam, totius utriusque evanescit studio in id propenso, nec tamen altero, quod minus efficit, neglecto. Nihil est autem utriusque curationem ad hunc modum. Nihilominus pro ut vne extrema loco, nec nohine etiam conerariam curationem possulent, has solas pro declaratione expresse. Vnde utrumque vetane reuulium nempae prima regio ad reuam, & quartam regionem in suas cruditates nunquam transmutare debemus. Scuti viciem neque a quarta, seu a tertia regione ad primam regionem cruditates copiosius ducenda: veniunt: per hunc enim curarionis terminum quoque conprehenditur curatio sequenda regionis, quam in erim his verbis, postea illico conprehendit. Non enim ab re fuerit exemplo aliquid de hoc egisse, si quis in quibus in primis maxime ventris crudi succi congesta copia est, simpliciter dicit non fiper con medicamentum uti. Ergo si non modò in his, sed etiam

omnibus venis fidi, lupine in ipsa carne; in principio curationis ipso diatrion piperem utendum, & fedi cum admixtum petroselinum quoniam fidi, quantum anisi, & thimi, & zingiberis babetur. Verum prius confectum fuisse aliquam crudelitatis primæ, & secundæ regionis crudelitatis copiz aliuam educationem, nec non plenitudinis euacuationem oportet. Eodemque tempore, quo diatrion piperem præbemus, etiam necesse est, vt oximeli aqua mulsa, fide saccharata, aur apomeli, ad alium mirissimè subducentibus patienti exhibemus: fortissimè aquam nullam, hyssopo semiclametam dare oportebit, pro potione verò vt Hippoc. etiam in febre ardente. Vana etiam alba ex melle passis aqua exhibere possunt. Vt namq. papsillatum fecerit, tunc ea expressa diuina ad idem valent. Verù ad Gal. curationem iam partem declarantur acceduntus; ait enim: statim pergens, *Post primam* verò diem quo diatrion petroselinum portuicacum commixtum præbere ceperimus, maximeque etiam post secundum miscendum eidem est aliquid diæ alaminibus: Max verò partes aquæ miscende: tunc enim aquæ omnes editerates recipienda sunt, neque obiecias, si affuerint tunc ea medicamentis duos motus seu sum crenarios efficere nequeunt, diatrion enim piperem alijs aluè mirissimè subducentibus simul parienti datum emā cum diacalam in rha duricūca, diaphoreticæque. Quandoquidem hoc dubium Hipp. soluit, dum in febre ardente porionem ad vrinā cendam, simulq. ad ventrem soluendum debet. *Ap. in pulsatris pulegiæ pugillis duos in cendi, quomodo decem, ad tertias decoquito, hoc melle, & aqua admixta aquosum bibat, ad iunctis pugillis interdo, quod vrinam mouet, & alium soluit, ad quas duas ingentiores etiam aliam aquam præbuit, quæ ipsa est.* Aquam mulsam ad dimidias de coquo & diuine spiritum in. In morbo vero regio hanc, quæ

Vitis refulgens
 vine arce facta ex
 Hys. de floribus.
 Radem alpece
 et distichis po-
 puleum desecta
 sum et dactylis
 michan dactylis
 efformis dactylis
 unum.
 Oblectio.
 Oblectio in
 por. Solatio.
 Cur eod. alpece
 dactylis michan
 nra lumen col-
 lationis per alpece
 et per vinctum
 fere possit.

perit morsus regius insipiens in feris, una postea alba terra tris symplicis, cicurum alborum, vitonorumque mentis dimidius, borderi ad simili tantum: cum cuncta antea, aqua harena decem, opium, mentha, orisandrum cuiusque partium tertio, quoad aqua leniter deorsum sit, populi veno adanti: pargillo inieci- aqua. Venire difficile rationibus id intelligi cōt. Nam, ut ex Galieno antea iam exploratum ha- buis, illa ventri inhaerescit, quae sua acriedine lenitum alium exciunt: illa verò vasis vretoris se inhaerere ibidem digeruntur; digesta verò eam sine, vnam eueant: sicuti diaphoretica, dum in carnem pervenerint, inibi digeruntur, & actuantur ad aquam operandi, halitum cutis exciando. Ceterum Gal. pergens curationem allatam declarando, inquit. *Procedente deinde tempore, & sius distalamaribus plus ad decursum ad extremum verò etiam solum exhibebitur, nimum cum tu- tum corpus primum, & secunde regionis delectationibus, & per hanc expurgatum fuerit; semper tamen cur Jiratur speciebus, regionibus, & copia pensatis, tum in curatione simplicium, tum- que compositarum curatium. Verum adverte licet de his cruditaribus simul compositis, etiam- de 3. i. obiter verba fecerim, id tamen pro dilucidanda totius corporis evacuatione agenda, priusquam certis, & quæz regionis curationem ingrediamur, non autem exactè, ut hic agendū est; Verum Galenus ait, ut simili modo victus ratio nemus composita affumere debeamus, & reli- qua in simplicibus cruditaribus flatutz, his verbis. *Ad eundem modum, & in reliqua omni velle- ratione, quoties pars afflicta sunt miscenda corum medendi rationes sunt, sed ita tamen, ut inter initia**

[illegible]

petio-

Nota.

Modus & ordo
curacionis con-
sequens. Primo
enim prima re-
gio rectè cura-
da subinde se-
cunda, postea
tertia deinceps
quarta usque
ad ultima.

Modus & ordo
exhibendi dietæ
floris & simul
diaphoreticæ &
diureticæ com-
mixtæ.

Docet ad dia-
phoreticam sola
diuretica conse-
mit.

Quinque mala,
quæ scribitur, &
cruditas copis
prima regionis
ad secundam, &
ad tertiam re-
gionem accide-
ret.

potiores medendi partes ijs præstentur, quæ in primis continentur venis, in fine verò ijs, quæ in carnibus. A medio inter hæc tempore, ambæ rationes æqualiter miscebuntur, ut in morbo regio, tum si suo, tum nigro, nec non in composito ex utrisque, qui viridis conspicitur omnibus cruditatibus regionibus, cruditatibus copiosis repletis: ibi prius prima regio deiectionibus curanda: postea mediæ, curatione secunda regio ab ijs liberanda deiectionibus, venæque, sectione. ac diureticis præsidij, cum istis tribus euacuationibus icterici, etiam lecto die facti, vigesimo die sanentur Hipp. experimento, ut Heraclidi euenit: In fine autem balneis diaphoreticis, fomentis, frictionibusque tertiam, quartaque regio curari debet, ut ex Hipp. colligo. Cæterum sicuti in cruditatum simplicium curatione gradatim contraria adhibere, et inter quiescere opus est: ita etiam in cruditatum compositarum curatione obseruandum est: Gradatim enim à diatrion pipereo, seu dialpolitico, & ab alijs blandè deiectionibus ad diacalamintham diureticam, diaphoreticamque progredi cogimur, ac interquiescere, priusquam diacalaminthæ ijs miscetur, petroselinum parum miscendo. Cur autem à prima regione curationis exordium desumere debeamus, alias dixi, cum Galeno, Naturæ providentiæ fuisse, ut cruditates in prima regione, seu in partibus ignobilioribus, atque ad eas euacuandas viæ quidem facilliori subijcerent, quousque ipsæ euacuarentur, aut à natura ipsæ, aut ab arte: si namque introferrentur, quinque mala consurgerent. Primo enim sanguinis sinus venarum adeo inquinaretur, ut sanguine ipso improbo reddito, nostri corporis partes non amplius probè nutrirî possent. Vtcrius calor influens sanguinis tam venarum, quàm arteriarum, læderetur. Insuper, eo calore influente laeso, qui ne dum calor cordi implantatus alitur. Verum, etiam ex quo viuus efficitur, valde labefaceretur, quo affecto, cum primo agente corporeo nostrarum actionum in vniuersale salubre, & insalubre omnibus cæteris partibus accommodato, omnes hinc nostræ actiones ruerent. Quarto cruditates illæ primæ regionis, ad partes solidas accedentes particulatim harum partium, quibus omnia nostra corporea opera tribuit Hipp. (ut libro de certitudine medicinx iam ostensum est) actiones maximè obnoxie euaderent. Tandem in carne iacentibus ijs cruditatibus, quæ antea in prima regione aderant, difficillimè ob meatuum angustissimos euacuari tunc possent, maximo agnorum damno, tum cerebri, & hepatis, cum renum, ac reliquarum omnium cunctorum partium,

1. Hipp. com. 2. c. 64. & 4. de tueria. lib. 2. c. 4.
De intern. 2. c. 177. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300.

12. Meth. 2. 3.

Finis Libri Septimi, & tertij voluminis.

Laus, Honor, & Gloria semper Deo, eiusque Matri semper Virgini Mariæ.

